

Berichte über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie.

Band XVII, Heft 5/6

S. 265—424

Allgemeines.

● **Jahresbericht über die Fortschritte der animalischen Physiologie.** Hrsg. v. O. Weiss. Neue Folge des physiologischen Teiles des Jahresberichtes von Henle und Meissner, Hofmann und Schwalbe, Hermann und Schwalbe, Hermann, Hermann und Weiss. Bd. 22. Bericht über die Jahre 1913—1919. Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 986 S.

Die Schwierigkeiten einer Berichterstattung über die physiologische Literatur der Jahre 1913—1919 liegen klar zutage. Um so dankbarer werden Forscher und Lernende das Gebotene aufnehmen. An Zuverlässigkeit der Referate, die zum allergrößten Teil von anerkannten Fachleuten herrühren, wie auch was die möglichst vollständige Berücksichtigung der in Betracht kommenden Publikationen anlangt, steht der vorliegende Band den vorherigen trotz Ungunst der Zeit nicht nach. *Rona* (Berlin).

Bayliss, William: The unity of the human body. (Die Einheitlichkeit des menschlichen Körpers.) *Lancet* Bd. 203, Nr. 20, S. 1046—1048. 1922.

Besprechung des Zusammenschlusses der zahlreichen so verschiedenartigen Gewebe des menschlichen Körpers zu einem organischen Ganzen auf Grund der Leistungen der nervösen Substanz und vieler chemischer Körper, vor allem der Hormone. Von Bedeutung ist der Hinweis auf die Wirksamkeit der Vitamine als Stoffe, die der menschliche Organismus für sich selbst nicht zu bilden vermag, die aber für seine Entwicklung und seinen Fortbestand unbedingt notwendig sind.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Sherrington, Charles: Animal mechanism. (Der tierische Mechanismus.) *Brit. med. journ.* Nr. 3219, S. 485—486. 1922.

Besprechung eines Vortrages, den Sherrington in der British Association gehalten hat. Es handelte sich dabei um die Beantwortung der Frage, ob der lebende Organismus als eine Maschine betrachtet werden kann. Diese darf bei dem heutigen Stande unserer wissenschaftlichen Erkenntnis nicht allgemein bejaht werden. Wenn es auch gelungen ist, die Grundlage für eine Reihe von biologischen Prozessen in einem physikalisch-chemischen Geschehen zu erkennen, so kennen wir doch im Ablauf der Funktionen des tierischen Organismus eine noch sehr viel größere Anzahl von Vorgängen (z. B. Nervenleitung), bei denen wir vorerst aussagen müssen, daß ihnen neben physikalisch-chemischen auch noch physiologische Faktoren zugrunde liegen. *E. v. Skramlik*.

Richet, Charles: Des moyennes en physiologie. (Über die Mittelwerte in der Physiologie.) *Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim.* Bd. 7, S. 31 bis 38. 1922.

An einigen Beispielen (temperatursteigernden Cocaindosen, tödlichen Dosen des „Aktinokongestins“ bei primärer und wiederholter Injektion, Milchsäurebildung bei Gegenwart kleiner Formaldehydmengen) wird gezeigt, daß auf biologischem Gebiete oft nur die statistische Methode brauchbare Schlußfolgerungen erlaubt. Natürlich ist darauf zu achten, daß Mittelwerte nur aus Zahlen gebildet werden, die durch die gleiche Methode gewonnen wurden, und daß der Vergleich zweier Mittelwerte nur dann möglich ist, wenn beide Versuchsreihen in einem einzigen Punkte verschieden sind. Prinzipiell wichtig ist es auch, bei allen Versuchsreihen gleicher Art den mittleren Fehler anzugeben und die Anordnung möglichst so zu gestalten, daß der kleinste mittlere Fehler gefunden wird. *W. Heubner* (Göttingen).

● **Lenhartz, Hermann und Erich Meyer: Mikroskopie und Chemie am Krankenbett.** 10. verm. u. verb. Aufl. Berlin: Julius Springer 1922. XIV, 457 S. u. 1 Taf.

Zahlreiche Abänderungen und Ergänzungen im Text und in den Abbildungen haben auch die vorliegende neue Auflage des bekannten Lehrbuchs wiederum wertvoll

bereichert. Die Auswahl des Stoffes, die Beschränkung auf die vom Verf. und seiner Schule erprobten und als wichtig erkannten Methoden, die besondere Hervorhebung ihrer pathologisch-physiologischen und klinischen Bedeutung, die Erweiterung des rein methodischen Inhaltes durch die prägnante Darstellung klinischer Systematik wie z. B. der neu aufgenommenen Einteilung der Nierenkrankheiten, verleihen dem Ganzen zwar einen durchaus persönlichen Charakter, erheben es aber auch gerade dadurch weit über den Rahmen eines referierenden Laboratoriumshilfsbuches zu einer besonders wertvollen und notwendigen Ergänzung der gebräuchlichen klinischen Lehrbücher.

Jungmann (Berlin)

Methodisches.

Reimann, Fritz: Eine einfache automatische Vorrichtung zum Tropfen und Niveauh alten beim Waschen mit Säuren. (*I. med. Klin., dtsch. Univ., Prag.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 133, H. 1/3, S. 112—113. 1922.

Modifizierte Gaswaschflasche, aus der man stets gleiche und kontrollierbare Flüssigkeitsmengen austropfen bzw. ausfließen lassen kann bei dauerndem automatischen Funktionieren.

Pincussen (Berlin)

Wichtigere methodische Angaben findet man in folgenden Arbeiten:

- Michaëlls, L.: *Praktikum der physikalischen Chemie.* (Vgl. Ref. auf S. 267.)
- Kugelmass, J. N.: *Torsionsviscosimeter.* (Vgl. Ref. auf S. 267.)
- Bechhold, H. und F. Hebler: *Trübungs-Standard.* (Vgl. Ref. auf S. 268.)
- Fleisch, A.: *Physiologische Nährlösung für Warmblüter.* (Vgl. Ref. auf S. 270.)
- Loeb, J.: *Membrandiffusion.* (Vgl. Ref. auf S. 273.)
- Fabre, R. u. H. Penau: *Jod-Bestimmung in Thyreoidea-Extrakten.* (Vgl. Ref. auf S. 274.)
- Hammett, F. G. und E. T. Adams: *Colorimetrische Bestimmung von Mg.* (Vgl. Ref. auf S. 276.)
- Hunter, G.: *Histidin-Reaktion.* (Vgl. Ref. auf S. 277.)
- Baudisch, O. und T. B. Johnson: *Nachweis von Thymin.* (Vgl. Ref. auf S. 278.)
- Salkowski, E.: *Eiweiß-Hydrolyse.* (Vgl. Ref. auf S. 278.)
- Lasausse, E.: *Cu- und Zucker-Bestimmung.* (Vgl. Ref. auf S. 281.)
- Dischendorfer, O.: *Cellulose reagens, Kupferoxydammoniak.* (Vgl. Ref. auf S. 282.)
- Kariyone und Kimura: *Santonin-Bestimmung.* (Vgl. Ref. auf S. 292.)
- Terry, B. T.: *Herstellung polychromer Methylenblaufarben.* (Vgl. Ref. auf S. 294.)
- Mangold, E.: *Untersuchung über Muskelhärte.* (Vgl. Ref. auf S. 317.)
- Vos, H.: *Bestimmung des Säuregrades im Mageninhalt.* (Vgl. Ref. auf S. 342.)
- Spatz, R.: *Atemschützer.* (Vgl. Ref. auf S. 345.)
- Goeckel, H. J.: *Untersuchung der Alveolarluft.* (Vgl. Ref. auf S. 346.)
- Beccadelli, G.: *Blutreaktion.* (Vgl. Ref. auf S. 347.)
- Flagg, P. J.: *Oxyhämoglobinometer.* (Vgl. Ref. auf S. 354.)
- Bang, J.: *Mikromethoden.* (Vgl. Ref. auf S. 358.)
- Greenwald, J. und J. Gross: *Bestimmung der Chloride im Blut.* (Vgl. Ref. auf S. 364.)
- Toni, G. de: *Bestimmung des Ca im Blut.* (Vgl. Ref. auf S. 359.)
- Rosenthal, A.: *Bestimmung des Zuckers im Blut.* (Vgl. Ref. auf S. 359.)
- Adler, A. und E. Meyer: *Bestimmung des Bilirubins im Serum.* (Vgl. Ref. auf S. 364.)
- Dodds, E. C.: *Diastase im Urin.* (Vgl. Ref. auf S. 372.)
- Grunke, W.: *Cholesterin im Urin.* (Vgl. Ref. auf S. 372.)
- Bidou, G.: *Orientierungszirkel.* (Vgl. Ref. auf S. 388.)
- Roasénda, G.: *Geschmacksinnprüfung.* (Vgl. Ref. auf S. 389.)
- Magitot, A. P.: *Blutdruck-Messung in den Netzhautgefäßen.* (Vgl. Ref. auf S. 394.)
- Castellani, A. u. F. E. Taylor: *Mykologischer Nachweis von Inulin.* (Vgl. Ref. auf S. 400.)
- Henriques, O.-M.: *Bestimmung der [H] in Agar-Nährböden.* (Vgl. Ref. auf S. 400.)

- Skar, O.: Mikroskopische Zählung der Mikroorganismen. (Vgl. Ref. auf S. 409.)
 Manteufel, P.: Anaerobenzüchtung. (Vgl. Ref. auf S. 409.)
 Richardson, A. C. und C. C. Dozler: Anaerobiose. (Vgl. Ref. auf S. 410.)
 Ruppel, W. G., O. Ornstein, J. Carl und G. Lasch: Eiweißkörper als Antigen und Antikörper. (Vgl. Ref. auf S. 415.)

Physik. Physikalische Chemie. Kolloidchemie. Strahlenlehre.

● Michaelis, Leonor: Praktikum der physikalischen Chemie insbesondere der Kolloidchemie für Mediziner und Biologen. 2. verb. Aufl. Berlin: Julius Springer 1922. VIII, 183 S.


Das vorzügliche Praktikum, für dessen allgemeine Bewertung auf die Anzeige der 1. Auflage verwiesen sei, ist nunmehr um acht Kapitel und acht Abbildungen vermehrt worden. Es sind neu hinzugekommen Kapitel: über den Synergismus der Ionen, den Antagonismus der Ionen, den Eiweiß- und Alkaloidfehler der Indikatoren, den Säurefehler der Indikatoren, zur Theorie des Farbumschlags der Indikatoren, die quantitative Bestimmung der kataphoretischen Geschwindigkeit, mikroskopische Beobachtung der elektrischen Kataphorese in einer Ölsuspension, Membranpotentiale und Donnan'sches Ionengleichgewicht. Daneben ist im Text selber neben verschwindend wenig Fortlassungen eine Reihe von wichtigen Ergänzungen vorgenommen worden: So sind die theoretischen Ausführungen über Kolloide (S. 8ff.) erweitert, die Indikatorenmethode ohne Puffer ist ausführlicher behandelt als in der alten Auflage, auch die neuesten wichtigen Untersuchungen von J. Loeb erfahren schon Berücksichtigung, besonders aber hervorgehoben sei die für die Praxis vorteilhafte allgemeine Vorschrift für die p_H -Messung einer beliebigen Flüssigkeit. Auf die Vermehrung der vielen Einzelheiten (z. B. Metaaminobenzoesäure) kann hier nicht eingegangen werden. Es ist sehr erfreulich, daß der Verf. nunmehr, wie er in der Vorrede schreibt, die schönste Gelegenheit zu einer großen Praxis der Lehrtätigkeit hat, und daß er sie in dieser Art zur Ergänzung und Vermehrung seines Leitfadens verwendet. Somit kommt ihm selbst ein großer Teil des Verdienstes daran zu, daß, wie er sagt, „fast plötzlich die bisher so stiefmütterlich behandelte physikalische Chemie populär geworden ist“.

Spiro (Basel).

Kugelmass, J. Newton: Un viscosimètre à torsion pour les sols lyophiles. (Torsionsviscosimeter für lyophile Sole.) (*Inst. de thérapeut., univ., Bruxelles.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 28, S. 885—888. 1922.

Besprechung der Fehlerquellen bei Viscosimetrie lyophiler Sole in Capillaren. Apparatskizze: A Messingkugel, 2 cm Durchmesser in Dewargefaß, oben sich fortsetzend in Messingstab B, 18 cm lang, ca. 2,5 mm dick; beide vernickelt. Oben am Stab Spiegelchen C, durch Schraube befestigt. Der Stab hängt an einem Phosphorbronzefaden von $\frac{18}{1000}$ mm Durchmesser und ca. 70 cm Länge (D). Dessen unteres Ende ist in der Mitte der kupfernen Schraubenmutter E gelötet, die auf das obere Ende von B aufgeschraubt ist. Das obere Fadenende ist an das massive Kupferstück F gelötet, welches an einem Aufhängebalken befestigt ist. Das Dewargefaß ist fest montiert auf der Achse eines Blixschen Kymographions (bezogen von Hilding-Sandström, Lund). — Bei Messung muß die Kugel A ganz in das Sol tauchen. Das Kymographion soll eine volle Umdrehung in 10—15 Sek. ausführen. Man beobachtet mittels eines in etwa 1 m Entfernung aufgestellten, mit großem Maßstab in üblicher Weise versehenen Fernrohres die Spiegeldrehung. Berechnung: Umdrehungszeit des Kymographions mal Maximum der Kugeldrehung (Mittel mehrerer Werte) ist der Viscosität proportional. Besondere Bedingungen: Die Umdrehungszeit des Kymographs darf nicht wechseln, muß konstant gewählt werden. Die Geschwindigkeit darf nicht zu groß sein (sonst Störung durch Zentrifugalkraft usw.). Die Kugel stellt sich in wenigen Sekunden aufs Maximum der Abweichung ein und muß, bei Stillstand, wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren, wenn die Elastizität des Bronzefadens nicht überschritten wurde. Die Drehungswinkel sind nur im selben lyophilen Sol der Viscosität proportional; sehr kleine und sehr große Werte überschreiten die Genauigkeit der Methode. Temperaturkonstanz erforderlich.

Oehme (Bonn).



Bechhold, H. und F. Hebler: Ein Trübungs-Standard. (*Inst. f. Kolloidforsch., Frankfurt a. M.*) Kolloid-Zeitschr. Bd. 31, H. 3, S. 132—137. 1922.

Die Verf. beschäftigen sich mit der Herstellung stabiler Trübungen, die speziell als Standardtrübungen für die Nephelometrie (Nephelometer der Firma Schmidt & Haensch) Verwendung finden sollen. Hierzu stellen sie 2 verschiedene Trübungen her, die sie als „Standard-Sol“ und als „Standard-Trübung“ bezeichnen. Das „Standard-Sol“ ist mindestens 6 Monate haltbar. Es ist aber nicht stets sicher in gleicher Trübung reproduzierbar und muß daher gegen eine frisch bereitete „Standard-Trübung“, die sicher reproduzierbar, aber nur 24 Stunden haltbar ist, eingestellt werden. Methodik: Das Standard-Sol enthält $\frac{1}{200}$ Mol. BaSO_4 . Es wird hergestellt durch Mischung von $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ und MgSO_4 , und zwar werden 1,3069 g $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ in 50 ccm Glycerin entsprechend einer $\frac{1}{10}$ Mol. Ba^{++} -Lösung aufgelöst. Weiter werden 0,6162 g $\text{MgSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ in 50 ccm Glycerin entsprechend einer $\frac{1}{20}$ Mol. SO_4^{--} -Lösung in Lösung gebracht. 6 ccm dieser Ba^{++} -Lösung werden mit 2,5 ccm Glycerin und 1,5 ccm Isobutylalkohol gemischt (Lösung I). Ferner werden 2 ccm SO_4^{--} -Lösung mit 6,5 ccm Isobutylalkohol gemischt (Lösung II). Beide Gläschen werden in mit guten, stanniolumhüllten Korken verschlossenen Gläschen in einem auf 25° erwärmten Thermostaten gebracht. Lösung II wird auf Lösung I geschichtet und durch Neigen und saches Schütteln Mischung erzielt. Mit dem Gemisch wird das Gläschen der Lösung II ausgepült. Nach erfolgter Durchmischung bleibt das Sol noch $\frac{1}{2}$ Stunde im Thermostaten. Das „Standard-Sol“ besteht aus Primärteilchen von nicht mehr als 90μ Durchmesser. Die Standard-Trübung enthält $\frac{1}{1000}$ Mol. BaSO_4 . Sie wird hergestellt durch Mischung von $\frac{1}{500}$ Mol. Hydroxylaminsulfat, gelöst in Glycerin, mit dem gleichen Vol. $\frac{1}{500}$ Mol. BaCl_2 , gelöst in Glycerin. Sie besteht aus Primärteilchen von durchschnittlich $2,5 \mu$ Durchmesser.

Kleinmann (Berlin).

Frumkin, A.: Zur Theorie der Elektrocapillarität. I. Capillarelektische Erscheinungen in nichtwässrigen Lösungsmitteln. Zeitschr. f. physik. Chemie Bd. 103, H. 1/2, S. 43—54. 1922.

Verf. bestimmt die Maxima der Elektrocapillaritätskurven für Lösungen von NH_4NO_3 , NaBr , NaJ , LiCl , LiNO_3 und NH_4CNS in Methylalkohol, Äthylalkohol, Aceton oder Pyridin. Der Einfluß von Jodiden und Rhodaniden, welcher in wässrigen Lösungen bekannt ist, findet sich auch hier wieder, und zwar in der gleichen Richtung, jedoch schwächer. Mit wässrigen Lösungen verglichen entspricht also das Maximum kleineren kathodischen Polarisationen. Die Potentiale der nichtwässrigen Lösungen werden gegen eine wässrige Kalomelektrode gemessen. Die Potentialsprünge an der Grenze der wässrigen und alkoholischen Lösungen können dabei meist vernachlässigt werden.

Beutner (Leiden [Holl.]).

Wild, H.: Elektrocapillarkurven in nichtwässrigen Lösungen. Zeitschr. f. physik. Chemie Bd. 103, H. 1/2, S. 1—38. 1922.

Verf. hat auf Veranlassung von E. Baur und unter dessen Leitung Elektrocapillarmessungen ausgeführt, d. h. die elektromotorische Kraft des Lippmannschen Capillarelektrometer beim Maximum der Oberflächenspannung bestimmt. Nimmt man an, daß bei diesem Maximum der Potentialsprung an der capillaren Hg-Spitze Null ist, so folgt also, daß die gemessene EMK des Systems gleich dem Einzelpotentialsprung an der breiten Quecksilberoberfläche ist. Auf diese Weise werden Einzelpotentialsprünge von Hg gegen wässrige Lösungen und verschiedene wasserunmischbare Flüssigkeiten, die mit diesen im Gleichgewicht stehen (durchgeschüttelt sind), gemessen. Die verwendeten wasserunmischbaren Flüssigkeiten sind: Amylalkohol, Phenol, Furfurol, Essigsäureäthylester, Anilin, Chloroform, Propylalkohol, Isobutylalkohol und Äther, alle mit Wasser im Gleichgewicht, d. h. also an Wasser gesättigt. In den meisten Fällen ist wegen der sehr geringen Leitfähigkeit noch der Zusatz von Äthylalkohol (vor dem Durchschütteln mit Wasser) nötig, sonst läßt sich die Elektrocapillarbewegung des Quecksilbers überhaupt nicht beobachten, weil zu wenig Strom hindurchgeht. In den wässrigen Lösungen, welche mit diesen wasserunmischbaren Flüssigkeiten durchgeschüttelt werden, ist gelöst: KCl oder $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ oder KNO_3 oder HNO_3 . In diesen genannten Fällen findet Verf., daß die Einzelpotential-Differenzen der beiden durchgeschüttelten unmischnbaren Flüssigkeiten gegen Hg gleich sind innerhalb 5—10 Millivolt. Mit demselben Grade der Genauigkeit läßt sich schließen, daß die Phasengrenzkraft beim Ver-

lungsgleichgewicht Null oder kleiner als 5—10 Millivolt ist. Eine Verallgemeinerung des Befundes auf alle Lösungsmittel soll gestattet sein (mit welchem Recht wird nicht sagt). Eine Verallgemeinerung für alle Elektrolyte dagegen wird nicht angenommen. Die Arbeit wurde unternommen, um eine frühere Behauptung Baur's zu stützen, daß die genannte Phasengrenzkraft unter allen Umständen sein soll. Es ist evident, daß die genannten sehr speziellen Fälle hierfür keinen Beweis bringen, auch ist die Fehlgrenze größer wie die ganze Phasengrenzkraft in vielen derartigen Fällen. *Beutner.*

Baur, Emil: Über Phasengrenzkraft. (*Laborat. f. physik. Chemie, techn. Hochsch., Zürich.*) Zeitschr. f. physik. Chemie Bd. 103, H. 1/2, S. 39—42. 1922.

Anschließend an die Arbeit seines Schülers Wild polemisiert Baur teilweise sehr persönlicher Art gegen Beutner (Entstehung elektrischer Ströme im lebenden Gewebe in lebenden Geweben, Stuttgart 1920; vgl. diese Berichte 5, 3) und gegen Freundlich (Freundlich und Geymants, vgl. diese Berichte 14, 66).

R. Beutner (Leiden [Holl.]).

Beutner, R.: Über die Nachahmung der elektrophysiologischen Stromerzeugung. XXVII. Hauptvers. d. Dtsch. Bunsen-Ges. f. angew. physikal. Chem., e. V., Leipzig, itzg. v. 21.—23. IX. 1922.) Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 28, Nr. 12, S. 483—489. 1922.

Verf. gibt eine historische Übersicht über die Entwicklung der Untersuchungen, die schließlich dazu führten, die elektromotorischen Eigenschaften des lebenden Gewebes in detail nachzuahmen. Insbesondere handelte es sich bei dieser Nachahmung um die Konzentrationsveränderlichkeit der elektromotorischen Kraft bei biologischen Objekten. An sich war diese Veränderlichkeit schon lange bekannt, aber erst durch die Arbeiten von J. Loeb und dem Verf. gelang es, konstante und reversible Werte festzustellen von weit höherer Größe als bisher (nämlich bei pflanzlichen Versuchsobjekten). Hiermit war für die künstliche Nachahmung eine Grundlage gewonnen. Nach langem Herumprobieren gelang es, erst einige, später eine ganze Anzahl Substanzen zu finden, mit denen man die am biologischen Objekt beobachteten Erscheinungen nachahmen kann. Es sind dies bekanntlich allgemein gesprochen: wasserunmischbare saure Substanzen. Der Weg, der zu diesem Ergebnis führte, war ein rein empirischer, auch ist das Ergebnis von allen physikalisch-chemischen Theorien betr. die elektromotorischen Wirkungen unabhängig. Ob man annimmt, daß es auf Ionenvanderung oder auf Ionendurchlässigkeit oder auf Ionendesorption ankommt; dies ist alles gleichgültig. Das Problem war einzig und allein das, gut passende Vergleichssubstanzen zu finden, und wie gesagt, gelang es, auf empirischem Wege eine befriedigende Lösung zu finden. — Unabhängig davon wurde später auch das Problem angegriffen, welche physikalisch-chemischen Gesetze für die so neuentdeckten elektromotorischen Eigenschaften der wasserunmischbaren organischen Substanzen maßgebend sind. Ausgedehnte Untersuchungen, die hier nicht im einzelnen wiedergegeben werden können, zeigten, daß es im wesentlichen Phasengrenzkraften sind von der Art, wie sie besonders von F. Haber früher untersucht wurden. Die gänzlich unmotivierten Adsorptionshypothesen von E. Baur stehen mit diesen Arbeiten Habers im Widerspruch. Der Vortrag schließt mit einem Hinweis auf Mannigfaltigkeit der elektromotorischen Eigenschaften wasserunmischbarer Substanzen und die wissenschaftliche Entwicklungsfähigkeit des Gebietes.

R. Beutner (Leiden [Holl.]).

Natannson, Hugo: Sind die durch Salze erzeugten Ruheströme Ströme einer Beutnerschen Ölkette? (*Physiol. Inst., Univ. Kiel.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 196, H. 5/6, S. 637—642. 1922.

Der Beweisgang in der vorliegenden Abhandlung ist ein rein negativer: es soll gezeigt werden, daß „Ölketten“, wie sie vom Ref. früher untersucht wurden, keine Nachahmung der experimentellen Beobachtungen am Muskel gestatten. Dies zu zeigen, gelingt in der Tat, indem der Verf. seine Versuche auf Benzaldehyd oder Guajacol als Mittelleiter beschränkt. Er kann also zeigen, daß kein völliger Parallelismus besteht zwischen der E.M.K. folgender Systeme:

- | | | |
|--------------------|---------------------------|--|
| 1. KCl (oder NaCl) | Benzaldehyd oder Guajacol | Hydrochlorid irgendeines organischen Amins oder Alkaloids. |
| 2. KCl (oder NaCl) | Muskel | Hydrochlorid derselben Base wie bei 1. |

Ob es irgendwelche anderen organischen Substanzen gibt, deren elektromotorisches Verhalten dem des Muskels gleichkommt, wird nicht untersucht.

R. Beutner (Leiden [Holl.]).

Clark, Wm. Mansfield: Instability of phthalate potentials. (Die Instabilität der Phthalat potentiale.) Journ. of the Americ. chem. soc. Bd. 44, Nr. 5, S. 1072—1073.

Verf. kann die von Oakes und Salisbury (vgl. diese Berichte 14, 444) gegen seine Arbeit erhobenen Einwände nicht bestätigen; die Puffermischungen aus Phthalsäure und Phthalaten geben vorzüglich konstante Werte. Bei neuerlicher Wiederholung der Versuche waren die Elektrodenpotentiale praktisch völlig konstant.

R. Beutner (Leiden [Holl.]).

Wastl, H.: Über Ionenantagonismus. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) Biochem. Zeitschr. Bd. 134, H. 1/4, S. 131—138. 1922.

Antagonistische Neutralsalzwirkungen, wie sie bei lebenden Organismen und auch bei kolloidchemischen Reaktionen von zahlreichen Autoren beschrieben worden sind, lassen sich auch an einem anorganischen Modell, einer Katalyse, bei der nur krystalloide Substanzen an den Reaktionen teilnehmen, nachweisen. Untersucht wurde die Landolt'sche Reaktion, wobei die Zeit der Jodabscheidung, die nach Zusatz von verschiedenen Neutralsalzen sehr beträchtlich variiert, unter der Wirkung von Salzgemischen im Vergleich mit den Wirkungen der einzelnen Salze bestimmt wurde. Antagonistische Wirkungen ließen sich nachweisen zwischen dem hemmenden SO_4^{--} und den in verschiedenem Ausmaße fördernden Cl' , Br' , J' , zwischen NO_3^- und Cl' , Br' , J' , ferner zwischen J' und Cl' bzw. Br' und Cl' . Die einzelnen Anionenwirkungen auf den untersuchten Oxydationsvorgang können sich gegenseitig aufheben. Dabei handelt es sich nicht um einfache Superposition der einzelnen Ionenwirkungen, sondern um gegenseitige Beeinflussungen, die manche Spezifität aufweisen.

Wastl (Wien).

Fleisch, Alfred: Eine ausgeglichene sterilisierbare Nährlösung von physiologischer H-Ionenkonzentration. (Physiol. Inst., Univ., Zürich.) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 94, H. 1/2, S. 22—27. 1922.

Die üblichen Nährlösungen entsprechen in ihrem Verhältnis von Kalium zu Calcium nicht dem Optimum (Spiro). Ringerlösung ist zu sauer, Tyrodelösung zu alkalisch. Sollen die Flüssigkeiten sterilisiert werden, so entweicht beim Kochen die CO_2 , die Lösungen werden alkalisch und es tritt ein vom Calcium herrührender Niederschlag auf. Um diese Mängel zu vermeiden, hat Verf. eine physiologische Nährlösung für Warmblüter angegeben, die eine konstante H-Ionenkonzentration von $[\text{H}^+] = 0,3 \cdot 10^{-7}$ ($p_{\text{H}} = 7,52$) bei 37° besitzt, haltbar und sterilisierbar ist und deren Rezept lautet: NaCl 10,5 g, KCl 0,5 g, CaCl_2 0,3 g, MgCl_2 0,1 g, H_3PO_4 $\frac{1}{2}$ normal 5,0 ccm, H_2O 50,0 ccm (= ad 58,7). Filtrieren. Zu 1000 ccm Wasser werden 50 ccm dieser Stammlösung zugesetzt, das Gemisch gekocht, abgekühlt, mit O_2 gesättigt und 5,0 ccm steriler $\frac{1}{2}\text{n-Na}_2\text{CO}_3$ -Lösung zugesetzt.

Ebbecke (Göttingen).

Bartell, F. E. and E. J. Miller: Adsorption by activated sugar charcoal. I. (Adsorption durch aktivierte Zuckerkohle. I.) (Chem. laborat., univ. of Michigan, Ann Arbor a. agricult. coll. exp. stat., Michigan.) Journ. of the Americ. chem. soc. Bd. 44, Nr. 9, S. 1866—1880. 1922.

Die Herstellung der Kohle erfolgt aus oftmals durch Umkrystallisieren von Elektrolyten befreitem Rohrzucker. Dieser wird bei möglichst tiefer Temperatur verkohlt und sodann unter sehr geringem Luftzutritt während 24—48 Stunden bei 1000° erhalten. Diese Reinigung wird besonders beachtet, da vor allem auf einen Punkt Augenmerk gerichtet werden sollte, der von vielen Forschern vorher und zuletzt auch von Michaelis und Rona untersucht worden war. Letztere hatten gefunden, daß bei der Adsorption von Methylenbläuchlorhydrat nur eine Herausnahme der Farbbase aus der Lösung stattfindet, daß jedoch die Salzsäure in Lösung bleibt und zu ihrer Neutralisation Calciumhydroxyd aus der verwandten Blutkohle in Lösung geht. Verff. zeigen nun, daß der Adsorption von Methylenbläuchlorhydrat eine hydrolytische Spaltung

hergeht. Wenn sie kurz nach dem Zugeben der Kohle zur neutralen Kochsalzlösung Flüssigkeit abfiltrierten, so fanden sie eine saure Reaktion des Filtrats, ein Zeichen für, daß die Farbbase schneller adsorbiert wird als die Salzsäure. Wurde nun die Kohle nochmals in derselben Flüssigkeit suspendiert, so verschwand die saure Reaktion, nach kurzer Zeit war die Flüssigkeit wieder neutral. — Verf. untersuchen sodann Verhalten ihrer Kohle nach Vorbehandlung mit Basen und Säuren. *Zisch.*

Schleussner, Carl Adolf: Diffusionsvorgänge in Gelatine. (Beiträge zur Kenntnis Liesegangschen Phänomens. Kolloid-Zeitschr. Bd. 31, H. 6, S. 347—352. 1922.

Der Verf. ging von der bekannten und auch schon des näheren studierten Tatsache aus, daß für die Bildung der bekannten, bei der Diffusion von Silbernitrat in Bichromatgelatine entstehenden Liesegangschen Ringe die Vorbehandlung und Zusammensetzung der Gelatine von wesentlicher Bedeutung ist, und versuchte, darauf ein Verahren zur Prüfung von Gelatine aufzubauen. Er fand dabei in systematischen Untersuchungen eine Reihe bisher nicht bekannter oder nicht genügend gewürdiger Tatsachen, die er nun zur Erklärung der Entstehung der Liesegangschen Ringe, sowohl der Hauptstrukturen, als speziell auch der sogenannten Substrukturen heranzieht. Er fand er z. B., daß Veränderungen des von Liesegang selbst eingeführten Zusatzes von 5proz. Citronensäure für die Bildung der Hauptstrukturen von sehr wesentlicher, für die Bildung der Substrukturen dagegen von gar keiner Bedeutung sind, so daß bei bestimmter Konzentration des Citronensäurezusatzes die Hauptringe völlig ausfielen, die Zwischenringe aber unverändert blieben; eine ähnliche Zerstörung der Bildung der Hauptstrukturen fand er bei Zusatz von solchen Salzen, die selbst mit Silbernitrat einen Niederschlag bilden, z. B. von Kochsalz; andererseits fand er auch eine Beeinflussung der Bildung der Substrukturen durch Zusatz von Chlorionen zur Bichromatgelatine, z. B. von Kochsalz oder Salzsäure. Schließlich fand Verf., daß die Substrukturen, im Gegensatz zu den Hauptstrukturen, weder beim Baden in Wasser noch in konzentrierter Citronensäure zerstört werden, also aus einem in Wasser und Säure unlöslichen Silbersalz bestehen müssen; und er glaubt, damit die Entstehung der Substrukturen auf die Bildung von Halogeniden bzw. Phosphaten aus Verunreinigungen der Gelatine zurückführen zu können. *P. Spiro (Frankfurt a. M.).*

Loeb, Jacques: Sodium chloride and selective diffusion in living organisms. (Natriumchlorid und selektive Diffusion in lebenden Organismen.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) Journ. of gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 231 bis 254. 1922.

Loeb wendet sich in den beiden hier folgenden Abhandlungen wieder dem Problem der physiologischen antagonistischen Salzwirkungen zu, welches er seit mehr als 10 Jahren oft und sehr eingehend experimentell bearbeitet hatte. Die Frage ist jetzt, ob die neueren Forschungen über Salzdifffusion an (nichtlebenden) Kollodionmembranen hier irgendwelche neue Einsichten verschaffen können. Die erste (vorliegende) Abhandlung ist dem experimentellen Studium der Diffusionserscheinungen an lebenden Membranen gewidmet. Die verwendeten Membranen sind die Häute von Fischlarven, und die eine Versuchsmethodik besteht darin, daß das mehr oder weniger schnelle Eindringen irgendeiner Säure an dem Prozentsatz der abgestorbenen Fischlarven gemessen wird. Natürlich wirken alle Säuren tödlich. Neutralsalze hemmen das Eindringen der abtötenden Säure, was eben daran zu erkennen ist, daß, ceteris paribus, der Prozentsatz der toten Larven ganz erheblich kleiner ist, wenn NaCl zugefügt wird. CaCl₂ ist in der Hinsicht noch wirksamer und LaCl₃ noch viel mehr. Es scheint also hierbei auf die Vertigkeit des Kations anzukommen. Durch Versuche mit MnCl₂, BaCl₂ und MgCl₂ wird dies annähernd bestätigt. Einige Zahlenangaben nach L. mögen dies erläutern. In einer 1/8000 normalen Salzsäure ($p_H = 3,7$) werden nach 18 Stunden mehr als 90% der Eier getötet; wurde 1/64 mol. NaCl zugefügt, so sank die Sterblichkeit auf 40%, das gleiche wurde mit nur ca. 1/8000 mol. CaCl₂ erreicht und von LaCl₃ war für den gleichen Zweck die minimale Menge von 2 : 1 Million in molekularen Mengen hinreichend. Im

einzelnen geschah die Ausführung der Messung so, daß 20 Eier in 50 ccm der Säurelösung mit oder ohne ein Salz gebracht wurden und nach 18 Stunden die Embryonen, bei denen Herzstillstand eingetreten war, gezählt wurden; es wurden hierbei Eier (Embryonen) gleichen Alters verwendet, man kann annehmen, daß die eindringende Säuremenge, die Herzstillstand hervorruft, unter diesen Umständen stets die gleiche ist. — Außerdem hat L. noch eine andere Versuchsmethodik; statt die tödende Wirkung zu beobachten, mißt er direkt die Zunahme von p_H , d. h. also die Abnahme der Säuremenge der Flüssigkeit, worin die Larven (oder Eier) schwimmen. In der Tat zeigt sich, daß in einer $\frac{1}{8000}$ mol. HCl ohne Salzzusatz die Säure am schnellsten von den Eiern aufgenommen wird: in 20 Stunden ist p_H von 3,8 auf 5,4 gestiegen. Fügt man NaCl in $\frac{1}{1}$ molekularer Konzentration hinzu, so ist in der gleichen Zeit p_H nur auf 4,1 gestiegen, also eine außerordentlich viel kleinere Säureaufnahme! Bei Zusatz von $\frac{1}{8}$ molekularer CaCl_2 oder noch weniger bleibt p_H nach 20 Stunden noch fast unverändert: Anstieg von 3,8 auf 3,9. LaCl_3 verhindert jede Spur von Säureaufnahme, selbst wenn nur Spuren von LaCl_3 hinzugefügt werden. Ferner kann L. zeigen, daß eine Mischung von $\text{NaCl} + \text{CaCl}_2$ im physiologischen Verhältnis die Säureaufnahme bereits in viel kleineren Mengen hemmt als NaCl allein, was mit obigen Befunden übereinstimmt. Eine weitere ausgedehnte Gruppe von Versuchen wird dann angestellt, indem statt HCl Essigsäure verwendet wird, also eine schwache, nur teilweise dissoziierte Säure. Es läßt sich zeigen, daß auch in diesem Falle die Salze diffusionshemmend wirken, und zwar im einzelnen in genau der gleichen Weise wie bei HCl. Diese Wirkung beschränkt sich jedoch auf den dissoziierten Bruchteil, ist also durchweg geringer als bei HCl. Der undissoziierte Bruchteil dringt bei Abwesenheit oder Anwesenheit stets gleich stark ein, hat also stets die gleiche abtötende Wirkung. Es ist zwar kaum möglich, diese Beziehungen quantitativ zu verfolgen, indes wird durch L.s Versuche die Richtigkeit evident bewiesen. Er kann nämlich zeigen, daß in einer Mischung von Natriumacetat und Essigsäure (wo also die Säuredissoziation durch die Acetatanionen zurückgedrängt ist) die beschriebenen Neutralsalzwirkungen beinahe verschwunden sind. Selbst das sonst so sehr wirksame LaCl_3 hat dann nur noch eine geringe Wirkung. — Auch die Einwirkung von Neutralsalzen auf das Eindringen von Alkalien in Fischembryonen wird untersucht. Hierbei zeigt sich stets das entgegengesetzte Verhalten, Salzzusatz beschleunigt das Eindringen, und zwar CaCl_2 mehr als NaCl. Die Versuchsmethodik ist im übrigen genau die gleiche. — Der letzte Abschnitt der inhaltreichen Untersuchung handelt über die Beeinflussung der Diffusion von KCl durch die Fischembryomembran. Hier ist eine veränderte Methodik nötig. Die Eier (Embryonen) werden zuerst 48 Stunden lang in einer halb-molekularen KCl-Lösung digeriert; dadurch wurde stets Herzstillstand herbeigeführt, was jedoch noch nicht irreversibles Absterben bedeutet. Das äußerlich anhaftende KCl wurde dann in destilliertem Wasser abgewaschen, was physiologisch die Eier nicht erheblich beeinflußt. Die so vorbehandelten Eier wurden danach in NaCl, CaCl_2 und LaCl_3 -Lösungen gebracht. NaCl bewirkte nach 2–3 Tagen in einer Konzentration von $\frac{1}{16}$ molekular eine Wiederbelebung fast sämtlicher Eier, d. h. das Herz schlug wieder. CaCl_2 in gleicher molekularer Konzentration brachte nur bei 20% der Embryonen das Herz zum Schlagen; LaCl_3 hatte in der Hinsicht überhaupt keine Wirkung. Dagegen hat Na_2SO_4 eine stärkere Wirkung als NaCl und mehr noch in ganz hervorragendem Maße $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$. Schon eine $\frac{1}{500}$ molekulare $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ -Lösung bringt sämtliche mit KCl vergiftenden Eier zum Wiederleben. Die Diffusion von KCl durch lebende Zellmembranen wird also besonders durch Salze mit mehrwertigem Anion befördert (denn Wiederbelebung bei obigem Versuche bedeutet Herausdiffundieren des giftigen KCl). Ferner zeigt L., daß Mischungen von NaCl und CaCl_2 im physiologischen Verhältnis keine so große Herausdiffusion des giftigen KCl möglich machen, in einer $\frac{1}{16}$ molekularen Lösung ist nach 2 Tagen nur bei 20% der Larven Wiederbelebung eingetreten. Also auch in dieser Mischung wirkt CaCl_2 diffusionshemmend. Es wird darauf hingewiesen, wie außerordentlich wichtig diese Beobachtung ist, um zu ver-

stehen, wieso die Zellen einen viel höheren KCl-Gehalt als das Blutserum behalten können; das im Blut vorhandene CaCl_2 hemmt die Diffusion. *Beutner (Leiden).*

Loeb, Jacques: The influence of salts on the rate of diffusion of acid through celloidion membranes. (Der Einfluß von Salzen auf die Diffusion von Säuren durch Kollodionmembranen.) (*Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.*) Journ. gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 255—256. 1922.

Anschließend an die vorhergehende Arbeit beschreibt Loeb nunmehr Diffusionsversuche an Kollodionmembranen. Die Beeinflussbarkeit der Säurediffusion durch Salze ist das spezielle Thema. Durchweg zeigt sich, daß Salz die Säurediffusion beschleunigt, während bei lebenden Membranen gerade das Umgekehrte beobachtet wird (s. voriges Heft). Dieser kapitale Gegensatz läßt sich vorderhand noch nicht völlig erklären. In einzelnen Fällen läßt sich auch bei Kollodionmembranen eine stärkere Wirkung von Salzen mit mehrwertigem Kation (CaCl_2 und CeCl_3) feststellen. — Die Versuche werden auf zwei verschiedene Methoden durchgeführt. Bei der ersten Methode befindet sich auf beiden Seiten der Kollodionmembran $\frac{1}{1000}$ molekular HCl, innerhalb der Hülse außerdem ein Salz, außen keins. Die Diffusion des Salzes von innen nach außen bringt infolge elektrostatischer Anziehungskräfte der Ionen eine Diffusion der Säure in entgegengesetzter Richtung mit sich; d. h. also, in der Kollodionhülse reichert sich Säure an, solange eine Salzdifusion stattfindet. Bei Salzen mit mehrwertigem Kation ist diese Anreicherung besonders stark. — Bei der zweiten Methode wird eine mit reinem Wasser gefüllte Hülse in $\frac{1}{2000}$ molekulare HCl getaucht. Die Säure diffundiert hinein. Hat man der Säure Neutralsalze zugesetzt, so geht diese Diffusion viel schneller vor sich. LaCl_3 und CaCl_2 sind wirksamer als NaCl, bei hohen Konzentrationen aber auch Na_2SO_4 . Alle diese Erscheinungen sind auf Grund einer von Arrhenius entwickelten Theorie zu verstehen (*Theories of solutions, 1912*); Arrhenius hat schon die Erhöhung der Diffusionskonstanten von Säuren durch Salzzusatz theoretisch und experimentell gedeutet. Mit speziellen Funktionen der Kollodionmembran hat dies alles nichts zu tun. Lebende Membranen verhalten sich total verschieden. *R. Beutner (Leiden [Holl.]).*

Oosterhout, W. J. V.: Some aspects of selective absorption. (Beitrag zur Frage der Ionenpermeabilität.) (*Laborat. of plant physiol., Harvard univ., Cambridge.*) Journ. gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 225—230. 1922.

Verf. studiert das Problem der Salzverteilung zwischen Zellinhalt und Medium, indem der Saft aus der Vakuole von *Valonia*, indem er diesen Saft und das Seewasser, aus dem die Pflanze stammt, auf Na, Ca, Mg und K, Cl und SO_4 analysiert. Methode: Die Pflanzen wurden aus dem Seewasser genommen, mit destilliertem Wasser gewaschen, oberflächlich abgetrocknet und mit einer Glaskanüle angestochen, so daß der Zellsaft unter vermindertem Luftdruck abfloß. Auf diese Weise konnten 300 ccm Zellsaft gewonnen werden. Cl wurde als AgCl ; SO_4 als BaSO_4 ; Na als NaCl, K als Percarbonate ; Ca mit Oxalsäure gefällt, als CaO ; Mg als Phosphat bestimmt. Die Menge der organischen Substanzen wurde nach Eindampfen durch Wägung festgestellt. Resultate: In Zellsaft ist etwas mehr Cl als im Seewasser, 21,183% gegen 19,605%. Verf. führt das darauf zurück, daß der Zellsaft bei der Produktion unter vermindertem Druck etwas eingengt worden ist. Na findet sich im Seewasser zu 10,919%, im Zellsaft nur zu 2,072%; K dagegen im Seewasser zu 0,464% in der Zelle zu 20,143%; Ca im Seewasser zu 0,453%, in der Zelle zu 0,63%; Mg im Seewasser zu 1,309%, in der Zelle Spuren; SO_4 im Seewasser 3,327%, in der Zelle 0,005%. Organische Substanzen sind im Zellsaft nur in sehr kleinen Mengen vorhanden. Da außerdem die elektrische Leitfähigkeit des Zellsaftes ebenso groß ist als die des Seewassers, kommt Verf. zu dem Schluß, daß die verschiedene Verteilung der Ionen zwischen Zellsaft und Wasser insbesondere die Anhäufung von K in der Zelle nicht durch die Anwesenheit von kolloidalen Verbindungen bedingt sein kann. Das K muß vielmehr in dissoziierter Form in der Zelle enthalten sein. Demnach muß man zur Erklärung der eigen-

tümlichen Verteilung der Salze annehmen, daß die Zellwand für gewisse Ionen undurchlässig ist. Petow (Berlin).

Bhatnagar, Shanti Swarupa: Studies in emulsions. Pt. II. The reversal of phases by electrolytes and the effects of free fatty acids and alkalis on emulsion equilibrium. (Studien an Emulsionen. II. Die Umkehr der Phasen durch Elektrolyte und die Wirkung der freien Fettsäuren und Alkalien auf das Emulsionsgleichgewicht.) (Chem. laborat., univ. coll., London.) Journ. of the chem. soc. (London) Bd. 119 u. 120, Nr. 699, S. 61—68. 1921.

Paraffinöl wird unter Zugabe von verschiedenen Mengen von Natriumoleat, Kaliumstearat, Lithiumstearat, Natriumlinolat im gleichen Teil Wasser durch Schütteln emulgiert und dabei die Mengen zugesetzter Salze mit zwei- und dreiwertigen Kationen variiert. Es ergibt sich für jede Seifenkonzentration ein bestimmter Wert für die Salzmenge, die eine Umkehr der Phasen in der Emulsion bewirkt. Je größer die Seifenkonzentration ist, um so höher ist die erforderliche Salzmenge. Doch auch bei gleichen Seifenkonzentrationen ergeben sich Unterschiede in der Wirksamkeit der einzelnen Kationen derart, daß sich eine Reihe aufstellen läßt. Am stärksten wirkt Al, dann folgt Cr, Ni, Pb, Ba, Sr, Ca, Mg. Desgleichen ergibt sich eine verschieden starke Schutzwirkung der Seifensorten. Die Reihenfolge war hier mit der wirksamsten begonnen: Kaliumstearat, Natriumstearat, Natrium- und Kaliumpalmitat, Kaliumoleat, Natriumoleat. Sind freie Fettsäuren zugegen, so ist weniger Elektrolyt erforderlich, um die Umkehr zu bewirken. Alkalien bewirken das Gegenteil und geben sehr feinteilige Emulsionen. Da die reinigende Wirkung von Seifen sehr durch die Elektrolyten des verwandten Wassers beeinflußt wird und Alkalien diese Erscheinung erschweren, so ist es gut, zum Waschen alkalische Seifen zu nehmen. (I vgl. diese Berichte 2, 356. Zisch (Dahlem).)

Fodor, A.: Kolloidchemie und Fermentlehre. Kolloid-Zeitschr. Bd. 31, H. 5. S. 279—283. 1922.

Verf. stellt sich darin auf den Standpunkt, daß eine Reihe von Fermentwirkungen — z. B. der Polypeptidase, Diastase, Lipase, des Trypsins, z. B. nicht des Invertins — „kolloide Vorgänge“ seien, für deren Ablauf nicht nur die Gesetze der Strukturchemie sondern ebenso, und vielleicht noch mehr, die Gesetzmäßigkeiten der Kolloidchemie von entscheidender Bedeutung seien. So hält Verf. z. B. bezüglich der Wirkungsmöglichkeit und Wirkungsintensität der genannten Fermente einerseits die Intensität, andererseits die Art ihrer Hydratation für wesentliche Faktoren: dabei glaubt er das Optimum einerseits im „mittleren Hydratationszustand“, andererseits in der „Enhydronisierung“ des Adsorptionswassers der Sole, im Gegensatz zu der „Ekhydronisierung“ des Micellarwassers der Gele zu sehen. Als Grundlage für diese Anschauung dienen dem Verf. eine Reihe zum Teil schon in älteren Arbeiten niedergelegter Befunde. So z. B. die Tatsache, daß zwischen den Zeitumsatzkurven notorisch kolloidaler, anorganischer Katalysatoren und organischer Fermente weitgehende Analogien bestehen; so der Umstand, daß durch rein dispersoidchemische Prozesse, durch die die solbildende Fähigkeit z. B. der Hefefermente vernichtet wird, auch ihre fermentative Aktivität vernichtet wird; so ferner die Tatsache, daß z. B. die Polypeptidasen der Hefe kein fixes Optimum der wahren Reaktion, sondern eine weitgehende Variationsbreite des optimalen Intervalls besitzen, u. a. m. P. Spiro (Frankfurt a. M.).

Lemay, P. et L. Jaloustre: Sur quelques conséquences microbiologiques des propriétés oxydantes du thorium X. (Einige mikrobiologische Folgen der oxydierenden Eigenschaft von Thorium X.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 22, S. 1053—1054. 1922.

Die Verff. haben früher oxydierende Eigenschaften der Radioaktivität nachgewiesen und zeigen jetzt, daß Thorium X — wohl infolge seiner oxydierenden Eigenschaft — die Entwicklung des anaeroben Bac. butyricus hemmt, das Wachstum des aeroben Bac. lacticus fördert. Groll (München).

Deskriptive Biochemie. Nahrungsmittelchemie.

● **Darmstaedter, Ernst:** *Die Alchemie des Geber.* Berlin: Julius Springer 1922. 202 S. u. 10 Taf.

Unter den arabischen Alchemisten des frühen Mittelalters galt bis auf unsere als Berühmtheit ersten Ranges ein gewisser Tschabir Ibn Hajjan, der in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts auf der arabischen Hochschule zu Sevilla in Spanien tätig sein sollte. Ihm wurde eine Anzahl Werke in lateinischer Sprache zugeordnet und der Name Tschabir im Abendlande in Geber umgewandelt. Man nahm an, daß die lateinischen Texte Übersetzungen aus den verlorengegangenen arabischen Originalen waren. Die neuere Forschung hat aber gezeigt, daß diese Schriften gar nicht ihm herrühren und einer viel späteren Zeit angehören. Sie wurden als Arbeiten des lateinschreibenden Verfassers erkannt, welche etwa im 12. bis 13. Jahrhundert entstanden sind. E. Darmstaedter hat sich das Verdienst erworben, diese schwer lesbaren Schriften zu übersetzen und zu erklären. Für ihren unbekannten Verfasser vielleicht sind es auch mehrere Verfasser — hat er den Namen Geber beibehalten. Umfaßt sich dabei um fünf Schriften, welche in dem vorliegenden Bande zusammengefaßt sind. Nach der Ausgabe Nürnberg 1541 haben sie die folgenden Titel: 1. Summa perfectionis, die Lehre von der hohen Kunst der Metallveredlung. 2. Liber de investigatione perfectionis, das Buch von der Erforschung der Metallveredlung. 3. Liber conventionis veritatis sive perfectionis, das Buch von der Auffindung der Wahrheit der Veredlung. 4. Liber fornacum, das Buch von den Öfen. 5. Testamentum Geberi, Gebers Testament. Sie enthalten wertvolle Vorschriften zur Darstellung von Präparaten; viele Gerätschaften und Operationen, wie Öfen, Apparate zum Destillieren, Sublimieren, Filtrieren sind eingehend beschrieben und durch charakteristische Zeichnungen auf zehn Tafeln sehr anschaulich dargestellt. Außerdem finden sich darin Nachrichten über das Wesen der Umwandlungsprozesse, so daß sie in praktischer wie theoretischer Hinsicht ein Bild der alchemistischen Bestrebungen jener Zeit geben. Charakteristisch für Gebers Stellung zur Wissenschaft ist seine Mahnung, nicht durch Bücherstudium, sondern durch Erforschung der Natur den Weg zur Wahrheit zu finden. Auch in der deutschen Übersetzung sind diese Schriften nicht leicht zu verstehen. Einmal wegen ihrer vielfach dunklen und unbestimmten Ausdrucksweise, dann wegen vieler Ausdrücke, die uns entweder ganz unbekannt sind oder heute eine andere Bedeutung haben. Wer würde z. B. in dem Worte „Tutia“ Zink oder zinkhaltige Erze vermuten. Für das Verständnis des Textes ist deshalb der zweite Teil des Buches unentbehrlich, welcher mehrere Hundert, zum Teil sehr umfangreiche Bemerkungen enthält. Freilich kann der Herausgeber auch nicht alle Rätsel lösen. Ein Verzeichnis alchemistischer Ausdrücke nebst Namen- und Sachverzeichnis bilden den Schluß. Die Ausstattung ist musterhaft. Über die Frage, wer Geber war und wie die Schriften entstanden sind, soll noch eine besondere Arbeit folgen, der man gewiß mit Spannung entgegensehen wird.

Richard Meyer (Braunschweig).

● **Wieland, Heinrich:** *Über den Verlauf der Oxydationsvorgänge.* (Hundertjahrfeier d. Vers. Dtsch. Naturforscher u. Ärzte, Leipzig, Sitzg. v. 20. IX. 1922.) Ber. d. dtsh. Chem. Ges. Jg. 55, Nr. 11, S. 3639—3648. 1922.

Vgl. dies. Berichte 17, 7.

● **Senderens, J.-B.:** *Déshydratation catalytique des alcools par voie humide. Pt. I. Oléfines et cyclènes.* (Katalytische Wasserabspaltung aus den Alkoholen auf feuchtem Wege. Teil I. Olefine und Cycloolefine.) Ann. de chimie Bd. 18, Ser. 9, S. 117—145. 1922.

Verf. gibt einen zusammenfassenden Überblick über seine Arbeiten auf diesem Gebiete. Der bei der Wasserabspaltung durch konzentrierte H_2SO_4 zugesetzte Sand läßt sich zweckmäßig durch wasserfreies Aluminiumsulfat ersetzen. Anstatt der für die Wasserabspaltung empfohlenen Phosphorsäure schlägt Verf. als geeigneter Pyrophosphorsäure vor. — Von 14 untersuchten Katalysatoren: Aluminiumsulfat, Kaliumbisulfat, konzentrierte Schwefelsäure finden die beiden ersten nur beschränkte, der dritte fast allgemeine Anwendung.

Bachstez (Charlottenburg).

Senderens, J.-B. et J. Aboulenc: Déshydration catalytique des alcools par voie humide. Pt. II. Ethers-sels. (Katalytische Wasserabspaltung aus den Alkoholen auf feuchtem Wege. Teil II. Ester.) *Ann. de chimie* Bd. 18, Ser. 9, S. 145—188. 1922.

Verff. teilen unter Beigabe reichen Zahlenmaterials ihre Erfahrungen auf diesem Gebiete mit. Aliphatische Säuren lassen sich durch Erwärmen mit 1—2 Vol.-% (des Veresterungsgemisches) konz. H_2SO_4 leicht verestern; aromatische Säuren verlangen 30—40 Gew.-% der organischen Säure an konz. H_2SO_4 ; fettaromatische Säuren ebenso Zimtsäure, verhalten sich wie die aliphatischen. Cyclohexanole dürfen nur 3—4% (des Veresterungsgemisches) konz. H_2SO_4 nur bis 100° erhitzt werden, sonst entstehen Cycloolefine. Dies gilt aber nur für aliphatische und fettaromatische Säuren in Gegenwart aromatischer Säuren entstehen stets Cycloolefine. *Bachstsz* (Charl.).

Thunberg, Torsten: Zur Frage des wasserstoffaktivierenden Vermögens der Zellen. (*Physiol. Inst., Univ. Lund.*) *Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim.* Bd. 7, S. 240—244. 1922.

Gewaschene Froschmuskulatur kann entgegen den Angaben von Lipschitz und Gottschalk (vgl. dies. Ber. 11, 241) m-Dinitrobenzol in Anwesenheit von Linkweinsäure, aber nicht von Rechtsweinsäure zu m-Nitrophenylhydroxylamin reduzieren; ebenso in geringem Grade in Anwesenheit von Maleinsäure. Die Steigerung der Oxydationsgeschwindigkeit der Hefe in Gegenwart Methylenblau, die der Ref. beschrieben hat, zeigt sich auch in dem System Thioglykolsäure + Methylenblau. Es scheint sich also um eine rein chemische Oxydationssteigerung zu handeln. Ebenso steigert Dinitrobenzol die Oxydationsgeschwindigkeit in alkalischer Zuckerlösung. *Meyerhof* (Kiel).

Fabre, René et Henri Penau: Sur le dosage de l'iode dans les extraits thyroïdiens (Über die Bestimmung des Jods in den Thyreoidea-Extrakten.) *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* Bd. 87, Nr. 32, S. 1026—1028. 1922.

Verff. haben mit einigen Modifikationen die von Bennier und Péron (*Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* 70, 1012) angegebene Methode zur Bestimmung des Jods in Thyreoideaextrakten angewandt. Der Extrakt wird mit KOH vorsichtig gegläht; der Rückstand wird mehrfach extrahiert und die gewonnenen Jodsalze mit KMnO_4 in Jodate übergeführt. Schließlich wird durch Zugabe von KJ und Eisessig Jod frei gemacht und wie üblich titriert. *Bachstsz* (Charlottenburg).

Hammett, F. S. and E. T. Adams: Note on a colorimetric method for the determination of small amounts of magnesium. (Bemerkung zu einer kolorimetrischen Bestimmungsmethode von kleinen Magnesiummengen.) (*Wistar inst. of anat. and biol., Philadelphia.*) *Journ. of biolog. chem.* Bd. 54, Nr. 3, S. 565—566. 1922.

Da der Asbest, der zum Filtrieren des NH_4MgPO_4 benutzt wurde, Phosphor und andere Substanzen enthält, die die Bell-Doisy'sche Farbreaktion geben, ziehen Verff. jetzt das Filtrieren das Abzentrifugieren vor. (Fällen des Mg wie früher angegeben im 25-cm-Zentrifugenröhrchen, dessen Wände gut gerieben werden, über Nacht stehen lassen, Abzentrifugieren des Niederschlags, 2 mal mit 10% NH_4OH , 1 mal mit Ammoniak-Alkohol waschen, trocknen in 10 ccm 0,1n-HCl im Röhrchen lösen, dann Weiterbehandlung wie früher beschrieben.) Verff. fanden als eine Ursache des Verblässens der Farbe bei der Bell-Doisy'schen Methode die Verwendung von alten „carbonate-sulfite“-Lösungen, in denen viel Sulfid in Sulfat oxydiert ist. Die „carbonate-sulfite“-Lösungen sollen nicht älter als 2 Wochen sein und gut verschlossen gehalten werden. Auf ungleicher Oxydation beruhende Farbdifferenzen werden beseitigt, indem wenige Kubikzentimeter der zweiten Probelösung fortgossen werden, während gleichzeitig das Colorimetergefäß mit der ersten ausgespült wird. Für jede Probelösung wird ein kleines Volumens wegen eine Standardlösung benutzt. (Vgl. diese Berichte 14, 298.)

Kaethe Börnstein (Berlin).

Gros, Raoul: Recherche, élimination et dosage de l'ammoniaque dans le chlorhydrate d'hydroxylamine. (Nachweis, Elimination und Bestimmung des Ammoniums in Hydroxylaminchlorhydrat.) *Journ. de pharm. et de chim.* Bd. 26, Nr. 12, S. 440 bis 452. 1922.

Störungen in der Neutralisation von Hydroxylaminchlorhydrat beim Formaldehydnachweis nach Brochet und Cambier (*Compt. rend.* 120, 449) beruhen auf Gegenwart von Ammoniumsalzen. Zu deren Nachweis Zerstörung des Hydroxylamins: $\text{H}_2\text{O} + 2\text{NH}_2\text{OH} + 2\text{J}_2 = 2\text{NOH} + 4\text{HJ} + \text{H}_2\text{O}$ in alkalischer Lösung; durch Na-Acetat oder KHCO_3 Hydroxylamin in Freiheit setzen und die gebildete HJ binden; Jodüberschuß durch Natrium-

posulfit beseitigen. NH_3 dann charakterisiert durch Ersatz durch anderes fixes Alkali, z. B. Nessler, durch N-Entwicklung mittels Hypobromit. In reinem, durch Spaltung von tetraphenonoxim mittels HCl erhaltenem $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ kein NH_3 nachzuweisen. — Bestimmung durch Ersatz des NH_3 in seinen Salzen mittels KHCO_3 , einstündiges Erhitzen in Wasserbad, Übertreiben des gebildeten Ammoniumbicarbonats mittels Luftstroms in Lenmeyer mit titrierter H_2SO_4 , deren Überschuß zurücktitriert wird. — Verf. fand so in einem $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ mehr als 10% NH_3 oder mehr als 31% NH_4Cl . P. Wolff (Berlin).


Biltz, Heinrich und Hans Paetzold: Über die beiden Modifikationen des Glykokolls; zugleich ein Beitrag zur Technik des Methylierens mit Diazomethan. *er. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 4, S. 1066—1073. 1922.*

Methylierung mit Diazomethan in Äther bei Ausschluß von Wasser lieferte trotz langwieriger Stickstoffentwicklung fast alles Glykokoll unverändert zurück. Verwandt und verglichen wurde das aus Wasser in Platten kristallisierte Glykokoll, sowie ein in Nadeln kristallisiertes, was durch Fällen seiner konzentrierten wässrigen Lösung mit Alkohol, Wasser, Aceton dargestellt war. Verteilungsgrad beider Präparate gleich. Zusatz von etwas Wasser beförderte die Einwirkung von Diazomethan, offenbar indem dadurch immer etwas Glykokoll gelöst wurde. Quantitative Überführung in Betain beider Präparate mit gleicher Geschwindigkeit. **alk und Sugiura** (*Journ. of biol. chem. 34, 29. 1918*) hatten einen Unterschied im Zersetzungspunkt beider Formen beobachtet, die Plattenform zersetzte sich stets einige Grade niedriger, trotzdem beide Präparate bei 100—103° getrocknet und dann pulverisiert worden waren. Verf. fanden, daß die großen Platten Mutterlaugeneinschlüsse enthalten, die sie auch bei 100° nicht abgeben. Wird aber nach dem Zerreiben bei 130° getrocknet, so zeigen beide Formen wieder die gleichen Zersetzungstemperaturen von 220—245°. So getrocknet nahm die Plattenform die gleiche Menge Bromdampf auf wie die Nadeln, wobei es sich im Gegensatz zu Falk nicht um die Bindung atomarer Mengen handeln kann. Ebenso gaben jetzt beide Formen die gleiche Ausbeute an salzsaurem Aminoacetylchlorid, als nach den Angaben von E. Fischer mit Phosphorpentachlorid bei Ausschluß von Luftfeuchtigkeit gearbeitet wurde (30 und 32 bzw. 46 und 45%). Die vermutete Isomerie besteht also nicht. Das gleiche wurde bei Alanin bewiesen.

Thomas (Leipzig).

Majima, Riko: Synthetische Versuche in der Indolgruppe. I. Kotake, Munio: Eine neue Synthese des racem. Tryptophans. (*Chem. Inst., Univ. Sendai.*) *Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 11, S. 3859—3865. 1922.*

Die Synthese ist eine Abart der bekannten Reaktionsfolge von Erlenneyer jun. zur Bereitung von α -Aminosäuren und schließt sich im besonderen derjenigen von Wheeler-Ioffmann (*Am. 45, 368; 1911*) an. β -Indolaldehyd wird mit Hydantoin beim Erwärmen mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat zu Indolaldehydantoin (I) kondensiert. Essigsäureanhydrid ist notwendig, Eisessig genügt nicht, wohl weil nur der am Stickstoff acetylierte Aldehyd kondensationsfähig ist. Das primär entstehende acetylierte Hydantoin würde dieser Annahme zufolge dann bei der Aufarbeitung der Schmelze während des Lösen in Alkali verseift werden. Durch Natriumamalgam in alkoholischer Lösung entsteht ω -Hydantoinkatal (II), das durch Kochen mit gesättigtem Barytwasser zu dl-Tryptophan aufgespalten wird. Die Ausbeuten sind verhältnismäßig hohe. I entsteht zu 46,6%, II zu 68%, III zu 53% der Theorie. Voraussetzung für die präparative Verwendung der Methode ist eine leichtere Zugänglichkeit des β -Indolaldehyds, die Verf. im Anschluß an Alessandri und Florence (*R. A. L. [5] 24, I, S. 194; 1915, vgl. auch C. C. 1914, II, S. 1400*) gelungen ist. Indol wird statt in Äther in Anisol mit Jodäthyl und Magnesium behandelt und weiter unter guter Kühlung Ameisensäureester zugesetzt. 40% der Theorie an β -Indolaldehyd lassen sich so leicht gewinnen.



Thomas (Leipzig).

Hunter, George: Note on Knoop's test for Histidine. (Knoops Histidinreaktion.) (*Inst. of physiol., univ., Glasgow.*) *Biochem. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 637—639. 1922.*

Wird zu einer Lösung von Histidin Br-Wasser in geringem Überschuß zugefügt, so entsteht durch Erhitzen, wobei auch der Überschuß des Br vertrieben wird, eine braunrote Farbe, bei genügender Konzentration des Histidin ein dunkler Niederschlag. Verf. fand, daß die Intensität der Farbe wechselt, je nach der Menge des überschüssigen Br. Bei von vornherein gefärbten Lösungen ist es schwer, gerade den richtigen Grad des Überschusses zu treffen. Die Schwierigkeit läßt sich beheben, wenn nach Zugabe eines bestimmten Überschusses die Lösung so lange mit CHCl_3 extrahiert wird, bis das letzte CHCl_3 farblos ist. Auf diese Weise können selbst stark gefärbte Fleischextrakte untersucht werden. Das CHCl_3 löst kein Histidin. Das Maximum der Farbe scheint erreicht zu sein, wenn ein Molekül Histidin gerade 3 Atome

Br aufgenommen hat. Durch diese Modifikation wird die Knoopsche Reaktion empfindlicher, daß sie noch mit Sicherheit bei einer Verdünnung des Histidin 1 : 10 000 erhalten wird und bei einer Verdünnung von 1 : 20 000 in reinen Lösungen eine leichte Färbung nachweisbar ist. Die Farbe wechselt noch mit der Acidität der Lösung; bei deutlich saurer Reaktion ist sie trüb gelbbraun, bei neutraler dunkelbraun, bei natronalkalischer Reaktion entsteht eine blaue, rote unbeständige Farbe, bei NH_3 -alkalischer Reaktion wird durch das Erhitzen rasch eine Purpurfarbe entwickelt. Die Reaktion, die Tryptophan mit Br gibt, unterscheidet sich dadurch von der des Histidin, daß die Farbe bereits in der Kälte eintritt und leicht mit Amylalkohol zu extrahieren ist. Die Farbe in der Knoopschen Probe ist unlöslich in den bräuhlichen Extraktionsmitteln. K. Felix (Heidelberg)

Baudisch, Oskar und Treat B. Johnson: Über einen neuen Nachweis von Thymin. (*Sheffield laborat., Yale univ., New Haven.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 5 Nr. 1, S. 18—21. 1922.

Die Reaktion beruht auf einer oxydativen Spaltung des Thymins, wobei Harnstoff, Acetol und Brenztraubensäure entstehen. Die Brenztraubensäure gibt die Indigoreaktion von A. v. Baeyer. Urazil, Cytosin und auch Zucker stören die Reaktion nicht. Die Spaltung des Pyrimidinrings wird mit dem System Ferrosulfat + Na-Bicarbonat + Luft herbeigeführt. Ausführung: 2,6 g reines Thymin werden in etwa 100 ccm heißem Wasser gelöst in eine Lösung von 200 g NaHCO_3 in 2 l Wasser in einem 5-l-Kolben eingegossen. Man fügt eine frisch bereitete Lösung von 100 g kryst. FeSO_4 in 500 ccm ausgekochtem dest. Wasser hinzu. Kräftig umschütteln. Schließlich bildet sich die hellbraune Farbe des $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Dauer des Prozesses $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ Stunde. Über Nacht absetzen lassen. Die überstehende Flüssigkeit wird auf dem Wasserbad erwärmt. Dabei tritt Zuckergeruch und Reduktionsvermögen gegenüber alkalischer Cu-Lösung ein. Beim Erwärmen hat sich infolge einer Cannizzaroschen Reaktion Acetol und Brenztraubensäure gebildet. Ersteres wird abdestilliert und mit o-Aminobenzaldehyd in 3-Oxychinaldin übergeführt, was sich durch eine blaue Fluorescenz anzeigt. Für die Indigoreaktion auf Brenztraubensäure wird der Rückstand der Destillation verwendet. Mit einer geringen Menge desselben erhält man durch o-Nitrobenzaldehyd und NaOH eine Abscheidung von Indigo. Mit Hilfe dieser Reaktion konnten 2—5 mg Thymin noch durch die blaugefärbte Indigolösung nachgewiesen werden. K. Felix (Heidelberg)

Steudel, H. und E. Peiser: Über Nucleinsäure-Eiweißverbindungen. (*Physiol. Inst., Univ., Berlin.*) Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 122, H. 4, S. 298—306. 1922.

Durch frühere Untersuchungen an Nucleoclupein und Nucleohiston ist festgestellt, daß diese Körper Salze der Nucleinsäure mit basischen Eiweißkörpern sind. Um nun die Kenntnisse solcher Eiweißsalze zu vergrößern, wurden Salze des Clupeins mit Guanyl und Hefenucleinsäure hergestellt. Die Analysen dieser Salze zeigen, daß sie sich nicht anders verhielten, wie die Salze der untersuchten Säuren mit organischen Basen. Endlich wurde noch das Salz hergestellt aus Eosinoclupein, welches analog zusammengesetzt ist wie die eosinophilen Granula. Die Nucleoproteide sind demnach Salze von Nucleinsäure mit basischen Eiweißkörpern, der Name wird nur aus historischen Gründen beibehalten. Das alte Schema der Aufspaltung der Nucleoproteide ist durch folgendes zu ersetzen:

Nucleoproteide (Nucleoprotamine)

Nucleinsäure Eiweiß Freise (Berlin)

Salkowski, E.: Über die Hydrolyse von Eiweißkörpern mit starker Schwefelsäure. (*Pathol. Inst., Univ. Berlin.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 1/3, S. 1 bis 20. 1922.

Verf. machte Versuche, Eiweißkörper mit starker Schwefelsäure (2 Vol. H_2SO_4 und 3 Vol. Wasser, also in 100 ccm der Mischung 73,6 g H_2SO_4) zu spalten. Die Säure wird in einem Porzellangefäß zum Sieden erhitzt und dann der Eiweißkörper portionenweise eingetragen. Wenn alles gelöst war, wurde am Rückflußkühler 3 Stunden weiter gekocht, auf den Kühler wurde ein mit Wasser beschickter Absorptionsapparat aufgesetzt. Nach der Hydrolyse wurde mit Tierkohle entfärbt. Die Spaltung war vollständig, es ließen sich keine Peptone mehr nachweisen. Die Versuche wurden durchgeführt mit Hornsubstanz, Gelatine, Bluteiweiß und Casein. Die Bildung von Harnstoffsubstanzen war gering, NH_3 wurde nicht mehr als bei den üblichen Hydrolysen gebildet, das Cystin scheint nicht zerstört zu werden, denn der Gehalt an organischem

ndenem S war in dem Hydrolysat der Hornsubstanz kaum vermindert. Dagegen werden die aromatischen Gruppen ganz zerstört. In allen Hydrolysaten fanden sich regelmäßig reduzierende Substanzen (teilweise fälschbar durch PWS) auf Glucose berechnet bei der Hornsubstanz 12—13% und beim Leim 7,6% der aschefreien Trockensubstanz des Hydrolysates. Ferner wurde in allen Hydrolysaten Brenztraubensäure nachgewiesen, die über das Jodoform bestimmt wurde; 1% bei der Gelatine und bei der Hornsubstanz weniger. Daneben scheinen auch Spuren von aliphatischen Aldehyden und Furfurol zu entstehen.

K. Felix (Heidelberg).

Lepeschkin, W. W.: The heat-coagulation of proteins. (Die Hitzeokoagulation der Eiweißkörper.) (*Botan. laborat., univ., Kasan.*) *Biochem. journ.* Bd. 16, Nr. 5, 678—701. 1922.

Die Koagulation der Proteine durch Hitze ist ein komplexer Vorgang; 1. wird durch die Wärme das Eiweiß zunächst chemisch verändert, denaturiert, und 2. das denaturierte Eiweiß koaguliert (agglutiniert), aber nur bei Gegenwart von Elektrolyten. Verf. hat die Bedingungen für diese beiden Teilvorgänge ermittelt. Die Versuche wurden mit Eialbumin und Serumalbumin ausgeführt. Die Proteinlösungen wurden mit einer Capillarpipette in ein kleines, aus Deckgläsern zusammengesetztes Gefäß gegeben, und dann die Zeit bestimmt, bis die Lösung den gleichen Grad der Trübung erreicht hat, wie ein Milchglas. Die Erwärmung wurde durch einen Thermostaten vorgenommen. — Der Temperaturkoeffizient der Denaturierung. Die Koagulation verläuft, wenn die Lösung genügend Elektrolyte enthält, im Verhältnis zur Denaturierung sehr rasch, so daß der Eintritt der Trübung auch den Eintritt der Denaturierung anzeigt. Der Temperaturkoeffizient der Denaturierung liegt für Eiereiweiß, Serum- und Serumalbumin zwischen 1,5 und 2,5 für 1° Temperatursteigerung, viz. 58 bis 40 für 10°. Daraus folgt, daß der Denaturierung ein chemischer Prozeß zugrunde liegt. — Die Natur der Denaturierung. Der Einfluß der $[H^+]$ und $[OH^-]$ auf ihren Verlauf. Die Gegenwart von Wasser ist notwendig, vielleicht geht es mit dem Eiweiß eine chemische Reaktion ein. Die Eigenschaften des denaturierten Eiweiß sind verschieden von dem ursprünglichen. Die Denaturierung verläuft als eine monomolekulare Reaktion erster Ordnung. Geringe Mengen H^+ beschleunigen sie. Versuche mit einer 0,66proz. Lösung von Eialbumin mit 0,8% $(NH_4)_2SO_4$ ergaben für die Konzentrationen von 0, 0,00016, 0,00032, 0,002 und 0,0016 Mol. HNO_3 bei 63° folgende Reaktionszeiten 2440, 1550, 1220, 315 und 11 Sekunden. Eine strenge Proportionalität steht nicht. Das Albumin besitzt an sich schon saure Eigenschaften (0,00001 n H^+). Bei gleichen molaren Konzentrationen (0,016) HNO_3 , HCl , H_2SO_4 , CH_3COOH betragen die Zeiten für die Denaturierung 167, 170, 98, 1350 Sekunden. Die beschleunigende Wirkung der Säure beruht nicht auf der Bildung von Acidalbuminen. Denn die Denaturierung ist eine Hydrolyse. Durch Zugabe von Salzen wird die katalytische Kraft der H -Ionen erhöht. Dieser Einfluß der Salze ist um so deutlicher, je geringer die Säurekonzentration ist, bei höherem Säuregehalt nimmt er ab. Die Salzwirkung macht sich bereits bei verdünnten Albuminlösungen geltend, die an sich schon H -Ionen enthalten. Größere Salzkonzentrationen fördern nicht mehr, da sie die Dissoziation der Säuren und mithin auch die Hydrolyse hemmen. Auch die OH -Ionen fördern die Denat., zunächst bei geringen Zusätzen allerdings nicht, erst wenn die H -Ionen, die eine Albuminlösung an sich schon besitzt, neutralisiert sind, macht sich ihre Wirkung geltend. Dann bilden sich Alkalialbuminate, die leichter mit Wasser reagieren als das unveränderte Albumin. Dadurch nimmt die Geschwindigkeit der Denat. etwas zu. Höhere Konzentrationen an Alkali (von etwa $10^{-2.2}$ an) haben nur geringen Einfluß, eine Erhöhung derselben bis das 60fache führt dagegen zu einer Verminderung der Denat.-Geschwindigkeit um 27%, vielleicht infolge der Erhöhung der inneren Reibung. Die Eiweißkörper können sich vor der Denat. mit Säuren und Basen vereinigen; bei der Koagulation werden dann vom Eiweiß Säuren bzw. Basen mitgerissen; daher vermindert sich durch die Hitzeokoagulation die Acidität bzw. die Alkalität. — Der Einfluß der Salze auf die

Denat.-Geschwindigkeit. Sie vermindern den Dispersionsgrad und die Oberfläche der Teilchen, so daß die Reaktion zwischen Eiweiß und Wasser verzögert wird. In schwach alkalischen Lösungen beschleunigen sie nicht. Bei der Prüfung auf die Wirkung des Anions ergab sich eine gleiche Reihe wie bei der Inversion des Rohrzuckers: $\text{SO} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{SCN}$. Von den Kationen wirken die Alkalimetalle ungefähr gleich die Erdalkalien und Schwermetalle aber so stark, daß anzunehmen ist, daß sie mit dem Eiweiß zuerst eine Verbindung eingehen, welche in Wasser löslich ist und infolgedessen auch leichter denaturiert. — Die Ursache und der Temperaturkoeffizient der Koagulation. Die denaturierten Eiweißkörper koagulieren nicht, wenn sie salzfrei dialysiert sind; erst auf Zusatz von Elektrolyten. Der Temperaturkoeffizient der denaturierten Proteine beträgt für 1° Erhöhung gewöhnlich 1,1—1,3. Er ist größer als der von As_2S_3 oder Lecithin, aber näher an dem des Lecithin, welches ungefähr in der Mitte steht zwischen den hydrophilen und hydrophoben Kolloiden. Beim As_2S_3 ist der Temperaturkoeffizient wie der der Diffusion der Salze. Die Temperaturerhöhung vermehrt die Menge Salz, welche auf die kolloiden Teilchen wirkt. Im Fall des Lecithin vermehrt die Temperatursteigerung nicht nur die Menge des wirksamen Salzes, sondern sie beeinflußt auch den Dispersionsgrad. Beim denaturierten Eiweiß sind die Verhältnisse noch komplizierter. Da wirkt die Temperatur auch noch auf die chemische Reaktion zwischen dem Eiweiß und dem Salz. Denn eine lose Verbindung derselben (Adsorptionsverbindung) erscheint sehr wahrscheinlich. — Einfluß von Säuren und Alkalien auf die Koagulation. Denaturierte Proteine sind in Alkalien und starken Säuren löslich. Aus einer Lösung in schwachen Alkalien kann das denaturierte Protein wieder gefällt werden mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, dann wieder in stärkerer NaOH gelöst und durch eine größere Menge Salz wieder gefällt werden usw. Experimente haben ergeben, daß allgemein Säuren die Koagulationsgeschwindigkeit stark vermehren und Alkalien stark vermindern. Infolge der Bildung von Säureverbindungen des denaturierten Proteins werden seine kolloidalen Eigenschaften verändert, und zwar entsprechend der Menge Säure. Ebenso verhält es sich mit der Wirkung des Alkalis. Hier ist die Zunahme der Koagulationsgeschwindigkeit der OH-Ionenkonzentration nicht proportional. Auch hier bilden sich Alkaliverbindungen, die sich anders verhalten wie das freie Protein. Der Temperaturkoeffizient der Koagulation ist in Gegenwart von Säure kleiner als bei Gegenwart von Alkali, selbst kleiner als der von As_2S_3 . Es wird angenommen, daß die Säureverbindungen des denaturierten Albumins den Suspensionskolloiden näher stehen, während die Alkaliverbindungen den Emulsionskolloiden näher stehen. Ferner hat sich gezeigt, daß die Säureverbindungen des denaturierten Proteins nicht identisch sind mit denen des nativen bei der gleichen Menge Säure. — Einfluß des Dispersionsgrades des denaturierten Albumins auf die Koagulationsgeschwindigkeit. In Gegenwart von Salzen ist der Dispersionsgrad des Albumins kleiner als ohne Salz, im ersten Fall bildet sich auch ein weniger disperses denaturiertes Albumin. Die Koagulationsgeschwindigkeit von in Gegenwart von KCl denaturiertem Albumin war 6 mal größer als bei Denat. ohne Salz. — Einfluß der Salze auf die Koagulation des denaturierten Albumins. Versuche mit lange dialysiertem Albumin scheineresultate zu haben, daß für das denaturierte Protein bezüglich der Salzkonzentration bei der Lösung zwei Optima bestehen. Die Koagulation findet statt, wenn die Salzkonzentration höher als 0,1% ist, hört auf zwischen 0,01 und 0,05%, erscheint von neuem bei 0,008% und verschwindet wieder bei ungefähr 0,0001%. Wird in solchen Versuchen das KCl durch KCNS ersetzt, so sind die Erscheinungen die gleichen, nur bei höheren Konzentrationen (2,5 Mol. pro Liter) wird die Koagulationsgeschwindigkeit vermindert, eine vollkommene Unterdrückung der Hitze-koagulation wurde nicht beobachtet. Durch die Dialyse selbst wird übrigens der Dispersionsgrad verringert. Lange dialysiertes Albumin koaguliert nach der Denat. rascher als kurz dialysiertes. Nach langer Dialyse zeigt es auch eine größere Empfindlichkeit gegen Salze. KCNS und KJ vermindern in starken Konzentrationen (mehr als 1 Mol. pro Liter) die Koagulation

geschwindigkeit. Serumalbumin wird sogar hitzeunkoagulierbar. Auch starke Ver-
dünnung vermindert die Koagulationsgeschwindigkeit bis zur Unbemerksamkeit. Ver-
suche an Albumin, das dagegen nur einige Tage dialysiert worden war, bis es nicht mehr
von selbst beim Erhitzen koagulierte, ergaben, daß die Koagulation nicht die gleiche Ab-
hängigkeit zeigt von der Salzkonzentration wie die Adsorption. Die Koagulation ist
deshalb keine einfache Adsorption der Elektrolyte, deren Ionen die kolloiden Teilchen
entladen. Wird die Salzkonzentration auf das Doppelte erhöht, so steigt die Koagu-
lationsgeschwindigkeit auf das 10—14fache. Beide Ionenarten sind von Bedeutung
in diesen Prozeß. Die Wirkung der Kationen auf die Koagulationsgeschwindigkeit
entspricht nicht ihrer Wertigkeit. Die dreiwertigen Al und Fe beschleunigen nicht
mehr als die einwertigen. Die zweiwertigen Ba und Mg wirken 33 mal stärker als die
einwertigen. Innerhalb der gleichwertigen Kationen ergeben sich folgende Reihen-
folge bezüglich der Beschleunigung der Koagulation: $\text{Li} > \text{Na} > \text{NH}_4 > \text{K}$; $\text{Ba} > \text{Mg}$;
 $\text{Fe} > \text{Al}$. In allen Fällen ist der Temperaturkoeffizient hoch (1,1), vielleicht infolge
der chemischen Einwirkung der Kationen. Die Anionen können in folgende Reihe
geordnet werden: $\text{SO}_4 > \text{Tartr.} > \text{NO}_3 > \text{Cl} > \text{Br} > \text{J} > \text{CNS}$. Die Reihe der ein-
wertigen Kationen und der Anionen sind die lyotropen Reihen, die für alle Fällungen
von Emulsionskolloide gefunden werden. Der Unterschied der Anionen wird noch deut-
licher, wenn die Koagulation in alkalischer Lösung vorgenommen wird, wodurch die
Proteine den Emulsionskolloiden noch näher rücken. Auch bei saurer Reaktion erhält
man die lyotrope Reihe der Anionen.

K. Felix (Heidelberg).

Lepeschkin, W. W.: Über die Denaturation der Eiweißstoffe bei der Hitze-
koagulation. Kolloid-Zeitschr. Bd. 31, H. 6, S. 342—345. 1922.

Hier gibt Verf. kurz den Inhalt eines Teiles seiner in dem Biochem. Journ. 16, 678; 1922
erscheinenden Arbeit wieder. Vgl. vorstehendes Referat.

K. Felix (Heidelberg).

Adler, O. und W. Wiechowski: Melaninbildung aus organischen Stoffen. (Phar-
makol.-pharmakognost. Inst., dtsch. Univ. Prag.) Ber. d. dtsch. chem. Ges. Jg. 55,
Nr. 9, S. 3030—3038. 1922.

Aus den Versuchen der Verff. an 382 Verbindungen geht hervor, daß bei der
Oxydation mit H_2O_2 in Gegenwart von FeCl_3 nur cyclische Verbindungen Melanin-
säuren geben, niemals ein aliphatischer Stoff. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Charakte-
risierung der Melaninsäuren ist die Hemmung der Blutgerinnung. Über das Ver-
halten der einzelnen Körperklassen und Verbindungen s. das Original. K. Felix.

Heiduschka, A. und E. Komm: Über Keratin. II. Mitt. (Laborat. f. Lebens-
mittel- u. Gärungschemie, Techn. Hochschule Dresden.) Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol.
Chem. Bd. 124, H. 1/2, S. 37—64. 1922.

Verf. untersucht die nach seinem neuen Spaltungsverfahren (vgl. diese Berichte
16, 181) am Keratin entstehenden Produkte. Die $1\frac{1}{2}$ -fache Wassermenge läßt das
Hydrolysat unbeeinflusst, während bei weiterem Wasserzusatz ein Teil in Lösung
geht. Der Rückstand ist schwefelreicher als das Ausgangsmaterial. In die Lösung
gehen vorwiegend Peptone, beim Ansäuern fällt aus ihr Syntonin aus. Durch Fällung
mit Ammon- oder Zinksulfat lassen sich vier Fraktionen darstellen, die in ihren Fällungs-
grenzen von denen anderer bekannter Proteosen nur wenig, und zwar nach unten
abweichen. Die ursprüngliche Lösung gab die Xanthoprotein-, Biuret- und Schwefel-
bleiprobe, sowie die Reaktionen von Millon und Adamkiewicz. Schmitz.

Lasausse, Ed.: Dosage volumétrique du cuivre et application au dosage des
sucres réducteurs. (Volumetrische Bestimmung des Kupfers und Anwendung zur Be-
stimmung der reduzierenden Zucker.) Journ. de pharm. et de chim. Bd. 26, Nr. 11,
S. 401—406. 1922.

Auf Kupferoxydul (nicht unter 300 mg) im Goochtiiegel langsam reine HNO_3 tropfen;
nach Zugabe von 1 cm trocken saugen, mit Wasser befeuchten und wieder trocken saugen;
mit 2—3 cm HNO_3 wird so das gesamte Cu gelöst. Gesamtfiltrat erhitzt, zur siedenden Lösung

tropfenweise 2proz. KMnO_4 bis zur bleibenden Rötung, dann noch während des Kochens tropfenweise Alkohol zur Reduktion des Überschusses an Permanganat (etwa 1—2 ccm); noch eine Minute kochen lassen, vom MnO_2 abfiltrieren, nachwaschen, auf 100 ccm auffüllen. 25 ccm davon zur Jodometrie in essigsaurer Lösung, daher 4 g kryst. Natriumacetat zusetzen, so daß sich der bläuliche Farbton vertieft; nach vollständiger Lösung des Acetats (evtl. schwach erwärmen) 2 g kryst. KJ zusetzen, nach dessen Lösung aus Bürette tropfenweise $\frac{n}{10}$ - oder $\frac{n}{20}$ -Hyposulfit. Wenn die Jodfärbung annähernd verschwunden, 1proz. lösliche Stärke zusetzen, dann Hyposulfit bis zum völligen Verschwinden der Blaufärbung. Die Reaktionen sind $2\text{Cu}^{++} + 4\text{J}' \rightarrow 2\text{CuJ} + \text{J}_2$; $2\text{S}_2\text{O}_3^{--} + \text{J}_2 = \text{S}_4\text{O}_6^{--} + 2\text{J}'$. Sobald (nach der 2. Gleichung) das freie Jod verschwunden, erscheint auf Grund der Reversibilität der ersten Reaktion allmählich wieder etwas freies Jod, besonders gegen Ende der Bestimmung. Indessen ist das ohne größere Bedeutung, man gelangt zu einem Punkte, bei dem eine erneute Färbung nicht wieder auftritt, bei dem also beide Reaktionen quantitativ beendet sind. Fehler etwa 1%. Die Ergebnisse einiger Versuche elektrolytisch und volumetrisch stimmen ganz oder fast ganz überein. — Zur Bestimmung reduzierender Zucker empfiehlt Verf. die Methode von Quisumbing und Thomas (dies. Ber. 11, 164), die genau geschildert wird, für sehr kleine Mengen die von Villiers (Reduktion in H-Strom); wird größte Genauigkeit gewünscht, so wirt noch obige volumetrische Cu-Bestimmung angeschlossen.


P. Wolff (Berlin).

Kiliani, H.: Neues aus der Zucker-Chemie. (II. Mitt.) (*Chem. Inst., Univ. Freiburg i. B.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 1, S. 75—101. 1922.

Die Methode, mittels Salpetersäure bei Zimmertemperatur Zuckerarten zu oxydieren (I. Mitt. dieser Berichte 7, 267), wird weiter ausgebaut. Es werden „Oxydationskolben“ beschrieben, die sich besonders zur Oxydation eignen, da sie Luftzutritt zum Oxydationsgemisch verhindern. Bei der Oxydation entstehen nicht die gewünschten Analoga der Glucuronsäure, sondern offenbar Ketonsäuren, die die CO-Gruppe in der „C₂-Stellung“ tragen: Dies wird durch eine Anzahl Reaktionen wahrscheinlich gemacht. Neben einer großen Menge von Beobachtungen und Vorschlägen zu Verbesserungen älterer Vorschriften bei der Oxydation von Zuckern bringt der experimentelle Teil folgenden: Verhalten von Glucose und Gluconsäure gegenüber Salpetersäure, Darstellung von Rhamnonsäure, Verhalten von Rhamnonsäure und Rhamnose gegen Salpetersäure, von α -Galaheptonsäure gegen Salpetersäure, Bemerkungen zur Struktur der Digitoxose und Digitoxosecarbonsäure, Darstellung von d-Galaktonsäure und von Galaheptonsäure, von l-Mannonsäure und l-Gluconsäure. Fritz Wrede (Greifswald).


Kiliani, H.: Neues aus der Zuckerchemie. (III. Mitt.) (*Chem. Inst., Univ. Freiburg i. Br.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 2, S. 493—505. 1922.

Der Fischersche Zuckeraufbau durch Anlagerung von Blausäure wird auf das entgegen gesetzte Ende des Moleküls bei der l-Mannohepturonsäure angewendet:




Nach leichtem Umschwenken von 1 Teil feinst verriebenem Lacton der l-Mannohepturonsäure im verschlossenen Kolben mit 1 Teil $\text{H}_2\text{O} + 1,2 \times$ berechneter Menge einer etwa 30proz. HCN von genau ermitteltem Gehalte $+ 1,2 \times$ berechn. 10proz. NH_3 (berechnet für Lacton $\rightarrow \text{NH}_4$ -Salz) entsteht zunächst eine klare Lösung, woraus sich nach wenigen Minuten unter schwacher Wärmeentwicklung und Gelbfärbung das Produkt A als dicker Brei abscheidet. Er wird nach 48 Stunden unter Waschen mit H_2O bis zum Verschwinden der Fehlingschen Reaktion abgesaugt und über H_2SO_4 ohne Vakuum getrocknet. Ausbeute gleich 60% der Theorie. Die Mutterlauge B wird auf weitere Mengen der zweibasischen Säure verarbeitet. A ist in kaltem H_2O nahezu unlöslich. Zur Analyse wurde ein Präparat bei größter Verdünnung hergestellt. Man erhält so das Amid-Ammoniumsalz der zweibasischen Säure, wobei das $-\text{CO} \cdot \text{NH}_2$ dem $-\text{C} \equiv \text{N}$ der in Reaktion getretenen HCN entstammt. Das bas.-Salz ist auch in kochendem H_2O äußerst schwer löslich. Zur Verseifung dient KOH. Das neutrale K-Salz löst sich in heißem Wasser ziemlich reichlich, in kaltem H_2O schwer. Die Mutterlauge B enthält noch eine erhebliche Menge von nichthydrolysiertem Cyanhydrin, das beim Kochen mit KOH wieder aufgespalten wird. Das K-Salz dient als Ausgangsprodukt für die anderen beschriebenen Verbindungen. Durch Entfernung des Metalls aus den Salzen erhält man nach den Bedingungen die α -Galaoctanhexoldsäure 1. als solche, 2. als Lactonsäure, 3.

Form ihres Doppelketons. Da das gefundene Produkt inaktiv ist, kommt für die Säure folgende Formel in Betracht:




Das Doppellacton steht folgende Formel zu:



Das Doppellacton liefert ein Doppel-Phenylhydrazid. Bei längerem Kochen der α -Galaetansaldsäure mit konzentriertem HJ entsteht keine Korksäure. — Kiliani und Winkler haben aus dem Lacton der l-Mannohepturonsäure neben dem Phenylhydrazon noch ein Benzylhydrazon-Phenylhydrazid und ein Phenol-osazon-Phenylhydrazid gewonnen. — Die l-Mannopenturonsäure verhält sich zu Jod und Natronlauge wie eine Aldose. Auch Ketoverbindungen der Zuckergruppe reagieren scheinbar gleichartig, wenn in ihrem Molekül ein endständiges H_2 neben $\text{CH} \cdot \text{OH}$ oder $\text{C} : \text{O}$ vorhanden ist. — Die β -Galaheptonsäure ließ sich vorher zur Verwendung zur Oxydation nicht in ihr Lacton verwandeln. Demnach verhalten sich die Glyoxysäuren in dieser Richtung verschieden, da z. B. die α -Galaheptonsäure ihr Lacton von selbst bildet. — Durch Einwirkung von HNO_3 auf β -Galaheptonsäure entsteht das Monolacton $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_8$ der β -Galaheptanpentoldisäure. Die Umwandlung in ein Doppellacton gelang nicht. — Erf. spricht sich gegen Bergmanns neue Definition der Zuckerarten aus. Gartenschläger.

Kiliani, H.: Neues aus der Zuckerehemie. (IV. Mitt.) (Chem. Inst., Univ. Freiburg i. B.) Ber. d. Dtsch. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 8, S. 2817—2826. 1922.

Es wird eine weitere Verbesserung der Oxydationsmethode von Zuckerarten und Polyoxysäuren mittels Salpetersäure angegeben. Diese besteht darin, daß die Salpetersäure nach der Reaktion durch mehrfaches Ausschütteln mit Äther entfernt wird. Um die Brauchbarkeit der Methode zu zeigen, werden folgende Reaktionen durchgeführt: Darstellung von l-Trioxylglutarsäure als Nebenprodukt bei der Darstellung von Ketorhamnonlacton. Darstellung von inaktiver Pentoxypimelinsäure aus α -Glucoseptonsäure. (Je 1 g fein verriebenes Lacton der α -Glucoseptonsäure — in einer Portion nicht mehr als 20 g verarbeitbar — wird mit 0,8 cem 55proz. HNO_3 [s. G. 1,35] im Oxydationskolben 4 Tage bei 17—20° aufbewahrt. Dann wird mit $\frac{1}{2}$ des Volums Wasser versetzt und 6 mal mit Äther ausgeschüttelt. Die wäßrige Schicht wird im Vacuum zum Sirup eingedampft. Nach 2—3tägigem Stehen erscheinen Krystalle, die mit wenig absolutem Alkohol gewaschen werden. Ausbeute ca. 25% d. Th. Fp 150°.) Weiter wird aus Glucose mit HNO_3 eine Säure gewonnen (s. Chem. Ber. 54, 461. 1921; 55, 79. 1922), die sich als identisch erweist mit der Oxyglucensäure von Bontroux und Bertrand (5-Keto-d-Glucoseure). Dann wird die Konstitution der Ketorhamnonäure diskutiert. Da diese in alkalischer Lösung mit Jod Jodoform gibt, muß wohl in ihr die Gruppierung CH_3CO angenommen werden. Die Ketogruppe befindet sich also an C_4 . Bei der Reduktion mit Na-Amalgam bildet sich eine neue Säure $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{O}_6$, die die Struktur



haben soll. Für sie werden die Namen 5-Epi-l-rhamnonsäure oder l-Guleonsäure vorgeschlagen. Ihr Lacton krystallisiert (Fp 152°), ebenso eine Anzahl Derivate. Zum Schluß werden noch einige Nachträge über die Konfiguration der Lävulosecarbonsäure gemacht.

Fritz Wrede (Greifswald).

Chattaway, Frederick Daniel and Hinton John Harris: The oxidation of sucrose by nitric acid. (Die Oxydation von Saccharose durch Salpetersäure.) (Queen's coll., Oxford.) Journ. of the chem. soc. (London) Bd. 121/122, Nr. 722, S. 2703—2709. 1922.

Verff. haben gefunden, daß bei der Oxydation von Saccharose mit Salpetersäure neben Oxalsäure in erheblicher Menge Mesoxalsäure entsteht. (Aus 100 g Zucker

11 g Natriummesoalat und 40 g Oxalsäure.) In gleicher Weise entsteht Mesoxalsäure bei der Oxydation von Dextrose, Lävulose, Lactose, Maltose und Stärke.

50 g Rohrzucker werden im 1,5-l-Kolben mit 700 g Salpetersäure ($D = 1,41$) versetzt und auf $72-75^\circ$ erwärmt. Dann wird die Wärmequelle entfernt, man läßt die Reaktion zu Ende gehen (ca. 25 Minuten); dann wird in einer Schale rasch eingedampft, bis die Lösung bei 74° 112 ccm ausmacht. Unter Schütteln wird auf -5° gekühlt; es scheiden sich 21 g Oxalsäure aus, die abgenutscht wird. Das Filtrat wird mit 50 g wasserfreier Soda in 3 Portionen versetzt (Temperatur steigt dabei bis 70°); man kühlt wieder auf -5° ab und es scheiden sich etwa 50 g Natriumnitrat ab. Das Filtrat hiervon wird nochmals mit 12 g wasserfreier Soda versetzt und konzentrierter Sodalösung, bis die Flüssigkeit deutlich alkalisch reagiert (ca. 40 ccm). Nach 24 Stunden scheiden sich 5–6 g mesoxalsaures Natrium als farbloses krystallinisches Pulver aus; es ist praktisch rein (Bestimmung als Phenylhydrazon). Eine Reihe substituierter Phenylhydrazone der Mesoxalsäure wurden dargestellt und dabei festgestellt, daß ihr Schmelzpunkt in weitgehendem Maße von dem Tempo des Erhitzens abhängig ist.
Bachstetz (Charlottenburg).

Haas, Paul and Barbara Russell-Wells: Note on the oxidation of carbohydrate with nitric acid. (Notiz über die Oxydation von Kohlehydraten mit Salpetersäure. *Biochem. journ.* Bd. 16, Nr. 5, S. 572–573. 1922.

Verff. erhielten beim Erwärmen von 25 g Glucose mit 100 ccm Salpetersäure ($D = 1,15$) auf dem Wasserbade nach heftiger Reaktion eine Lösung, die nach der Neutralisieren mit fester Soda sowohl Fehlingsche als auch ammoniakalische Silberlösung reduzierte. Eine Trennung der entstandenen Produkte war möglich durch Behandlung zuerst mit Bleiacetat, dann mit basischem Bleiacetat. Letztere gut ausgewaschene Fällung, liefert nach Entbleiung mit H_2S eine kräftig reduzierende saure Lösung, die beim Eindampfen ein hellbraunes, nicht krystallisierendes, allmählich nachdunkelndes Produkt. Dieses gibt mit konz. HCl erhitzt Furfurol, Derivate herzustellen, gelang nicht. Die Substanz ist, wenn auch ähnlich, nicht identisch mit Glucuronsäure. Weitere Versuche werden mit Rücksicht auf die Arbeiten Kilianis unterlassen.
Bachstetz (Charlottenburg).


Bergmann, Max, Herbert Schotte und Wolfgang Lechinsky: Über die ungesättigten Reduktionsprodukte der Zuckerarten und ihre Umwandlungen. III. Über 2-Desoxyglucose (Gluco-desose). (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoff-Chemie, Berlin Dahlem.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 1, S. 158–172. 1922.

Der Mechanismus der Glucosidbildung soll an der 2-Desoxyglucose (II) näher studiert werden. Diese entsteht aus Glucal (I) durch Einwirkung verdünnter Säure:

$$\text{CH}_2\text{OH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH} = \text{CH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_2\text{OH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHO}$$

I O II O

Die Desoxyglucose, die auch schon früher bei der Barytverseifung des Glucals beobachtet war (Fischer, Chem. Ber. 47, 203. 1914; Bergmann und Schotte, vgl. diese Berichte 7, 396), kann in reinem Zustande sowie auch in Form von mehreren Derivaten dargestellt werden. Sie gibt mit außerordentlicher Leichtigkeit mit Alkoholen bei Gegenwart von Säuren Glucoside, z. B. α - und β -Desoxymethylglucosid:



Die Glucoside werden durch Säure sehr leicht hydrolysiert, ähnlich leicht wie das sog. γ -Methylglucosid von Fischer. Hefe greift die Desoxyglucose nicht an. Auch die Methylglucoside werden von Hefe und auch von Emulsion nicht zerlegt. Die Desoxyglucose zeigt gewisse Ähnlichkeit mit der Digitoxose von Kiliani; offenbar gehören beide Stoffe derselben Körperklasse an. Zum Schluß wird eine Definition der Zuckerarten gegeben: Die einfachen Zuckerarten sind Aldehyd- oder Ketalkohole mit offener Kohlenstoffkette und einem oder mehreren Hydroxylgruppen, die denen mindestens eins in direkter Nachbarschaft zur Carboxylgruppe steht.

Versuche: Gluco-desose oder 2-Desoxyglucose. Aus Glucal und verdünnter Säure bei Zimmertemperatur. Krystalle von schwach süßem Geschmack. Schmelzpunkt nach geringem Sintern bei 148° , Aufschäumen bei 155° . $[\alpha]_D = +46,6^\circ$ (in Wasser). Reduziert Fehling. Ist gegen Säuren sehr empfindlich. Kann auch direkt aus Triacetylglucal dargestellt

werden. Von Derivaten werden beschrieben das Benzyl-phenyl-hydraxon (Schmelzpunkt 138—159°), das Methyl-phenyl-hydraxon (Schmelzpunkt 157—158°) und das p-Nitro-phenyl-hydraxinderivat (Schmelzpunkt 190—191°). α -2-Desoxy-methylglucosid (α -Methyl-glucosid). aus 2-Desoxyglucose mit ganz schwachem, HCl-haltigem Methylalkohol bei Siedetemperatur — 3 Minuten). Krystalle vom Schmelzpunkt 91—92°. $[\alpha]_D = +137,9^\circ$ (in Wasser). Tetra-methyl-glucosid, aus Gluco-desose und Benzoylchlorid in Pyridin und Chloroform. Ist wahrscheinlich nicht einheitlich. Schmelzpunkt unscharf zwischen 136—145°. (Vgl. diese Berichte 9, 338).

Fritz Wrede.

Freudenberg, Karl und Otto Ivers: Synthesen gemischt-acylierter Halogen-ester. (Bayer. Akad. d. Wissensch., München u. chem. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) Ber. dtsch. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 4, S. 929—941. 1922.

Als Ausgangsprodukt für die Glucosidsynthese dient die Aceto-bromglucose, in der einzelne Acetyle durch andere Säurereste ersetzt sind. Im Laufe der Untersuchungen wurde gefunden, daß die aus Diacetonglucose genügend zugängliche Diaceton-toluol-sulfolglucose durch Essigsig—HBr in befriedigender Ausbeute unmittelbar in das Bromid übergeführt werden kann. In gleich einfacher Weise wird aus der Diaceton-benzoylglucose eine Triacetyl-benzoyl-bromglucose (E. Fischer und Noth) gewonnen. — Die Triacetyl-toluolsulfo-bromglucose ist gegen flüssiges HBr unter Bedingungen beständig, bei denen in der Aceto-bromglucose zw. Pentacetylglucose das in 6 Stellung stehende Acetoxyl durch Br ersetzt wird. — Octacetyl-maltose verwandelt sich mit absolut-ätherischer HCl glatt in ein überaus empfindliches Chlorid. Es krystallisiert sehr gut und ist von den beiden beschriebenen Heptacetyl-chloromaltosen verschieden. Seiner Elementarzusammensetzung nach kommt es einer Octacetyl-chloromaltose am nächsten. Nach seinen Reaktionen scheint ein durch Öffnung eines O-haltigen Ringes entstandenes Additionsprodukt von HCl an Octacetylmaltose, also ein neuer Typ von acetyl-halogenzuckern vorzuliegen. — Bei den Untersuchungen wurde im Thalliumacetat in brauchbares Mittel zur Bestimmung von leicht abspaltbarem Halogen gefunden. Der experimentelle Teil beschreibt folgende Versuche: Die vereinfachte Bereitung der Diacetonglucose, die Darstellung von Diaceton-toluolsulfo-glucose und Toluolsulfo-glucose, die Rückverwandlung der Toluolsulfo-glucose in Diaceton-toluol-sulfo-glucose, die Darstellung von tetracetyl-toluolsulfolglucose, von Triacetyl-toluolsulfo-bromglucose, der Bromverbindung aus Diaceton-toluolsulfo-glucose, von Triacetyl-toluolsulfo-methyl-glucosid der Acetyl-benzoyl-bromglucose. Er gibt ferner eine neue Vorschrift für die Darstellung für Octacetyl-maltose und für eine neue Aceto-chloromaltose an.

Gartenschläger (Leverkusen).

Bridel, M. et G. Charaux: La centaureidine, produit de dédoublement de la centaureine, glucoside des racines de Centaurea Jacea L. (Das Centaureidin, Spaltungsprodukt des Centaureins, des Glykosids der Wurzeln von Centaurea Jacea L.) Apt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 23, S. 1168 bis 1170. 1922.

Centaurein (vgl. diese Berichte 16, 460) spaltet sich mit H_2SO_4 in 34,48% Glucose und 68,96% Centaureidin (gefunden 33,68 bzw. 70,77), das aus 50 proz. Alkohol umkrystallisiert wird. Krystallinisches gelbes Pulver, etwas dunkler als Centaurein. Mikroskopisch ziemlich lange Nadeln. Geschmacklos. Verliert im Vakuum bei 50° in 18 Stunden 7,98% Wasser. Schmilzt im Maquenneblock bei 197°, wasserfrei bei 203°. Unlöslich in Wasser, löslich in Methyl-, Äthylalkohol, Essigsäure, Phenol, in der Kälte sehr wenig löslich in Äther, Chloroform, Benzol, Toluol, Nitrobenzol, Äthylendibromid; von H_2SO_4 goldgelb gelöst, daraus mit Wasser gefällt. Ammoniak, verdünnte Soda, die Alkalicarbonate in wässriger Lösung lösen es mit goldgelber Farbe; Zusatz von verdünnter H_2SO_4 zur Lösung in Soda fällt es krystallinisch aus. Es verbrennt schwer und erst in mehreren Stunden bei der Elementaranalyse. Molekulargewicht (in Essigsäure) 335 (berechnet 360). Methoxyl nach Zeisel 21,85 und 21,07%. Vielleicht handelt es sich um ein Flavonderivat, nach Farbe, Eigenschaften und den Erfahrungen bei anderen gefärbten Pflanzenstoffen, wie Apigenin, Quercetin usw. P. Wolff (Berlin).

Rosenthaler, L. und K. Seiler: Über die Lokalisation der Blausäureglykoside und des Emulsins in bitteren Mandeln und Kirschlorbeerblättern. Ber. d. dtsch. pharmazeut. Ges. Jg. 32, H. 7, S. 245—248. 1922.

Die Methode beruht auf dem von Rosenthaler gefundenen Prinzip, daß durch Jod schwach gebläute Stärkekörner durch geringste Spuren Blausäure entfärbt werden. Es wird zu mikroskopischen Schnitten eine dicke Aufschwemmung geodeter Reistärkekörner gegeben und zum Nachweis von Amygdalin bzw. Prulaurasin 1 Tropfen einer 1 proz. Lösung von Emulsin in 50 proz. Glycerin, zum Nachweis von Emulsin eine entsprechende Lösung von Amygdalin hinzugefügt. In bitteren Mandeln ist Amygdalin ziemlich ausgedehnt verbreitet, nicht in der Samenschale, in Kirschlorbeerblättern Prulaurasin nur in bestimmten Schichten; Einzelheiten im Original. — Emulsin findet sich in Mandeln wie Kirschlorbeerblättern an den gleichen Orten wie Amygdalin und Prulaurasin.

P. Wolff (Berlin).

Hérissey, H.: Synthèse biochimique d'un d-mannoside α à partir de mannanes (Biochemische Synthese eines d-Mannosids α , indem man von Mannan ausgeht. Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 22, S. 1110—1112. 1922)

Läßt man Luzernpulver, das Mannosidase enthält, auf die Samen von Johannisbrot, welche Mannan enthalten, in Gegenwart von Methylalkohol einwirken, so entsteht das d-Mannosid α . Es wird angenommen, daß es für viele biochemische Synthesen zweckmäßig sein wird, nicht von dem isolierten Zucker, sondern von dem Naturprodukt auszugehen, aus dem der betreffende Zucker durch Spaltung gewonnen wird. *Jacoby.*

Dischendorfer, Otto: Über das Cellulose-reagens Kupferoxydammoniak. (*Botan. Inst., Techn. Hochschule, Graz.*) Zeitschr. f. wiss. Mikroskop. Bd. 39, H. 2, S. 97—121. 1922

Bei der Herstellung des Kupferoxydammoniaks herrscht noch immer große Unsicherheit, ebenso ist die Haltbarkeit eine sehr verschiedene. Oft versagt es ohne einen ersichtlichen Grund. Verf. versucht diese Erscheinungen aufzuklären. Der celluloselösende Bestandteil des Reagens ist die Base $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH})_2$. Sie ist kolloidaler Natur und kann von den Krystalliden durch Dialyse getrennt werden. Starke Verdünnung der ammoniakalischen Lösung mit Wasser führt zur Ausfällung von $\text{Cu}(\text{OH})_2$, ebenso wirken Elektrolyte fällend. Kupferoxydammoniak an der Luft stehen gelassen, nimmt Sauerstoff auf. Das Ammoniak wird dabei zu salpetriger Säure oxydiert. Es bildet sich Kupferammonnitrit, das wohl eine tiefblaue Färbung besitzt, aber Cellulose nicht mehr löst. Besonders rasch geht dieser Vorgang bei Anwesenheit von metallischem Kupfer vor sich. Daraus folgt, daß die fertige Lösung immer gut verschlossen aufbewahrt werden muß. Am besten füllt man kleine Flaschen ganz auf und verbraucht sie einzeln. Die reinsten Lösungen erhält man durch Auflösen von gut gewaschenem Kupferhydroxyd in möglichst wenig starkem Ammoniak. Man läßt sie in verschlossenen Flaschen 1—2 Tage stehen, worauf sie gebrauchsfertig sind. Geht man von Kupferspänen aus, so schüttelt man sie mit starkem Ammoniak und dem 40fachen Volumen Luft. Stärkerer Sauerstoffzutritt vermehrt nur die Nitritmenge und beeinträchtigt die Wirksamkeit der Lösung. Von den Kupferspänen muß abgesehen werden. Je niedriger die Temperatur desto mehr Kupfer löst sich. Die Celluloselösung, die wahrscheinlich auf Adsorption beruhet, geht bei niedrigen Temperaturen ebenfalls rascher vor sich. Erwärmen zerstört die Lösungskraft vorübergehend. Bei stark mit Ammoniak verdünntem Reagens tritt wohl noch Quellungs- aber keine Lösung der Cellulose mehr ein. *H. Walter (Heidelberg).*

Klason, Peter: Über das Lignin, wie es im Holz selbst vorkommt. Ber. dtsch. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 2, S. 455—456. 1922.

Durch eine lange Reihe von Auskochen, alternierend mit Wasser und Alkohol, werden etwa 12% vom Gewicht des Holzes herausgelöst. Das Lösungsmittel wird schwach mit Essigsäure angesäuert. Man erhält außer Kohlehydraten zu 2% vom Gewicht des Holzes ein Harz. Nach Entfernung der Coniferenharze mit Petroläther erhält man einen in CHCl_3 löslichen und einen in Alkohol und Eisessig löslichen Teil. Dieser beträgt 1% des Holzgewichts. Er wird erst bei 130° vollständig wasserfrei. Mol.-Gew. 380. Dieses Lignin besteht vermutlich zu $\frac{2}{3}$ aus α -Lignin und zu $\frac{1}{3}$ aus β -Lignin. Es zeigt sehr gute Ligninreaktionen (mit β -Naphthylamin-Hydrochlorid). Dieses α -Lignin enthält einen unveränderten Acroleinkomplex, der vermutlich in Acetalform an die Hemicellulose gebunden ist und frei wird, wenn letztere in Lösung geht. Das Molekulargewicht dieses Lignins ist doppelt so groß wie das des Coniferylaldehyds. Dieses Lignin ist wie die Sulfonsäure optisch inaktiv.

Gartenschläger (Leverkusen).


Klason, Peter: Beitrag zur Kenntnis der Konstitution des Fichtenholz-Lignins (II.) Ber. d. dtsch. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 2, S. 448—455. 1922.

Der größere Teil des Fichtenholz-Lignins hat die Formel $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_7$ (Acrolein- oder α -Lignin). Die abspaltbare Acetylgruppe kommt als Essigsäure in der Sulfitablauge vor. Der Rückstand findet sich in der Abblauge als Ca-Salz der α -Ligninsulfonsäure von der Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_6 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{O}$. Das Salz gibt mit β -Naphthylamin-Hydrochlorid einen gelben Niederschlag ($\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_6 + \text{H}_2\text{S} + \text{C}_{10}\text{H}_7 \cdot \text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Es ist ein inneres Ammoniumsalz mit am Aldehydkomplex

koppeltem Naphthylamin: $\text{R} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} \begin{matrix} \text{SO}_2 \cdot \text{O} \\ \text{CH} : \text{NH} \cdot \text{C}_{10}\text{H}_7 \end{matrix}$. Es ist in H_2O sehr wenig löslich.

CaCl_2 fällt nur die α -Ligninsulfonsäure aus der Abblauge aus. Das β -Naphthylaminsalz ist wenigstens teilweise kolloidaler Natur. Völlig getrocknet ist es unschmelzbar. Frisch gefärbt und ausgewaschen ist es feucht in CH_3OH leicht löslich. Wenn die Sulfitabblauge dunkel gefärbt ist, enthält die Säure weniger S als normal und ist für Ligninuntersuchungen nicht geeignet. In schwach alkoholischer Lösung wird ein anderes Verhalten beobachtet. Wenn man nach Abtrennung des reversiblen Sulfits mit NH_3 aus der frischen Abblauge das Naphthylaminsalz darstellt, ist es wie vorher zusammengesetzt. — Das α -Salz ist gelblich-weiß gefärbt und ein fast ebenso unlöslicher Niederschlag wie das β -Salz. Es ist ein normales Ammoniumsalz.

n die α -Lignosulfonsäure läßt sich mit Methylsulfat nur ein CH_3 einführen. Es ist ein inneres Ammoniumsalz. — Das β -Naphthylaminsalz aus Ammoniak- α -Lignosulfonsäure ist gelbbraun. Das β -Salz aus α -Lignooximsulfonsäure ist luftbeständig, entweder regulär kristallisiert oder bildet ein anisotropes Medium mit sehr niedriger Doppelbrechung. Die Säure verhält sich in den Salzen wie eine zweibasische Säure. — Es wird weiter beschrieben das Kondensationsprodukt der α -Säure mit Semicarbazid, die Oxydation durch H_2O_2 , wobei der Aldehydcomplex zu einem Carboxyl oxydiert und daneben eine CH_2 in eine CO -Gruppe übergeführt wird, und die Acetylierung des β -Naphthylaminsalzes. Bei letzterer Reaktion werden in das Molekül 2 Acetylkomplexe eingeführt. Nach den Ergebnissen kommt für das Lignin nunmehr folgende Formel in Betracht:



Es können sich aber auch 2 Mol. Coniferylaldehyd zu 1 Mol. Lignin zusammengeschlossen haben. Die α -Lignosulfonsäure ist optisch inaktiv. *Gartenschläger* (Leverkusen).

Freudenberg, Karl und Erich Vollbrecht: Der Gerbstoff der einheimischen Eichen. (10. Mitt. Über Gerbstoffe und ähnliche Verbindungen.) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 8, S. 2420—2423. 1922.

Es hat sich gezeigt, daß der von K. Freudenberg und H. Walpuski (vgl. diese Berichte 10, 184. 1922) aus dem Holze der Edelkastanie isolierte neuartige Gerbstoff besser aus den frischen Blättern der Eiche (*Quercus pedunculata*) als aus dem rüheren Ausgangsmaterial zu gewinnen ist. Das Wesentlichste der vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung ist folgendes: Der durch Abkochen der frischen Blätter über das Bleisalz isolierte Gerbstoff wird durch Vakuumextraktion im Dakinschen Apparat mit Essigester von freier Ellagsäure und Quercetin-glucosiden und durch fraktionierte Fällung mit Äther aus alkoholischer Lösung von beigemengten, aus dem Gerbstoff selbst entstandenen Kondensationsprodukten befreit. Die Ausbeute beträgt 75% des gesamten Blattgerbstoffes. Er ist ein amorphes, in Wasser, Alkohol, Aceton leicht lösliches rotgelbes Material der Zusammensetzung: $\text{C } 49,9\% : \text{H } 4,2\%$, dreht im Mittel 35° links und ist stark sauer. Das titrimetrisch bestimmte Äquivalentgewicht beträgt rund 400; er enthält 23–25% gebundene Ellagsäure und etwa 5% gebundene Glucose. Der Rest des Moleküls ist eine amorphe Säure, welche die Verff. Quercussäure nennen. Auf Grund des Studiums der sauren und alkalischen Hydrolyse des Eichengerbstoffes wird gefolgert, daß er das Glucosid der Quercussäure ist, die ihrerseits mit Ellagsäure zu einem Depsid verestert ist. Die selber gerbstoffartige Quercussäure, welche durch Säuren und Alkalien verändert wird, kann durch Abbau des Eichengerbstoffes mit Tannase in unversehrtem Zustande isoliert werden. Am vorteilhaftesten erweist es sich für die präparative Darstellung der Quercussäure, den fermentativen Abbau durch *Aspergillus niger* bei seinem Wachstum auf den Fruchtbecher-Gallen von *Quercus pedunculata*, — den in der Gerbereitechnik bekannten „Knoppert“, — bewirken zu lassen, die den gleichen Gerbstoff wie die Blätter, jedoch in ergiebigerem Maße enthalten. Die Quercussäure ist im Gegensatz zur Muttersubstanz optisch inaktiv. Eine Zerlegung in definierte Spaltstücke gelang bisher nicht. Phloroglucin, das frühere Autoren aus dem Eichengerbstoff erhalten haben, konnte also nicht festgestellt werden. Er ist demnach keinesfalls ein Phloroglucingerbstoff. Solange der Eichengerbstoff unverändert ist, zeigt er keine Neigung zur Bildung von „Gerbstoffrot“.

O. Gerngross (Berlin).

Freudenberg, Karl und Wilhelm Szilasi: Zur Kenntnis des chinesischen Tannins. (11. Mitt. Über Gerbstoffe und ähnliche Verbindungen.) (*Chem. Inst., Univ. Freiburg i. B.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 8, S. 2813—2816. 1922.

Es ist bekannt, daß die spezifische Drehung des Handelstannins in wässriger Lösung wechselnde Werte und eine eigentümliche Abhängigkeit von der Konzentration, nämlich ein Anwachsen mit zunehmender Verdünnung zeigt. Durch teilweise Fällung von wässrigen Lösungen des gewöhnlichen chinesischen Tannins mit Zinkacetat und Regeneration des Gerbstoffes aus den Zinkniederschlägen und deren Filtraten konnte

L. F. Iljin (Ber. d. Dtsch. chem. Ges. 47, 985. 1914) aus den Filtraten ein in Wasse hochdrehendes Präparat von $[\alpha]_D = +137^\circ$ und aus den Zinkniederschlägen ein bloß $[\alpha]_D = +5^\circ$ polarisierendes, also niedrigdrehendes Tannin gewinnen. Die Verff bestätigen zunächst an einem aus chinesischen Zackengallen bereiteten Tannin die Beobachtungen Iljins. Es ergibt sich aber das überraschende Resultat, daß die in Wasser so verschieden drehenden Präparate in organischen Lösungsmitteln die gleiche Drehung, und zwar fast unabhängig von der Konzentration zeigen. Es wird daher geschlossen, daß das unterschiedliche optische Verhalten von Tanninlösungen in Wasser durch die kolloide Beschaffenheit der Lösung, die in organischen Mitteln wegfällt, veranlaßt ist, und zwar muß es eine der Menge nach unbedeutende von den Tanninteilchen adsorbierte Beimengung sein, die die optischen Eigenschaften des Hauptanteils beeinflußt. Das oben erwähnte Wachsen der spezifischen Drehung mit abnehmender Konzentration der Lösung wird im Einklang mit dieser Ansicht dadurch erklärt, daß mit wachsender Verdünnung aus der Adsorptionsverbindung freie Tanninteilchen zurückgebildet werden. Es gelingt den Verff. in relativ einfacher Weise den die Drehur beeinflussenden kolloiden Stoff zu beseitigen und ein in 1,5 proz. wässriger Lösung $+138^\circ$ spezifisch drehendes Tannin zu bereiten. Zu diesem Zwecke ziehen sie die Galle nicht wie bisher in der Wärme, sondern bei Zimmertemperatur mit Wasser aus. Da wie üblich mittels Essigester aus der Lösung extrahierte Tannin wird dann bei 100 im Vakuum entwässert, in vollkommen trockenem Essigester kalt gelöst und dies zweimal wiederholt. Dabei bleibt die in Essigester unlöslich gewordene, die Drehur beeinflussende Verunreinigung zurück.

O. Gerngross (Berlin).

Rosenmund, Karl W. und E. Pfannkuch: Zur Kenntnis des Gallusaldehyds und seiner Derivate. (*Pharmazeut. Inst., Univ. Berlin.*) Ber. d. dtsch. chem. Ges. Jg. 5. Nr. 8, S. 2357—2372. 1922.

In Anbetracht der wichtigen Rolle, welche die Gallussäure bei dem Aufbau von pflanzlichen Stoffen, insbesondere Gerbstoffen spielt, werden die Eigenschaften des von Rosenmund und Zetzsche (Ber. d. D. chem. Ges. 51, 598. 1918) schon früh dargestellten Gallusaldehyds näher untersucht und einige Synthesen mit dieser Verbindung als Ausgangsmaterial durchgeführt. Der Gallusaldehyd wird durch Reduktion von Triacetyl-galloylchlorid in siedendem Xylol im Wasserstoffstrom unter Verwendung von Palladium-Bariumsulfat als Katalysator und Verseifung des Triacetyl-gallusaldehyds mit Kaliumacetat in alkoholischer Lösung dargestellt. Er ist entgegen früheren Angaben schwächer sauer als Essigsäure, aber etwa doppelt so sauer wie Pyrogallol. Bei der katalytischen Reduktion des Gallus-aldoxims: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH} : \text{NH} \cdot \text{O}$ entsteht als Hauptprodukt nicht Gallylamin, sondern Di-gallylamin: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot (\text{OH})_3$, das als Chlorhydrat vom Schmelzpunkt 208—21 isoliert wird. Das salzsaure Gallylamin: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{NH}_2 \cdot \text{HCl}$ kann jedoch durch katalytische Reduktion von Triacetyl-Gallus-aldoxim-acetat: $(\text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{O}) \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH} : \text{N} \cdot (\text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3)$ in Eisessiglösung und Verseifung des dabei entstehenden Triacetyl-Gallylamins mit Salzsäure als eine kristallisierende Verbindung vom Zersetzungspunkt 225—226° erhalten werden. Dieses Amin, desgleichen das Digallylamin und ihre Acetylverbindungen zeigen nach Versuchen von Zondek-Berlin und Wolff-Berlin kräftige kontraktionsanregende Wirkung am isolierten Meerschweinchenuterus. Versuche durch Reduktion von Trioxy-nitro-styrol: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot \text{NO}_2$, das aus Gallusaldehyd und Nitromethan entsteht, dem pharmakologisch interessanten β -Gallyl-Äthylamin: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{N}$ zu gelangen, scheiterten. Es werden ferner, neben einigen anderen weniger wichtigen Verbindungen, aus Gallusaldehyd und wasserfreier Blausäure das Gallus-aldehyd-cyhydrin: $(\text{OH})_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{CN}$ und die entsprechende Tetracetyl-Verbindung hergestellt, endlich aus Gallusaldehyd und Methylketol das 3,4,5-Trioxyphenyl- $[\alpha$ -Methyl-indolyden]-methan und aus Gallusaldehyd und Indoxylsäure das Indogenid des Gallusaldehyds.


O. Gerngross (Berlin).

Braun, Julius v. und Paul Wolff: Über Benzo-polymethylen-Verbindungen, III.: Cyclische Analoga des Atophans. (*Landwirtschaftl. Hochsch., Berlin u. chem. nat., Univ. Frankfurt a. M.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 11, S. 3675—3688. 1922.

Infolge der jetzt leichteren Zugänglichkeit des α -Tetralons konnte eine Reihe von etracyclischen Verbindungen (vom Typus II) dargestellt werden, die das Gerüst des 1-Naphaecridins enthalten und sich in ihrer Konstitution vom Atophan (I) prinzipiell dadurch unterscheiden, daß zwischen dem α -ständigen Phenylrest und dem N-haltigen Kern eine Brücke geschlagen ist.



Nach den von Pohl ausgeführten Untersuchungen tritt die harnsäureausschwemmende Wirkung in diesen „Tetraphanen“ zurück gegen eine eigenartig erregende, etwa der des Strychnins vergleichbare, deren klinische Erprobung im Gange ist (vgl. Iann, Klin. Wochenschr. 1922, Nr. 52). Bei der Suche, welche Atomgruppierung wohl für diese Wirkung verantwortlich sei, zeigte sich: Substitutionen an den Benzolernen, besonders an dem linear stehenden ausgeführt (CH_3 , Cl, Br), ändern qualitativ nichts, bei Substitution durch Cl findet sich eine Zunahme der Wirkung, ähnlich wie echlortes Strychnin stärker krampferregend wirkt als Strychnin selbst; dagegen wirkt Iethylierung an dem dem N zunächst benachbarten C abschwächend, auch zeichnet sich der N hier dank dieser Nachbarschaft durch große Trägheit aus, woraus folgt, daß der N des Tetraphans ein gewisses Maß von Additionsvermögen, also Basizität besitzen muß. Die Gegenwart des Carboxyls ist notwendig, denn die leicht aus den Säuren erhältlichen Basen haben nicht mehr die geschilderte Wirkung aufzuweisen. Der eingeschaltete Ring muß ein Sechsring sein, ein Fünfring ist ebenso unwirksam wie eine exzentrische Lage des neuen Ringes, etwa



Der Sechsring muß also zwischen dem Pyridin- und dem zum N α -ständigen Benzolern liegen. Die Kohlenstoffkette — $\text{CH}_2 - \text{CH}_2$ —, die im Tetraphan einen Bestandteil dieser Brücke bildet, braucht nicht so wasserstoffreich zu sein; auch nach ihrer Dehydrierung ist die pharmakologische Wirkung die gleiche. Ob auch eine isomere Lage des Naphthalinkerns (linear oder „nach oben“) zulässig ist, konnte wegen derzeitiger Unmöglichkeit der Synthese noch nicht entschieden werden. Störend auf dieses Gesamtergebnis wirkt, daß eine weitere Hydrierung (des Pyridinkerns) zum Tetrahydrotetraphan die Wirkung abschwächt, während gerade das Tetrahydroatophan, auch im Pyridinkern hydriert, eine mit dem Tetraphan weitgehend übereinstimmende Spinalregung zeigt. Auch hier also wieder der Widerspruch wie so häufig bei Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution und pharmakologischer Wirkung.

P. Wolff (Berlin).

Windaus, A. und W. Grosskopf: Über das Ergosterin der Hefe. (*Allg. chem. Univ.-Laborat. Göttingen.*) Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 124, H. 1/2, S. 8-14. 1922.

Aus 10 kg Preßhefe wurden durch Ätherextraktion und Umkrystallisieren aus Petroläther und aus Alkohol feine silberglänzende Blättchen eines Sterins mit dem Schmelzp. 154° gewonnen; Ausbeute 15 g. Weitere Reinigung durch Überführung in das charakteristische Acetat mit Schmelzp. $180-181^\circ$, das mit dem von Tanret aus Mutterkorn dargestellten


Ergosterylacetat identisch ist. Bei der Hydrierung des Ergosterylacetats mittels Palladium schwarz wurde soviel H gebunden, als 3 Doppelbildungen entspricht, und damit der Befund von Mac Lean und Thomas, die ein entsprechendes Verhalten des Mutterkornsterins bei Bestimmung der Jodzahl fanden, bestätigt. Aus dem hydrierten Acetat wurde der freie Alkohol dargestellt: feine Blättchen mit dem Schmelzp. 129°, denen dieselbe Formel $C_{27}H_{48}O$ wie den Dihydrocholesterin, Coprosterin und Sitostanol zukommt. Das Ergostanol ist aber mit keinem dieser Körper identisch. Es wurde fernerhin der gesättigte Kohlenwasserstoff Ergostan $C_{27}H_{54}$ bereitet, der von den 3 entsprechenden Kohlenwasserstoffen Cholestan, Koprostan und Sitostan verschieden ist. Er gibt schöne weiße Blättchen mit Schmelzp. 72—73°, leicht löslich in Äther und Chloroform, schwer in absolutem Alkohol und Methylalkohol. Er dreht $[\alpha]_D^{+20} = +24,6$ und ist wahrscheinlich ein Stereoisomeres der 3 genannten Kohlenwasserstoffe. Aus dem Ergostan wurde zuletzt durch Oxydation mit Chromsäureanhydrid Ergostanon dargestellt. Das Keton krystallisiert in feinen weißen Nadelchen, die leicht löslich in Äther und Chloroform schwer in kaltem Methylalkohol, unlöslich in Wasser sind. Schmelzp. 56—57°. *Groß.*

Fauré-Fremiet, E. et Henriette, Garrault: Etude des substances grasses et lipoides del'œuf de Truite (Trutta fario). (Untersuchungen über die Fett- und Lipoidsubstanzen des Forelleneies.) Bull. de la soc. de chim. biol. Bd. 4, Nr. 7, S. 379—387. 1922.

Die Fett- und Lipoidsubstanzen bebrüteter Forelleneier lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1. Phosphatide, 2. Oleomyristylglyceride, 3. Cholesterinäther (?). Auf das Trockengewicht der Eier berechnet, beteiligen sich diese Substanzen annähernd folgendermaßen: Phosphatide wenigstens 8,25%, Glyceride ungefähr 10%, Cholesterin 1,37%. Die Äther des Cholesterins konnten nicht rein dargestellt werden, verblieben in den letzten Fraktionen und betragen 3,3% des Trockengewichtes. Betreffs Technik werden auf zwei Schwierigkeiten der Kumagawa-Sutoshen Methode hingewiesen: 1. es bildet sich ein sehr reichlicher N-haltiger Niederschlag (Vitelline), welcher fast $\frac{1}{2}$ der gesamten Lipoidmenge enthält; 2. die unvollständige Verseifung der Glyceride was einen bedeutenden unverseifbaren Rückstand verursachen kann. Was die Histologie anbelangt, ist es wahrscheinlich, daß die des öfteren in der Randschicht des Eicytoplasmas gefundenen öligen Tröpfchen aus Oleomyristylglyceride bestehen. Phosphatide und Cholesterin befinden sich scheinbar in einer innigeren Verbindung mit dem Zellecytoplasma. (Vgl. diese Berichte 17, 16.) *G. Farkas* (Budapest).

Borsche, W. und F. Hallwass: Untersuchungen über die Konstitution der Gallensäuren. IV. Über Redukto-dehydrocholsäure. (Allg. chem. Inst., Univ. Göttingen) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 9, S. 3318—3323. 1922.

Redukto-dehydrocholsäure $C_{24}H_{36}O_5$ resp. deren Äthylester $C_{26}H_{40}O_5$ wurde aus Dehydrocholsäure resp. deren Äthylester durch Reduktion in Eisessiglösung beim Schütteln mit Wasserstoff und Palladiummohr resp. beim Kochen in einer wasserhaltigen Mischung von Äther und Benzol mit amalgamiertem Aluminium erhalten. Der Ester geht bei der Destillation unter vermindertem Druck in Diketocholeensäureäthylester $C_{26}H_{38}O_4$, dieser durch Reduktion mit Wasserstoff in den Äthylester des β -Diketocholeensäure $C_{24}H_{36}O_4$ über, in welchem das Carbonyl des Ringes I nicht mehr vorhanden ist. Demnach ist in der Redukto-dehydrocholsäure das Carbonyl dieses Ringes reduziert, womit übereinstimmt, daß sich das Carbonyl des Ringes weder in neutraler noch in alkalischer Lösung reduzieren läßt. Während nun α -Diketocholeensäure schon durch Na-Amalgam zur Oxy-Ketosäure $C_{24}H_{38}O_4$ reduziert wird, versagte die Reduktion selbst mit amalgamiertem Aluminium beim Ester dieser Säure. Auch Biliansäure wird in alkalischer Lösung durch Natriumamalgam nicht verändert, ihr Trimethylester, in feuchtem Äther gelöst, durch amalgamiertes Aluminium nur langsam und unvollkommen angegriffen.




Versuche: 2 g Dehydrocholsäure in 40 ccm Eisessig gelöst nehmen bei 3stündigem Schütteln mit Wasserstoff unter Zusatz von 1 g Pd-Schwarz etwa 1 Mol. H_2 auf. Die nach dem Verdampfen des Eisessigs im Vakuum verbleibende rohe Säure wird über den Äthylester gereinigt. Letzterer wird auch erhalten beim Erhitzen einer Lösung von 5 g Dehydrocholsäureäthylester in 120 ccm warmem Benzol und 120 ccm Äther mit 15 g frisch amalgamiertem Aluminiumgrieß, zu der man vorsichtig 1—2 Tropfen Wasser in der Minute fließen läßt. Nach 1—8 Stunden wird filtriert und eingedampft, der ölige Rückstand aus verdünntem Alkohol umkrystallisiert. $C_{26}H_{40}O_5$, derbe weiße Prismen, Schmelzpunkt $153—154^\circ$. Redukto-lehydrocholsäureäthylesterdioxim $C_{26}H_{42}O_5N_2$, farblose Blättchen aus verdünntem Alkohol, Schmelzpunkt $239—240^\circ$. Redukto-dehydrocholsäure $C_{24}H_{36}O_5 + H_2O$, aus dem Ester durch Verseifung. Farblose feine Nadeln aus Alkohol, Aceton oder Essigsäure nach Verdünnung, lie bei 112° sintern und bei $186—187^\circ$ schmelzen, das Wasser wird bei 125° abgegeben. Redukto-dehydrocholsäuredioxim $C_{24}H_{38}O_5N_2$, farblose Blättchen aus verdünntem Alkohol, Schmelzpunkt 255° unter Zersetzung. Redukto-dehydrocholsäure-methylester $C_{25}H_{38}O_5$, derbe Nadeln aus Methylalkohol, Schmelzpunkt $155—156^\circ$. Redukto-dehydrocholsäure-methylesterdioxim $C_{25}H_{40}O_5N_2$, farblose Blättchen aus Methylalkohol, Schmelzpunkt 258° unter Zersetzung. Redukto-dehydrocholsäureäthylester verflüchtigt sich beim Erhitzen in Portionen von 1 g auf etwa 300° Badtemperatur vollständig, im Retortenhals setzen sich farblose, glasig erstarrende Tropfen ab, der Gewichtsverlust entspricht 1 Mol. Wasser. Das Destillat wird in Alkohol aufgenommen, auf etwa 5 ccm eingengt und heiß mit Wasser bis zur Trübung verdünnt, beim Erkalten krystallisiert der Diketocholsäureäthylester $C_{26}H_{38}O_4$ in langen, farblosen Nadeln, Schmelzpunkt 143° . Sein Dioxim, $C_{26}H_{40}O_4N_2$ krystallisiert aus Alkohol in fettglänzenden Blättchen, Schmelzpunkt 228° . Diketocholsäure, $C_{24}H_{34}O_4$, nach Verreiben des Esters mit Natriumäthylat aus der mit Wasser verdünnten Lösung durch Salzsäure. Farblose Prismen aus wenig Eisessig oder Alkohol, Schmelzpunkt 174° . Durch Reduktion des Esters mit Wasserstoff vermittelt durch Pd-Mohr entsteht β -Diketocholsäureäthylester, Nadeln aus verdünntem Alkohol, Schmelzpunkt $152—153^\circ$. Sein Dioxim, flimmernde Blättchen, schmilzt bei 242° . — α -Diketocholsäure läßt sich, in 0,1 n-Natronlauge gelöst, bei Wasserbadtemperatur unter Durchleiten von CO_2 reduzieren, Salzsäure fällt dann Oxyketocholsäure $C_{24}H_{38}O_4 + H_2O$; farblose, oft garbenartig zusammengelagerte Nadeln aus verdünnter Essigsäure. Sinterung bei 107° , Schmelzpunkt gegen 160° . Das Sintern beruht auf der Abgabe von Krystallwasser. Der Äthylester der Säure krystallisiert aus Alkohol in Prismen vom Schmelzpunkt $131—132^\circ$. Die Säure kondensiert sich in salzsaurer alkoholischer Lösung nicht mit 4-Cyan-2-nitrophenylhydrazin, während α -Diketocholsäure unter gleichen Bedingungen ein Monohydrazone gibt. $C_{31}H_{42}O_6N_4$, unlöslich in Alkohol, Äther und Benzol, löslich in warmem Eisessig, daraus nicht deutlich krystallin, Zersetzungspunkt 270° . (III vgl. diese Berichte 11, 266.)

W. Küster (Stuttgart).

Borsche, W. und F. Hallwass: Untersuchungen über die Konstitution der Gallensäuren. V. Übergänge aus der Cholsäure-Reihe in die Lithocholsäure-Reihe (*Allg. chem. Inst., Univ. Göttingen.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 9, S. 3324—3331. 1922.

Die Verf. haben die Annahme, daß Lithocholsäure, 4 R.¹⁾ $C_{24}H_{40}O_3$ eine Monooxycholsäure sei (vgl. Wieland und Weyland; diese Ber. 3, 376. 1921), da sie sich in Dehydrolithocholsäure, 4 R. $C_{24}H_{38}O_3$ und in Lithobilansäure, 3 R. $C_{24}H_{38}O_6$, überführen läßt, und die fernere, daß das Hydroxyl im Ring I am C_3 sich befindet, als richtig erwiesen dadurch, daß es gelang, Redukto-dehydrocholsäure in Lithocholsäure zu verwandeln. Dies geschieht beim Erhitzen des Disemicarbazons der Redukto-säure mit Natriumäthylat auf 180° , während durch amalgamiertes Zink die Redukto-säure bis zur Cholsäure reduziert wird. Desoxybilansäure und Bilansäure ließen sich ebenfalls in Form ihrer Disemicarbazone durch Natriumäthylat reduzieren und lieferten dabei Lithobilansäure. In gleicher Weise läßt sich aus Isobilansäure Isolithobilansäure bequem herstellen.



¹⁾ Das Vorzeichen 4 R. bedeutet die Anzahl der vorhandenen Ringe.

Versuche: Dehydrocholsäure-trisemicarbazon $C_{37}H_{43}O_5N_6$, amorphe weiße Flocken aus der Lösung in Natronlauge durch Säuren, unlöslich in Alkohol, löslich in warmem Eisessig. Bräunt sich ab 290° und zersetzt sich bald darauf vollständig. Wird durch Natriumäthylat bei 200° zu Cholsäure (Schmelzpunkt 161°) reduziert. Redukto-dehydrocholsäure-disemicarbazon $C_{26}H_{42}O_5N_6$. Die Lösung der Komponenten in verdünntem Alkohol wird 1 Tag auf dem Wasserbade erwärmt, dann noch heiß in die 20fache Menge Wasser eingerührt. Die hierbei gefällten lockeren, weißen Flocken bilden getrocknet kreideähnliche Brocken, die sich gegen 300° braun färben ohne zu schmelzen. Die alkoholische Lösung zeigt große Neigung zum Gelatinieren. Wird durch Natriumäthylat bei 180° zu lithocholsäurem Natrium reduziert, das sich aus der eingeeengten wässrigen, alkalischen Lösung in dicht verfilzten Nadelchen abscheidet. Daraus durch Salzsäure Lithocholsäure $C_{24}H_{40}O_3$, farblose Blättchen aus Eisessig, Schmelzpunkt 185—186°. $[\alpha]_D^{19} = +32,72^\circ$ (Konzentr. 1,528% in abs. Alkohol) Methyl ester aus der Säure durch Diazomethan. $C_{25}H_{38}O_3$, lange Nadeln aus Methylalkohol + Wasser, Schmelzpunkt 130°. Dehydro-lithocholsäure $C_{24}H_{38}O_3$, Blättchen aus Alkohol Schmelzpunkt 141°. Methyl ester, aus der Säure durch Diazomethan. Farblose Blättchen aus schwach verdünntem Methylalkohol, Schmelzpunkt 117°. Oxim des Methyl esters $C_{25}H_{41}O_3N$, lange Nadeln aus heißem Methylalkohol, Schmelzpunkt 148°. Biliansäure-disemicarbazon $C_{26}H_{40}O_8N_6$, breite, farblose Nadeln, unlöslich in Wasser und Alkohol, leicht löslich in warmen Eisessig, färbt sich über 280° braun, verkohlt bei stärkerem Erhitzen. Wird durch Natriumäthylat bei 180—190° in Lithobiliansäure überführt. Desoxybiliansäure-semicarbazon $C_{25}H_{39}O_7N_3$, weiße, nichtkrystallisierende Flocken, löslich in Alkohol und Eisessig, unlöslich in Wasser, Äther und Benzol, zersetzt sich bei 215—220°. Wird durch Natriumäthylat zu Lithobiliansäure $C_{24}H_{38}O_6$ reduziert. Krystallisiert charakteristisch aus Eisessig. Schmelzpunkt 279°. Lithobiliansäure-trimethylester $C_{27}H_{44}O_6$, aus der Säure durch Diazomethan lange, farblose Nadeln, Schmelzpunkt 112°. Iso-lithobiliansäure $C_{34}H_{38}O_6$, bildet sich bei der Reduktion von Isobiliansäure in Eisessiglösung durch amalgamiertes Zink. Die rohe Säure wird über den Trimethylester $C_{27}H_{44}O_6$ gereinigt (lebhafte glänzende farblose Blätter aus Methylalkohol, Schmelzpunkt 103—104°). Die Verseifung erfolgt durch methylalkoholische Natronlauge. Farblose Nadelchen, die bei 261° unter Gasentwicklung und Braunfärbung schmelzen. Glatter verläuft die Darstellung der Iso-lithobiliansäure durch Reduktion des Disemicarbazons der Isobiliansäure mittels Natriumäthylat. Es wurde nicht krystallisiert sondern nur als gelblichweißes Harz beim Erkalten der weingeistigen Lösung erhalten, in welcher die Komponenten 1 Tag lang erwärmt worden waren. Braunt sich bei 280° und zersetzt sich allmählich bei weiterer Temperatursteigerung. W. Küster (Stuttgart).

Kariyone et Kimura: Détermination de la santonine dans le semen contra (Santoninbestimmung im Samen.) Bull. des sciences pharmacol. Bd. 29, S. 59. 1922.

Referat nach Chem. and Druggist 13. VIII. 1921, 1682, S. 57 (nach Yakugakuzasshi IX 1920). 10 g gepulverten Samen 3 Stunden im Soxhlet ausäthern, Äther verjagen, Rückstand 30 Min. mit 100 cem 5proz. Baryt am Rückfluß kochen, dann mit CO_2 -Gas bis etwa zu Lackmusneutralität sättigen, filtrieren; 80 cem Filtrat (= 8 g Droge) mit 10 cem 15proz. HCl und 20 cem $CHCl_3$ versetzen, 10 Min. kräftig schütteln. Nach einigen Minuten die klare Chloroformschicht filtrieren, desgleichen noch 3 mal mit je 10 cem $CHCl_3$. Die gesamte Chlorformlösung zur Trockne abdampfen, Rückstand in 30 cem heißen Alkohols lösen, erkalt mit $\frac{n}{10}$ -KOH neutralisieren (Phenolphthalein). Dann noch 20 cem $\frac{n}{10}$ -KOH zufügen, 30 Min. am Rückfluß kochen, nach Erkalten mit $\frac{n}{10}$ -HCl titrieren. Daneben weitere 30 cem d. gleichen Alkohols ebenso mit 20 cem $\frac{n}{10}$ -KOH versetzen, mit $\frac{n}{10}$ -HCl neutralisieren. Ist die Zahl der cem HCl bei der ersten Bestimmung x, bei der zweiten y, dann ist der Prozentgehalt an Santonin = $\frac{(y-x) \cdot 2,462}{8}$.

P. Wolff (Berlin).

Favrel, G.: Étude critique de la nouvelle méthode volumétrique de dosage de la santonine dans le semen contra de MM. Kariyone et Kimura. (Kritische Studie der neuen, volumetrischen Methode von Kariyone und Kimura zur Santoninbestimmung im Samen.) Bull. des sciences pharmacol. Bd. 29, Nr. 11, S. 553—555. 1922.

Mit der Methode (vgl. vorstehendes Ref.) erzielte Verf. bei mehrfacher Bestimmung des Santonin gehaltes einer Samenprobe untereinander abweichende, im allgemeinen auch zu hohe Werte (bis zum doppelten der durch mehrfache, übereinstimmende gewichtsanalytische Bestimmung erhaltenen Werte). Das Prinzip der Methode (Sprengung des Laktonringes durch Alkali und Bestimmung der Santoninsäure) ist richtig, mit reiner Santonin angestellte Versuche ergeben auch genaue Werte, im Chloroformauszug des Samens finden sich aber Harz und andere Substanzen, auf die die Lauge auch einwirkt.

P. Wolff (Berlin).

Goiffon, R. et F. Nepveux: Appréciation comparative de la concentration des acides organiques forts ou faibles dans une solution. (Vergleichende Konzentration

ionsbestimmung der starken und schwachen organischen Säuren in einer Lösung.) *Laborat. de chimie, clin. de therap. chirurg., Pr. P. Duval, Paris.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 35, S. 1107—1108 1922.

Die organischen Säuren des Harns ergeben bei der Titration nach van Slyke und Palmer e nach der Natur der verwendeten Indikatoren verschiedene Ausschläge, da die Umschlags- punkte von Orange IV, Bromphenolblau, Dimethylanidoazobenzol und Methylorange ver- schiedene Aciditäten anzeigen (diese Berichte 14, 380). Verff. versuchen, dieses Verhalten ur Erkennung der Säuren nutzbar zu machen. Bei einer schwachen Säure, deren Dissoziation lurch die Gegenwart ihrer Salze stark zurückgedrängt wird, kann man für eine bestimmte l-Ionenkonzentration das Verhältnis von freier zu gesamtter Säure angeben. Die Dissoziations- onstante der Milchsäure ist z. B. $10^{-4} \cdot 1,4$. In 100 Teilen der Säure sind danach bei einer Wasserkstoffionenkonzentration von $10^{-4} \frac{1}{1+1,4} = 41,6$ Teile freie Säure vorhanden. Wenn man daher zu 100 Teilen einer organischen Säure in wässriger, normaler Lösung 58,6 cem Normalauge geben muß, um $p_H = 4$ zu machen, so hat die Säure die gleiche Dissoziations- konstante, wie die Milchsäure. Nach van Slyke kann man die Gesamtmenge der organischen Säure zu 93—99% erhalten, indem man ihren Kalksalzen $\frac{2}{10}$ -Salzsäure bis zur Acidität $p_H = 2,7$ hinzufügt. Wenn man einer anderen Probe nur bis zur Acidität $p_H = 4$ Säure zufügt, o erhält man bei jeder Säure einen Wert, der für sie im Verhältnis zu ihrer Gesamtmenge charakteristisch ist. Man kann natürlich auch andere Aciditäten und damit andere Indikatoren benutzen. Verff. halten aber $p_H = 4$ für den interessantesten Punkt. *Schmitz (Breslau).*

Goiffon, R. et F. Nepveux: L'indice différentiel de dissociation des acides orga- niques. Son application aux jus de fruits et boissons, son interprétation. (Der Dif- ferentialdissoziationsindex der organischen Säuren. Ihre Anwendung auf Frucht- säfte und Getränke; ihre Deutung.) (*Laborat. de chimie, clin. de therap.-chirurg., Pr. P. Duval, Paris.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 35, S. 1109 bis 1110. 1922.

Zur Gewinnung des qualitativen Hinweises aus dem Verhalten der Säuren gegen ver- schiedene Indikatoren führt man neben der Titration nach van Slyke und Palmer eine zweite mit der gleichen Flüssigkeitsmenge aus, bei der man als Indicator 2 cem 0,02% Methyl- orange zusetzt. Zum Vergleich benutzt man eine Pufferlösung von $p_H = 4$, die nach Clark oder Sørensen dargestellt ist. Bei reiner Milch-, Butter- und Essigsäure wurden bis zum Farbumschlag die berechneten Mengen $\frac{2}{10}$ -Salzsäure verbraucht. Um einen Fruchtsaft acidimetrisch zu definieren, soll man 4 Werte angeben: die aktuelle Reaktion, die Acidität gegenüber Phenolphthalein, den gesamten Gehalt an organischen Säuren nach van Slyke, den Differentialindex, d. h. die Prozente freier Säure bei $p_H = 4$. Beispiel: Sehr reife Melone. $p_H = 7,2$; organische Säuren 129 cem auf 100 g Saft; Verbrauch bis zu $p_H = 4,50$ cem; Index 39%. Die Melone hat danach einen starken, aber weitgehend neutralisierten Säuregehalt, der ziemlich starken Säuren entstammt. *Schmitz (Breslau).*

Rosenthaler, L.: Variationsstatistik als Hilfswissenschaft der Pharmakognosie. (8. Mitt.) Ber. d. dtseh. pharmazent. Ges. Jg. 32, H. 7, S. 237—240. 1922.

In Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen über den Gehalt an N-haltigen Stoffen (vgl. diese Berichte 1, 365) fand Verf. den mittleren Ölgehalt süßer Mandeln bei kleineren (unter 1 g) höher als bei größeren. Bei bitteren Mandeln dagegen war der Ölgehalt nicht so verschieden. *P. Wolff (Berlin).*

Allgemeine Physiologie und Pathologie.

Allgemeine Biologie. Zelle. Gewebe. Entwicklung. Vererbung. Zoologisches.

● **Rauber-Kopsch: Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen. Abt. 3: Muskeln, Gefäße.** 12. verm. u. verb. Aufl. v. Fr. Kopsch. Leipzig: Georg Thieme 1922. VII, 517 S.

Für die vorliegende Abteilung des ausgezeichneten Lehrbuches gilt im allgemeinen das für Abteilung 5 Gesagte. Der klare Text bringt bei kurzer Fassung mit Hinweisen auf wissenschaftliche Streitfragen und der für die Praxis wichtigen Tatsachen sowie auf Spezialarbeiten der einschlägigen Literatur eine erschöpfende Darstellung der descrip- tiven Anatomie unter Berücksichtigung der histologischen Beschaffenheit der in Frage kommenden Gewebe. Dem Lehrbuch sind 401 zum größten Teil farbige Abbildungen

beigegeben, die jeden Atlas ersetzen. Bis auf einige Textabbildungen, bei denen sich der Farbdruk nicht völlig mit dem Grundriß deckt, zeigen alle, namentlich die Tafeln, vollendet schöne Ausführung. Trotz der geübten Schematisierung haben Naturtreue und Plastik keine Einbuße erfahren. Der Lehrbuch-Atlas von Rauber - Kopsch kann Studierenden und Ärzten nicht warm genug empfohlen werden. *Busch* (Erlangen).

Terry, B. T.: The rapid preparation of polychrome methylene blue stains for frozen sections of fresh and fixed tissue. (Die Schnellherstellung polychromer Methylenblaufarben für Gefrierschnitte frischer und fixierter Gewebe.) (*Dep. of pathol. Vanderbilt school of med., Nashville, Tennessee.*) Journ. of. laborat. a. clin. med. Bd. 8, Nr. 3, S. 157—164. 1922.

Farbe 1 für frische Gewebe: 6 cem einer 1 proz. wässerigen Methylenblaulösung + 6 cem 1 proz. K_2CO_3 -Lösung werden mit 18 cem destillierten Wasser über freier Flamme $2\frac{1}{2}$ Minuten erhitzt und dann sofort gekühlt. Filtration durch ein angefeuchtetes Baumwollfilter. Gibt bei lebenden Zellen ausgezeichnete Resultate nach 3—5 Sekunden langer Färbung; Kern- und Epithelzellen blau, Bindegewebsfasern rot, rosa oder farblos, Muskelfasern purpurn. Tote Zellen färben sich schlecht; die Farblösung hält sich nur einige Wochen, kann aber aus den Stammlösungen jederzeit schnell frisch hergestellt werden. Die Schnitte halten die Farbe nicht lange. Vorzuziehen ist deshalb die Färbung fixierten Gewebes mit einem sauren polychromen Methylenblau. Herstellung: 20 cem 1 proz. Methylenblaulösung, 20 cem 1 proz. K_2CO_3 -Lösung, 60 cem destilliertes Wasser. Erhitzen 5 Minuten über kleiner Flamme bis zum Kochen; dann noch $2\frac{1}{2}$ Minuten kochen. Dann sofortiges Abkühlen auf Zimmertemperatur oder tiefer. Darauf Zusatz von 10 cem 10 proz. Essigsäure; 1 Minute kräftig schütteln und wieder auf 100 cem auffüllen, Filtrieren. Die fixierten, dünn geschnittenen Gewebe werden 5 Sekunden gefärbt und gewaschen. Die Färbung ist distinkt und läßt sich durch verdünnt Essigsäure wieder entfernen; Nachfärbung in gleicher Weise gelingt noch nach Monaten. Die Schnitte halten die Farbe jedoch auch nicht dauernd. *Seligmann* (Berlin).

Stöckli, Anton: Beobachtungen über die Entwicklungsvorgänge am Rumpfskelett des Schweines. Zugleich ein Beitrag zur Wertung und Technik von Aufhellungspräparaten mit Stäufärbung. (*Veter.-anat. Inst., Univ. Zürich.*) Gegenbaur Morphol. Jahrb. Bd. 52, H. 2, S. 153—195. 1922.

Studium von Wirbelsäule samt Rippen und Brustbein an Aufhellungspräparaten, um wenigstens für eine Tierspecies ein abgerundetes Bild über die Verknöcherungsperioden des Rumpfskelettes zu erhalten, unter Ausdehnung der Untersuchungen auf das knorpelige Stadium. Die Untersuchungen erstrecken sich über mehr als ein halbes Hundert Schweine embryonen. Methodik nach Lundvall und Spalteholz, Färbung mit dem Lundvallschen Alizarin-Toluidinblau-Färbegemisch. Wirbelsäule: Von zwei im mesenchymatösen Wirbel zuerst parachordal im Körper sich entwickelnden Knorpelzentren und einem etwas später auftretenden Knorpelherd in jeder Bogenbasis wuchert das Knorpelgewebe nach allen Seiten vor zur Bildung eines einheitlichen Knorpelwirbels, von dem dann die spezifischen Fortsätze auswachsen. Die Dornfortsätze gehen paarig aus den Bogenenden hervor und verschmelzen schließlich der Länge nach, zuerst in der Brustregion, von hier nach vorne und hinten fortschreitend, verhältnismäßig spät zum Kreuzgebiet. Vom 5. Caudalwirbel ab findet sich nur ein Knorpelpunkt für je ein Metamer. Im Halsgebiet erfolgt die Verschmelzung des Atlaskörpers mit dem des Epistropheus schon bei jüngsten Embryonen. Zwischen der 5. und 6. Embryonalwoche leiten hypertrophisch werdende Knorpelzonen die Ossifikationsvorgänge ein. Die Verknöcherung jedes Wirbels geht von 3 Hauptzentren aus, einem für den Körper, je einem für den Bogen beiderseits. Einzige Ausnahme vom 5. Caudalwirbel ab, von wo nur noch ein Knochenpunkt angelegt wird. Die Verknöcherung beginnt in den Bogenbasen der mittleren Brustwirbel. Die Gesetze für die Wachstumsrichtung sind wohl in den jeder Zelle eigene Vererbungsenergien zu suchen, die für die Fortsätze vielleicht schon in statisch-mechanischen Momenten (Muskelzug und -druck). Abweichend vom allgemeinen Plan entwickeln der 7. Halswirbel, die ersten 7 Brustwirbel und die Lendenwirbel noch während des Embryonallebens weitere Verknöcherungszentren: der Dornfortsatz des 7. Halswirbels verknöchert von einem Punkte aus, die des Wideristgebietes von 3 Zonen; bei den Lendenwirbeln übernimmt ein isoliertes Zentrum die Entwicklung des größten Teiles des Querfortsatzes. Im postnatalen Leben treten noch epiphysäre Zentren auf, z. B. die vorderen und hinteren Epiphysenscheibe Rippen: Verknorpelung von einem eigenen Zentrum aus, trotz ursprünglich kontinuierliche Zusammenhanges der Rippe mit der Bogenbasis. Die Rippenknorpel entstehen nicht von einem eigenen Zentrum aus, sondern durch winkliges Abbiegen nach kranial. Erste Knochensubstanz erscheint an den mittleren Rippen, wenn die Wirbel noch längere Zeit knorpelig sind. An der größten Krümmung tritt ein perichondraler Knochenmantel auf, der sich rasch ventralwärts vergrößert. Wirbelwärts entsteht nach und nach Knochensubstanz im Capitulum und Tube-

dum. Nebenknochenzentren erscheinen postnatal für Capitulum und Tuberculum. Brust-
rin: Die Entstehung des mesenchymatischen Brustbeins ist noch nicht geklärt. Das knorpelige
steht durch Verschmelzung der aus den knorpelartigen distalen Anschwellungen gebildeten
norpelstäben. Die paarigen Sternalstücke lösen sich von den Rippen ab; die caudal diver-
renden segmentierten Stäbe gehen eine Längverschmelzung ein, worauf die Verschmelzung
im einheitlichen unpaaren Knorpelsternum von vorn nach hinten in medianer Richtung folgt.
er Schwertfortsatz leitet sich vom 7. Rippenpaar ab. Die Knochenkerne treten intercostal
paariger Reihe auf, doch weicht das erste Segment ab, wo ein unpaarer Punkt angelegt wird.
Eine Tabelle der chronischen Reihenfolge der wichtigsten Entwicklungsvorgänge am Rumpf-
skelett des Schweines ist beigegeben.

Busch (Erlangen).

Schuppisser, Heinrich: Über Eiseninkrustation der Bindegewebssubstanzen bei
ämochromatose und bei lokalen Blutungen. (*Pathol. Inst., Univ. Bern.*) Virchows
rch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 239, H. 2, S. 320 - 349. 1922.

In einem Fall von allgemeiner Hämochromatose (Bronzediabetes) fand sich in retro-
criconeale u. Lymphknoten eine eigenartige, das retikuläre Stützgewebe betreffende,
sicher nicht beschriebene Eisen- und Kalkinkrustation in Form eines feinen, sehr regel-
äßigen Gitterwerkes aus feinen Bälkchen. Da an mehreren Stellen — in mit Hämalaun
färbten Präparaten erscheinen die Bälkchen hier ungefärbt, transparent, hellgelb bis hell-
tm — Kalk nicht nachweisbar ist, muß angenommen werden, daß die Verkalkung sekundär
r Eiseninkrustation folgt und daß das Nebeneinander nicht als zufällig anzusehen ist, viel-
ehr die Eisenaufnahme eine chemische Veränderung der Fibrillensubstanz bedingt, welche
ne starke Affinität zu Kalksalzen schafft. Allgemeinpathologisch handelt es sich um eine
sondere Form von dystrophischer Verkalkung, bei der die Dystrophie nur in der Eiseninkru-
ation des Reticulums besteht. Diese wieder ist die Folge eines massenhaften Eisenangebotes
in eisengespeicherten Zellen der Lymphdrüse. — Weiterhin werden 2 Fälle von Struma
odosa parenchymatosa mit starken regressiven Veränderungen und Blutungen beschrie-
en, bei denen es ebenfalls zu starker Ablagerung von histochemisch nachweisbarem Eisen
ommen ist, und zwar einmal in Form bräunlichen Pigmentes (Hämosiderin), dann als reaktions-
higes Eisen in diffuser Weise in hyalinen Balken, und schließlich in Form fester Gebilde
on hellgelber bis hellgrüner Farbe mit scharfen Konturen und transparentem Aussehen,
icht Krystalle, sondern Konkreme, die meistens noch eine kollagene Grundsubstanz
ufweisen und wahrscheinlich Ausflockungen von Eisenhydroxyd darstellen. Häufig finden
ch um derartige Konkreme Fremdkörperriesenzellen. Ähnliche Eiseninkrustationen
nden sich ferner in einer Milz bei Lymphogranulom an hyalinen Balken und in Form
on spießartigen oder balkenförmigen Gebilden, wieder hellgelb und scharf konturiert ohne
usammenhang mit dem übrigen Gewebe, ferner auch an elastischen Fasern, z. B. der Gefäß-
ände. Die Ablagerung der Eisenkonkremente setzt Verf. in Analogie zu der von harnsauren
salzen in kollagener Substanz bei Gicht oder zu der lokalen Kalkmetastase.

Busch.

Richter, Erich: Über den Bau der Sternalrippen der Säugetiere. (*Anat. Inst.,
Univ. Würzburg.*) Gegenbaurs Morphol. Jahrb. Bd. 52, H. 2, S. 221 - 240. 1922.

Histologische Untersuchung, zum Teil an Trockenskeletten von einem niederen Affen,
on Raubtieren (Bär, Tiger und Katze), einer Robbe, von Nagetieren (Biber und Ratte),
on Insektivoren (*Centetes caudatus*), von Artiodactylen (*Cervus alces* und *damara*, *Ovis
ragelaphis*, Kamel und Hämmer), von Edentaten (*Bradypus*), von Monotremen (*Elchidna
nd Ornithorhynchus*). — Es lassen sich zwei Arten von Differenzierungen der Sternalrippen
nterscheiden: 1. Fibrillenbildung und Verkalkung, 2. Verknöcherung. Um über die Zusammen-
änge zwischen der Anordnung der versteifenden Substanz und der mechanischen Bean-
pruchung etwas aussagen zu können, ist die Zahl der Untersuchungen zu gering. Von statisch
ichtigen Bildungen fanden sich bei Elch und Tiger in hyalinem Knorpel hyalin umschidete
efäßkanäle (Röhrenkonstruktion), hyaline Bälkchen zwischen den Gefäßen bei Tiger (trajek-
orielle Drucksysteme?), Versteifung durch Verkalkung und die Architektur der Interellu-
arsubstanz bei Mensch, Affe u. a. Die Verknöcherung kam bei den meisten Fällen als ein bei
ängern sonst nicht zu beobachtender Typus enchondraler Verknöcherung aufgefaßt werden:
amöloser Knochen in Umgebung von Gefäßkanälen in scharfer Abgrenzung gegen den Knorpel
wie bei Amphibien). Für die Art der Versteifung, ob Verkalkung oder Verknöcherung, scheinen
mechanische Einflüsse nicht ausschlaggebend zu sein, vielmehr den funktionellen übergeordnete
onstitutionelle Faktoren. Für die einzelnen Ordnungen der Säuger kann bis jetzt festgestellt
werden, daß bei Menschen und Anthropoiden ein wenig charakteristischer Bau: hyaliner
Knorpel mit Spuren zentraler Verkalkung vorliegt, bei niederen Affen stärkere Verkalkung,
ei Raubtieren hyaliner Knorpel mit geringer axialer Verknöcherung, bei Nagern vesikulöser
Knorpel, bei Artiodactylen überwiegend Verknöcherung, bei Gürteltieren völlige Verknöcherung
eben Verkalkung. Auch aus dem verschiedentartigen Verhalten bei den kleinen Tieren (Katze,
Biber, Ratte und *Centetes*) ist die Überordnung konstitutioneller Einflüsse zu erkennen.

Busch (Erlangen).

Gessner, Ignaz: Die Gliederung der Rippen bei den Säugetieren. (*Anat. Inst. Univ. Würzburg.*) Gegenbaurs Morphol. Jahrb. Bd. 52, H. 2, S. 197—220. 1922.

Die bei Monotremen und Edentaten beobachtete Dreiteilung der Rippen ist nicht morphologisch gleichwertig, beruht bei beiden auf verschiedenen Zuständen. Bei Monotremen ist sie auf Verknöcherung des Sternalstückes der Rippen (Sternalrippen) zurückzuführen; bei Echidna scheinen Unterschiede vorzukommen; bei Edentaten sind die Zwischenstücke Epiphysen der Vertebralrippen. Dieses intermediäre Stück scheint bei anderen Säugetieren in der Vertebralrippe enthalten zu sein. Die gelenkige intracostale Gliederung der Edentaten fehlt bei den meisten Säugetieren (Ausnahme Delphin). Während also die Sternalrippen bei allen Säugetieren einander gleichwertig sind, ohne Rücksicht darauf, ob sie in ihrem sternalen Teile verknöchern oder dauernd knorpelig bleiben, sind die Vertebralrippen innerhalb der Säugetiere nicht vollkommen gleichwertig. Wo ein intermediäres Stück fehlt, scheint es in den Bestand der Vertebralrippe aufgegangen zu sein. Demnach ist eine scheinbare von einer echten Dreiteilung zu unterscheiden, jene, die durch Ossification des sternalen Endes der Sternalrippe entsteht (Monotremen), diese durch Abgliederung am vorderen Ende der Vertebralrippe (Busch (Erlangen)).

Pinkus, Felix: Neuere Arbeiten über die Färbung der Säugetiere. Naturwissenschaften Jg. 10, H. 44, S. 951—960. 1922.

Pinkus gibt in einem zusammenfassenden Aufsatz eine Besprechung der Arbeiten von Meirowsky und Leven über Tierzeichnung und streifenförmige Muttermäler des Menschen und derjenigen von Krieg über die Prinzipien der Streifenzeichnung bei Säugetieren. Die beiden erstgenannten Autoren vergleichen die Fellzeichnung der Tiere mit den systematisierten Menschennaevi und leiten beide aus vorauszusetzenden Umstellungen der Gene des Keimplasmas ab. Eine beweisende Gedankenführung über den anatomischen Verlauf dieser Streifen und Fleckbildungen wird in diesen Arbeiten vermißt. Kriegs Darlegungen dagegen bringen faßbare Ideen über die Entstehung der Längsstreifung, Querstreifung und Fleckbildung der Tiere, in besonderer Beachtung der Equidenstreifung. Sie hängen einerseits mit der Faltenbildung der Haut und ihrer Spalttrichtung während der Embryonalzeit zusammen, andererseits mit den zeitlichen Verschiebungen, welche zwischen diesen Faktoren und der Entstehung des Pigments bei der Bastardierung sich einstellen. Der Aufsatz wird durch Bilder, die aus den genannten Arbeiten entnommen sind, illustriert. (Meirowsky und Leven vgl. diese Berichte 10, 191, Krieg 10, 465.)

Pinkus (Berlin).

El Bahrawy, Ali Ahmed: Über den Mongolenfleck bei Europäern. Ein Beitrag zur Pigmentlehre. (*Dermatol. Klin., Univ. Zürich.*) Arch. f. Dermatol. u. Syphilid. Bd. 141, H. 2, S. 171—192. 1922.

El Bahrawy hat die Pigmentzellen des blauen Geburtsfleckes der Kreuzgegend, der bei farbigen Rassen, als Mongolenfleck bezeichnet, in fast allen Fällen vorhanden ist, auch bei europäischen Neugeborenen konstant nachweisen können. Diese Zellen sind Pigmentbildner (Melanoblasten), vermutlich mesodermaler Natur, und ganz streifig zu unterscheiden von den übrigen Pigmentzellen in der Cutis. Diese übrigen Cutispigmentzellen leiten sich mit ihrem Pigmentgehalt von den ektodermalen Melanoblasten in der Epidermis ab, deren Pigment aus der Epidermis nach unten streift und von den Bindegewebszellen aufgenommen wird. Diese sind keine Melanoblasten, d. h. pigmentbildende Zellen, sondern Chromatophoren, d. h. nur Pigment aufnehmende Zellen. Nur die Pigmentbildner geben sowohl in der Epidermis wie in der Cutis die Dopareaktion. Die Melanoblasten, welche in der Cutis des Menschen gefunden werden, sind dieselben Zellen, welche sich abnorm in der Menschenhaut im blauen Naevus vorfinden, und welche normal in großen Mengen bei vielen Affenarten vorkommen. Der geringe Besitz dieser Zellen, welchen der Mensch aufweist, ist ein aristokratisches Merkmal.

Pinkus (Berlin).

Kuczynski, Max H.: Edwin Goldmanns Untersuchungen über celluläre Vorgänge im Gefolge des Verdauungsprozesses auf Grund nachgelassener Präparate dargestellt und durch neue Versuche ergänzt. (*Pathol. Inst., Univ. Berlin.*) Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol. Bd. 239, H. 2, S. 185—302. 1922.

Eine kurze Darstellung von Edwin Goldmanns Leben und Werk bildet die Einleitung der 117 Seiten umfassenden Arbeit. Sodann werden nachgelassene Präparate vom Mäuse- und Rattendarm, die Goldmann durch vitale Pyroblaufärbung gewonnen hatte, an der Hand früherer Goldmannscher Arbeiten erörtert, da Notizen

den vorliegenden Präparaten fehlen. Die Vitalfärbung mit Pyrrol- oder Trypanblau igt nach Goldmann die Orte gesteigerten Stoffwechsels an. Schon makroskopisch iehen sich Drüsenmagen und Coecum („der Darmmagen“) durch besonders kräftige aufärbung aus. Goldmann führte die stärkere Blaufärbung (z. B. von Fütterungs- irmen gegenüber Hungerdärmen) auf Einwanderung histiogener Wanderzellen Pyrrolzellen“) in die Tunica propria zurück, Verf. dagegen findet keinen wesent- lichen Unterschied in der Zahl der Zellen, welche bei Fütterungs- oder Hungerdärmen s Zottenstroma bevölkern. Nur sind die Zellen während ihrer resorbierenden Tätig- eit wesentlich größer und täuschen so bei schwachen Vergrößerungen Vermehrung vor. s werden also durch die Vitalfärbung nicht Zellverschiebungen, sondern Funktions- stände dargestellt. Goldmann scheint die Methode der „Übergangsbilder“ etwas überschätzt zu haben; Verf. zieht auch die Pseudomelanose der Darmzotten heran, n die von Goldmann abweichende Deutung zu rechtfertigen. — Gegenstand der nun genden eigenen Untersuchungen ist die Rolle des lymphatischen Darmapparates, r Milz und der Leber bei der Resorption von Nährstoffen. Der epitheliale Anteil n Darm und Leber bleiben im Hintergrunde. Als Versuchstiere dienen Ratten ad Mäuse; die Versuchsanordnung besteht in enteraler oder parenteraler Zufuhr erschiedenartiger (abnorm einseitiger) Nährstoffe, z. T. kombiniert mit Vitalfärbung, ie histologische Durchforschung bedient sich hämatologischer Färbungen (einschließ- ch Oxydasereaktion), der Sudanfärbung und des Eisennachweises. Die mitgeteilten uszüge aus den Protokollen bieten eine im Referat kaum wiederzugebende Fülle von eobachtungen: Darm: — Hungerzustand und ebenso eine reine Brot- und Speck- itterung ergibt Zellverarmung im Zottenstroma. Eiweiß-, Speck- oder Käsefütterung igt eine Tunica propria mit Leukocytenarmut, Eigelb-Milchfütterung dagegen Leuko- ytenvermehrung. Zucker- oder Eiweißfütterung kann Leukocytenvermehrung machen chlorophyllöl und Brot gibt das Bild der „Norm“. Milz (nebst kurzen Notizen über die ebern): Kräftige Ausbildung der Lymphknötchen, lymphoblastische Reaktion, ird erzielt durch Brot mit enteraler oder parenteraler Zufuhr von Hühnereiweiß, arner durch Eigelb-Milchfütterung. Bei letzterer beginnende „Fortbildungen des eimgewebes zu leukocyitären Formen“. Edamer Käse mit Brot bewirkt nicht nur ymphoblastische, sondern auch megakaryocytaire Reaktion, ferner reticuloendotheliale yperplasie nach Art des Morbus Gaucher. Chlorophyllölbrot (oder Körnerfütterung nd Öl intraperitoneal) ergibt wie beim Darm „ein gewisses Durchschnittsbild“ aus llen Strukturen, die möglich sind: z. B. mittelstarke Lymphknötchen. Zucker und rot führt zu Rückbildung der Lymphknötchen, Speck und Brot in noch verstärktem aße. Vitale Trypanblaufärbung gibt bei der Milz keine weiteren Aufschlüsse über die eweilige Phase der „fließenden Milzstruktur“. Leber: Auch hier auf Zufuhr ver- chiedener Nährstoffe lymphoblastische Reaktionen, am stärksten bei Speckratten nd Käsemäusen; ferner reaktive Blutbildungsherde in der Leichtung erweiterter apillaren, analog der normalen embryonalen Hämatopoese. Die bisher referierte Reize und Reaktionen an Darm, Milz und Leber hätten sich vielleicht in Übersichts- abellen bringen lassen; doch glaubt Verf. von solchen, mit Rücksicht auf die Variabilität ler Versuchstiere absehen zu müssen, obwohl er „schließlich Maß und Zahl in Be- ziehung zu bestimmten Zuständen erstrebt“. (Bei dem Bestreben, im Sinne von Driesch und Ungerer mit der Kategorie „Ganzheit“ zu arbeiten, scheut der Verf. offenbar die bewußte Vernachlässigung von Variablen; ohne „Vergrößerung“ aber ist keine „Tabelle“ möglich. Ref.) Hauptergebnis dieses Teiles: Auf Resorptionsreize reagiert der lymphatische und endotheliale Apparat mit Bildern, wie sie bisher vielfach als „entzündlich“ angesehen wurden. Da „Resorp- tion“ eine Grundfunktion aller Zellen ist, können derartige Reaktionen nicht ohne weiteres als „entzündlich“ oder „defensiv“ anerkannt werden. — „Status lymphaticus“ ist in vielen Fällen nur Ausdruck einer entsprechend gestalteten Ernährung durch längere Zeit. — Die Ätiologie der Leukämien ist weder eine Infektions- noch eine Tumorfrage,

sondern ein Stoffwechselproblem. — Der folgende Abschnitt ist der Häm siderose gewidmet. Nicht selten findet sich Häm siderin- und Trypanblauspeicherung in derselben Zelle, wie überhaupt Speicherung eines Stoffes in einer Zelle eher eine Anregung als eine Hemmung für die Resorption weiterer Stoffe bildet. — Die enterogene Theorie der Lebercirrhose, die periportal en Infiltrate und die Hämochromatose werden unter den gemeinsamen Gesichtspunkt der Resorption gebracht. — Der letzte Abschnitt handelt von merkwürdigen Beziehungen zwischen Resorption und Amyloid. Fütterung mit Käse und Brot oder Ei und Milch oder Brot und Hühnereiweiß ergab, falls lange genug fortgesetzt, Milz- und Leberamyloid. Parenteral (intramuskulär) zugeführtes Caseinogen natrium (= Nutrose) führt binnen etwa 30 Tagen in 100% zu ausgeprägtem Amyloid. Milzexstirpation verhindert die Amyloidbildung nicht. Die gleiche — bei der Maus meist krystallinische — Form des Amyloids wurde bei Streptokokkeninfektionen und Carcinom gefunden. Das Amyloid ist nach Ansicht des Verfs. eine besondere Form „nicht regelrecht abgebauten Eiweißstoffes jenseits der Gefäßwand“. „Der Zusammenhang zwischen der abgelagerten Masse... und dem resorbierten bzw. parenteral eingeführten Stoff ist wahrscheinlich ein unmittelbarer.“ Der wesentlichste Fortschritt aber liegt nach Ansicht des Verfs. in der Sicherstellung der Amyloiderzeugung durch Caseininjektion. Nunmehr sind weitere Forschungen auf konstanter Grundlage möglich.

Edmund Mayer (Berlin).

Hertwig, Günther: Die Bedeutung des Kerns für das Wachstum und die Differenzierung der Zelle. Verhandl. d. anat. Ges. a. d. 31. Vers. in Erlangen v. 24. bis 27. IV. 1922 (Anat. Anz. Bd. 55, Erg.-H.), S. 267—270. 1922.

Aus den Merogonieversuchen an Seeigeln (Boveri) und Amphibien (G. und P. Hertwig) folgt, daß der artfremde Samenkern für sich allein die Entwicklung meist selbst bei nahe verwandten Arten nur bis zum Beginn der Gastrulation zu leiten vermag. Hieraus schließt Verf. auf die Notwendigkeit des Kernes für die Umformung von Dotters in Protoplasma (spezifische Fermentwirkung des Kernes auf artspezifische Reservestoffe). Andererseits muß (auf Grund des Entwicklungsverlaufes von Artbastarden und Radiumtieren) dem Spermakern auch bei der Differenzierung der Organe und Gewebe eine wichtige Rolle zugeschrieben werden, so daß er im Falle disharmonischer Kernplasmabeziehungen bei und infolge seiner funktionellen Inanspruchnahme erkrankt. Es ergibt sich so eine Erklärung des merkwürdigen Kreuzungserfolges von Sphaerechinus ♀ × Antedon ♂, wo der klassenfremde Spermakern auch an der Entwicklung über das Blastulastadium hinaus teilnimmt und doch rein mütterliche Larven entstehen (Godlewski). Hier ist anzunehmen, daß infolge der weitgehenden Fremdheit zwischen Spermakern und Eiplasma eine spezifische Wechselwirkung unmöglich wird und der väterliche Kern, da er keine funktionelle Inanspruchnahme erfährt, auch nicht erkrankt.

S. Guthertz (Berlin).

Gurwitsch, Alexander: Über Ursachen der Zellteilung. Zusammenfassende Darstellung älterer und neuerer Ergebnisse. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 52, H. 1/2, S. 167—181. 1922.

Nach der Anschauung Roux' würde das Zustandekommen der embryonalen Teilung auf Selbstdifferenzierung beruhen. Es wäre jedoch auch möglich, daß sie z. B. wie bei Teilungen im Anschluß an Regeneration als eine abhängige Differenzierung bestehen könne. Auf Grund ausgedehnter und mühevoller Versuche an Wurzeln von Zwiebeln und Keimlingen von Helianthus, deren ausführliche Bearbeitung leider durch die Verhältnisse in der Nachkriegszeit in Verlust geriet, kam der Verf. zu dem Ergebnis, daß der die Zellteilung bewirkende Faktor zweifacher Art (als Möglichkeitsfaktor und Verwirklichungsfaktor) ist. Letzterer ist in seiner Wirksamkeit durch ein annähernd konstantes Niveau ausgezeichnet. Der Verf. konnte ferner feststellen, daß embryonale, d. h. rein physiologische Mitosen eines extracellulären Verwirklichungsfaktors im gleichen Maße wie die durch äußere Reize künstlich hervorgerufenen bedürfen. Der Teilungsvorgang könne daher ganz allgemein als ein Reflex

organg aufgefaßt werden. Daß bei den Kernteilungen eine wirkliche Zwangsmäßigkeit vorliege, erhellt aus den synchronen oder in strenger Abfolge sich vollziehenden Mitosen in mehrkernigen Zellen. Dabei ist der Eintritt und Ablauf der Zellteilungen von der Zelloberfläche insofern abhängig, als deren Beschaffenheit das Eindringen des Verwirklichungsfaktors beeinflusst. Eine weitere Versuchsreihe und Berechnung an eine einfache Beziehung zwischen Zellenlänge und Teilungsfrequenz nachgewiesen und die Annahme als richtig ergeben, daß für das Zustandekommen der Zellteilung die Beschaffenheit bzw. Durchlässigkeit der Zelloberfläche für den mitotischen Reiz vor allem maßgebend ist. Der Verwirklichungsfaktor für die Mitose wird vom Verf. im Sinne eines homogenen Reizfeldes aufgefaßt. Jede Zelle empfängt aus diesem ein gleiches Reizquantum. Dessen Natur bedarf noch der Ermittlung, aber jedenfalls handelt es sich dabei nicht um einen Faktor chemischer Natur (Hormon).

Cori (Prag).

Oehler, Rud.: Die Zellverbindung von *Paramaecium bursaria* mit *Chlorella vulgaris* und anderen Algen. (Georg Speyer-Haus, Frankfurt a. M.) Arb. a. d. Staatsinst. f. exp. Therapie u. d. Georg Speyer-Haus z. Frankfurt a. M. Jg. 1922, H. 15, S. 3 is 19. 1922.

Verf. geht von einem „weißen“ *Paramaecium*stamm aus, der im Freien „weiß“ gefangen und im Laboratorium durch Fütterung mit *Chlorella* „grün“ geworden ist. Kultiviert wird er in 0,05proz. Knop-Lösung, der als Futter *Saccharomyces xiguius* von Reinkultur auf Traubenzuckerbouillonagar beigegeben ist. Die Symbiose: *Paramaecium* - *Chlorella* wird nun getrennt: 1. Durch Kultur der *Paramaecien* im Dunkeln; bei guter Fütterung dauert es 2 Monate, bis die Ciliaten algenfrei sind und am Licht nicht mehr „ergrünen“. Das Verschwinden der Chlorellen erfolgt beobachteterweise dermaßen, daß sich die *Paramaecien* im Dunkeln rasch vermehren, die Chlorellen hingegen gar nicht, so daß ihre Zahl pro *Paramaecium* ständig abnimmt, bis schließlich die „weißen“ Ciliaten die anderen überwuchern. 2. Durch Zerquetschen der *Paramaecien* auf Agar konnte mühelos eine gut gedeihende Chlorellenkultur erzielt werden. 3. „Weiße“ *Paramaecien* werden nun per os mit 4 Chlorellenstämmen verschiedener Provenienz mit Erfolg infiziert, nur bei einem Stamm blieb dieser aus. Nach langer Zeit (minimal 24 Stunden) ist eine (im Licht) dauernde Symbiose hergestellt, die bei den verschiedenen Algenstämmen verschieden innig ist (Prüfung: an der Zeitdauer, die bei Dunkelzucht nötig ist, um die Zellverbindung zu trennen). 4. Es wurde nun weiter versucht, eine Symbiose zwischen „weißen“ *Paramaecien* und anderen Algen: *Rhaphidium*, *Scenedesmus* und *Stichococcus* herzustellen. Dies gelang nur bei den beiden letztgenannten Formen in verschiedenem Grade. Die Verbindung mit *Scenedesmus* erfolgt nur sehr langsam (4—6 Wochen) und ist nicht sehr innig. *Stichococcus* verbindet sich leicht mit *Paramaecium*, hindert dieses jedoch meist an der normalen Fortentwicklung durch übermäßiges Wachstum seiner Fadenkolonien, die den *Paramaecienkörper* in die Länge zerren, deformieren und zerreißen. Auch ist die Verbindung sehr locker. 5. Das physiologische Verhältnis zwischen beiden Partnern ist wohl so, wie allgemein angenommen, jedoch braucht auch das grüne *Paramaecium* am Licht Nahrung von außen, um sich rege vermehren zu können. Die Vermehrung ist bei grünen und weißen *Paramaecien* gleich groß, wenn reichlich Futter vorhanden ist. Verf. glaubt, daß man eine Ernährungskonstellation herstellen kann, bei der die grünen *Paramaecien* ohne Teilung monatelang existieren können, ohne zu degenerieren. Eine approximative Schätzung der Individuenzahl in einigen Röhrchen, in denen dieses Gleichgewicht vielleicht näherungsweise erreicht war, macht diese Ausnahme wahrscheinlich. Schließlich erörtert Verf. die Bedingungen für das Zustandekommen einer solchen Symbiose: a) gemindertes Verdauungsvermögen des tierischen Plasmas und b) Eignung der Alge (der eine refraktäre Chlorellenstamm bildete bei der Teilung große Zellenpakete, statt in einzelne Zellen zu zerfallen). Versuche mit anderen Ciliaten fielen negativ aus. Karl Bělař (Berlin-Dahlem).

Young, Donnell Brooks: A contribution of the morphology and physiology of the genus *Uronychia*. (Morphologie und Physiologie des Genus *Uronychia*.) Journ. of exp. zool. Bd. 36, Nr. 3, S. 353—395. 1922.

Verf. züchtet drei (darunter eine neue, *U. binucleata*, die zum Unterschied von den anderen statt eines Mikronucleus deren zwei besitzt) Arten dieses marinen Ciliaten in Meerwasserfaulkulturen. Vorausgeschickt wird eine kurze Beschreibung der Morphologie und der Teilung, wobei Verf. Befunde anderer Autoren an Hypotrichen bestätigen kann: die alten Cirren werden bei der Teilung resorbiert und jedes Tochtertier bildet eine neue Garnitur aus. Regenerationsversuche werden an je einem der beiden Descendenten von in Teilung befindlichen Tieren (der andere wird als Kontrolle weitergezüchtet) angestellt, und zwar in verschiedenen Zeitabständen von der letzten Teilung. Regeneriert wird die normale Gestalt und der gesamte Wimper- und Cirrenapparat, mit Ausnahme der Analcirren, die erst bei der nächsten Teilung typisch neugebildet werden. Das Regenerationsvermögen ist am geringsten kurz nach der Teilung und steigt sodann bis zum Beginn der nächsten Teilung (während der Teilung ist es schwer festzustellen, da die normalen Regenerationsprozesse einsetzen). Es besteht eine wenn auch nicht sehr fixierte, Teilungszone im vegetativen Tier; ein Individuum, dem z. B. 6 Stunden nach der Teilung ein Stück abgeschnitten wurde, teilt sich beim nächsten Mal in zwei ungleich große Stücke, von denen das kleinere stets das Regenerat trägt. Stellt man diesen Versuch früher an, so ergibt die nächste Teilung gleich große Stücke. Bei Fragmenten die keinen Mikronucleus enthalten, ist das Regenerationsvermögen, wenn auch in abge schwächter Form, vorhanden und auch hier kurz vor der Teilung am größten. Die Beseitigung oder Verletzung des Mikronucleus ist natürlich letal und beseitigt das Teilungsvermögen. Die Cirren selbst können nicht regenerieren, wenn man ihnen Stücke abschneidet, ohne dabei die Basalkörnerzone zu tangieren; für den Regenerationsreiz ist nur das Cytoplasma selbst empfänglich.

Karl Bělař (Berlin-Dahlem).

Goldsmith, William M.: The process of ingestion in the ciliate *frontonia* (Die Nahrungsaufnahme bei dem Infusor *Frontonia*.) (*Southwest coll., Winfield.* Journ. of exp. zool. Bd. 36, Nr. 3, S. 333—351. 1922.

Untersucht wird der Mechanismus der Aufnahme von relativ großen und langen Objekten (z. B. Oscillatorien). Das Tier bringt zunächst sein Cytostom an das betreffende Objekt heran und befördert es im Anfang durch Zugwirkung der oralen Wimpern ins Innere, wobei die lokomotorischen Cilien den ganzen Körper gegen die Beute vorwärtstreiben und gleichsam darüber stülpen (Faktor 1 und 2). Ist das Objekt zu lang, um mit diesen Mittel völlig aufgenommen zu werden, so treten zwei weitere Faktoren in Aktion: erstens eine Drehung des Körpers um die Längsachse (Faktor 3), zweitens ruckweise Kontraktionen des Körpers (Faktor 4), durch die schließlich eine Knickung des Fadens herbeigeführt wird. Diese beiden Manöver werden durch den Druck, den der noch ungebrochene Faden auf die oberflächliche Protoplasmaschicht ausübt, provoziert. Als 5. Faktor ist noch die Zyklose zu erwähnen, die jedoch nur bei der Aufnahme kleiner Nahrungskörper eine nennenswerte Rolle spielt. Die Körpergestalt wird durch Aufnahme großer Nahrungskörper oft auf bizarre Weise verändert.

Karl Bělař (Berlin-Dahlem).

Woodburn, William Logan: Spermatogenesis in *Asterella hemisphaerica*, Beauv. (Die Spermatogenese bei *Asterella hemisphaerica* Beauv.) Ann. of botany Bd. 3 Nr. 144, S. 535—540. 1922.

Die Teilungsvorgänge in der spermatogenen Zelle werden beschrieben. Es sind 8 Chromosomen vorhanden. Vor der Spindelbildung entstehen an entgegengesetzten Stellen des Kern kleine dichte cytoplasmatische Kappen, und zwar dort, wo später die Spindelpole liegen. Die Plasmakappen gehören weder zur ständigen Zellstruktur, noch sind sie Centrosomen. In der Nähe der Plasmamembran wird der Blepharoplast gebildet. Das voll entwickelte Spermatozoe besteht aus einem gebogenen, keulenartigen Teil, dem Kern, und einem sich bis in den fadenförmigen Blepharoplasten allmählich zuspitzenden Teil. An diesem Ende finden sich zwei Cilien.

Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Kopsch, Fr.: Frühzeitige Bildung reifer Geschlechtszellen bei *Rana fusca* und *Rana arvalis*. Verhandl. d. anat. Ges. a. d. 31. Vers. in Erlangen v. 24.—27. IV. 19 (Anat. Anz. Bd. 55, Erg.-H.). S. 182—187. 1922.

Verf. hat schon früher mitgeteilt, daß *Rana fusca* (und auch *R. arvalis*) viel schneller wächst, als bisher angenommen wurde. Jetzt stellt er fest, daß auch die Angaben über die Zeit der Geschlechtsreife geändert werden müssen. Unter 34 Tieren (fast ausschließlich *R. fusca*, Alter 5—14 Monate) von zwei Zuchten fanden sich 4 Weibchen mit relativ weit entwickelten Eierstöcken und 4 Männchen mit reifen Spermien im Hoden. Besonders bemerkenswert ist der Fall eines 7 Monate alten, schon 41 mm langen Weibchens.

tens mit mächtig entwickelten Eierstöcken (zahlreiche pigmentierte Eier von 1,5 mm Durchmesser) und ebensolchen Eileitern sowie der eines 5 Monate alten, 36 mm langenännchens mit 6 mm langem linken und etwas kleinerem rechten Hoden und voll ausgebildeter Spermiogenese. Verf. hebt hervor, daß unabhängig vom Alter die mit reifen eschlechtszellen ausgestatteten Tiere wenigstens 35 mm lang sind. Es scheint also cht allein das Alter, sondern auch die Höhe der gesamten körperlichen Entwicklung n Bedeutung für die Erreichung der Geschlechtsreife zu sein. S. Gutherz (Berlin).

Frederikse, A. M.: Etudes sur l'ovogenèse des Dytiscides. (Studien über die Oogenese der Dytisciden.) Arch. de biol. Bd. 32, H. 4, S. 629—650. 1922.

In den Oogonien des schwarzen Schwammkäfers (Dytiscus) ist ein Chromatinring von iardi na beschrieben worden. Der Verf. stellte es sich zur Aufgabe, die Natur dieses Gebildes i überprüfen. Zu dem Zwecke verwandte er Reaktionen auf Eiweiß und auf die Löslichkeit s genannten Chromatinringes. Es ergab sich dabei, daß das Chromatin der Geschlechtsellen von Dytiscus sich chemisch genau so wie das Chromatin im allgemeinen verhält, und dies lt auch für den Giardinaschen Ring der Oogonien. Ferner konnte das Vorhandensein n maskiertem Phosphor festgestellt werden. Pepsin, Trypsin und Nuclease führten zur Aufung der Kerne und des Ringes. Die Mitochondrien haben weder etwas mit der Substanz i tun noch mit dem in Rede stehenden Chromatinring; letzteren hält der Verf. für eine Art on Trochochromatin. Cori (Prag).

Okajima, K.: Zur Anatomie des Hyobranchialskelettes bei den Onychodactylus-ryen. (Anal. Inst., Keio Univ., Tokyo.) Folia anat. japonica Bd. 1, H. 4, S. 19—200. 1922.

Dem Verf. ist es gelungen, das Vorkommen des Hyobranchiale III im Hyobranchialdelett bei den Salamandriden (Hynobius nebulosus und Onychodactylus japonicus, beides -panische Urodelen) während des Larvenlebens nachzuweisen. Cori (Prag).

Raud, Gudrun und Hans Spemann: Die Entwicklung isolierter dorsaler und teraler Gastrulabhälften von Triton taeniatus und alpestris, ihre Regulation und Post-eneration. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 52, H. 1/2, S. 95—166. 1922.

Durch Glasfäden, welche auf Tritoneier aufgelegt und durch Glasreiter beschwert erden, gelang es dem Verf., Entwicklungsstadien dieser Tiere ohne Substanzverlust i durchtrennen. Weiters wurden vital gefärbte Gewebstückchen an gewünschten tellen zur Einheilung gebracht, um auf diesem Wege Marken an den Versuchsobjekten i gewinnen. Eine zweite angewandte Methode bestand in der Einschnürung der Triton-er durch Anlegung einer Haarschlinge an denselben. Bei frontaler Durchschneidung es Gastrulastadiums hat die dorsale Keimbälfte zu Beginn der Gastrulation eine hr gute Regulationsfähigkeit erwiesen, die aber mit dem Ablauf des Gastrulations-ozesses erlischt. Wird eine Gastrula median durchtrennt, so dehnt sich die halbe rmundlippe allmählich nach beiden Seiten hin aus und der Urmundverschluß bleibt äufig ein unvollkommener. Die Medullarplatte verhält sich diesem Eingriff gegen-ber in der Weise, daß sich die innere (mediane Defekt-) Seite einkrümmt, und daß s dann zu einer schwächeren Ausbildung des inneren Medullarwulstes kommt. Das o entstandene sekundäre Medullarrohr und die sekundären Urwirbel entstehen daher u einem Material, welches normalerweise etwas ganz anderes gebildet haben würde. Durch eine in bestimmter Weise erfolgte Aneinanderfügung zweier Embryonen mit nvollkommen geschlossenem Urmund ergeben einen Janus mit defekter Ausbildung es einen Rückens. Der primäre halbe Medullarwulst wächst in eine symmetrische chwanzknospe aus, während das sekundäre Medullarrohr nur ein rudimentäres chwänzchen liefert. Andere Experimente lassen endlich schließen, daß ein von der ortschreitenden Differenzierung unabhängiger Faktor auf die Wiederherstellung der ilateralen Symmetrie hinarbeitet. Cori (Prag).

Boyden, Edward A.: The early development of the cloaca in ostrich embryos, with special reference to the reduction of the caudal intestine. (Die frühe Entwicklung der Kloake bei Straußenembryonen, mit besonderer Berücksichtigung auf die Reduktion des caudalen Darmes.) (Dep. of anat., Harvard med. school, Cambridge.) Anat. record Bd. 24, Nr. 4, S. 211—221. 1922.

Die Kloake des Straußen besitzt 2 bemerkenswerte Besonderheiten, und zwar enorm große männliche Kopulationsorgane und die Resistenz der Bursa fabricii in unvermindertem Um-

fange, während letzteres Organ bei Vögeln mit Brustbeinkamm und Flugvermögen (Carinaten) der Rückbildung unterliegt. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem ersten Auftreten der Kloake bis zum Stadium, in welchem sich die Bursa fabricii bildet. Das Hauptinteresse betrifft die Entstehung des sog. Kloakenfensters durch Auflösung und Durchbruch desjenigen Teiles der Kloakenwand, welcher unterhalb der Aorta liegt. Gleichzeitig erfolgt mit diesen Vorgängen die Atrophie des Schwanzdarmes. Die Straußenembryonen zeigen einen ausgesprochenen Reptiliencharakter in bezug auf die Kloake als die Embryonen der Carinaten, denn der Urogenitalsinus stellt bei jenen sozusagen die dorsale Blase der Saurier dar, welche sich beim Strauß vom proximalen Ende des Schwanzdarmes ableitet. *Cori* (Trag).

Rabl, Hans: Weitere Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Derivate des Kiemendarmes beim Meerschweinchen. I. Morphologie des thyreo-thymischen Organkomplexes in der späteren Fötalperiode. II. Die Histogenese der Schilddrüse. III. Die Entwicklung der Arterien der Schilddrüse. Arch. f. mikroskop. Anat. Abt. 1 u. 2, Bd. 96, H. 1/2, S. 210—314. 1922.

Die Arbeit bildet die Fortsetzung über die Entwicklung der Derivate des Kiemendarmes beim Meerschweinchen von 3,8—14,5 mm Körperlänge. Es werden nun weiter die Embryonen von 15—85 mm Körperlänge untersucht. Bei dem thyreo-thymischen Organkomplex fällt als wesentlichstes Ergebnis der Untersuchung das ungleiche Wachstum der verschiedenen Schlundderivate auf. Der ultimobronchiale Körper zeigt während der ganzen Dauer der embryonalen Entwicklung keinerlei Größenzunahme. Der äußere Epithelkörper dagegen nimmt in diese Periode an Größe zu. Der innere Epithelkörper wird erst beim Embryo von 15,5 mm an von bedeutenderem Umfang. Viel intensiver als das Wachstum der Epithelkörper ist das der Schilddrüse. Sie nimmt während der Entwicklung des Embryos von 15,5—85 mm in kranio-caudale Richtung um das 6fache, in transversaler um das 5fache zu. An diesem lebhaften Wachstum hat vielleicht bis zu einem gewissen Grade die reichliche Vascularisation Anteil. Noch we mehr wie die Schilddrüse nimmt die Thymus während dieser Periode an Masse zu. Beim 85 mm langen Embryo ist der kranial-caudale Durchmesser 30 mal, der transversale 20 mal größer als beim 15,5 mm langen Embryo. Die verschiedene Größenzunahme der erwähnten Organe richtet sich nach der für den Embryo nötigen Hormonmenge. Bezüglich der Histogenese der Schilddrüse kommt der Verf. zu dem Schluß, daß das Kolloid schon sehr früh und dann immer stärkerem Maße ausgeschieden wird. Bei Embryonen von 50 mm Länge an hat die Schilddrüse schon alle Eigenschaften des ausgebildeten Organs. Bezüglich der Entwicklung der Arterien der Schilddrüse, die von Embryonen von 5,1 mm Länge an untersucht wurde kommt der Verf. zu dem Schluß, daß sie in Form eines indifferenten Capillarpexus angeordnet werden, der in seiner ersten Anlage unabhängig von mechanischen Bedingungen ist. Er glaubt darin ein glänzendes Beispiel für die Richtigkeit der Netztheorie gefunden zu haben. *Harn*.

Huber-Pestalozzi, G.: Über Bruchdreifachbildung bei einem einzelligen Organismus. (Ceratum hirundinella O. F. M.) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 52, H. 1/2, S. 276—280. 1922.

Im Anschluß an die Untersuchungen v. Przibram über „Die Bruchdreifachbildung im Tierreich“ teilt der Verf. entsprechende Beobachtungen an Ceratum hirundinella mit. Eine Analogie zu den Coleopteren und Crustaceen, bei denen die Erscheinung im Freien am häufigsten wahrgenommen wird, besteht darin, daß auch Ceratum ein Exoskelett besitzt. Bei einer Kontinuitätstrennung an der Basis des Körperanhanges entstehen zwei Wundflächen, eine proximale und eine distale. Beide ein Regenrat liefern, so finden sich schließlich an Stelle eines Körperanhanges drei Anhänge. Es werden einige Fälle mit Bruchdreifachbildung am Apicalhorn oder an den Hinterhörnern beschrieben. Die Neubildungen sind meist spiegelbildlich ähnlich dem ursprünglichen Horn ist seitlich abgeknickt. Die Ursachen der Erscheinung sind auf eine Verletzung, einen Bruch zurückzuführen. Werden Kulturproben mit Ceratum 5—10 Minuten stark zentrifugiert, so sind in ihnen am folgenden Tage viel mehr Exemplare mit Bruchzwei- und -dreifachbildungen zu finden, als in Proben, die vorsichtig 1—2 Minuten zentrifugiert wurden. (Vgl. diese Berichte 8, 385.) *Taube* (Riga).

Clark, Eliot R.: Reactions of experimentally isolated lymphatic capillaries in the tails of amphibian larvae. (Verhalten experimentell isolierter Lymphcapillaren in den Schwänzen von Amphibienlarven.) *Dep. of anat., univ. of Missouri, Columbia*. Anat. record Bd. 24, Nr. 4, S. 181—191. 1922.

Isolierte Capillaren des Lymphsystems, die von ihrer Verbindung getrennt worden waren, zeigten in den durchsichtigen Schwänzen von Amphibienlarven am lebend,

ber betäubten Tiere alle Stufen der Heilung. Die Epidermis wurde an der Schnittstelle trübe und schloß sich bald durch Anhäufung vieler Epidermiszellen an der Wundstelle. Schon nach 15 Minuten blieben in den benachbarten Blutgefäßen die Leukocyten fest an den Wänden haften, dann folgte ein Zusammenschrumpfen der zerschnittenen Gefäßwände. In den zerstörten Blutgefäßen fand eine langsamere Zirkulation statt nach den Flossenrändern hin, dies bezieht sich auf einen zerschnittenen Blutgefäßplexus (vollkommen isolierte einzelne Gefäße waren nicht in der beschriebenen Experimentreihe vorhanden). Das Blut floß langsam in verschiedenen Richtungen in dem isolierten Plexus, aber schon nach 3 Tagen war die Verbindung hergestellt, und zwar durch Aussprossungen solider Fortsätze, die sich wie in dem normalen Entwicklungsgange auch hier mit einem Lumen versahen. Dagegen waren die isolierten Lymphgefäße noch nach 3 Tagen unverbunden. In den folgenden Tagen wurde ab und zu eine Erweiterung und Verengerung der unverbundenen Lymphcapillaren beobachtet. Sie blieben bis zu 3 Wochen am Leben. In einigen wenigen Fällen konnte man das Aussprossen eines Zellstranges auch hier beobachten, der sich in Capillare umwandelte und den Anschluß an die Lymphcapillaren fand. Eine Umwandlung von Lymphcapillaren in Blutgefäße findet bei Amphibienlarven, wie von manchen Autoren behauptet, nicht statt. *Rhoda Erdmann* (Berlin Wilmersdorf).

Magnus, Georg: Über den Nachweis der Lymphgefäße in der Zahnpulpa. *Chirurg. Klin., Jena.* Dtsch. Monatsschr. f. Zahnheilk. Jg. 40, H. 21, S. 661—666. 1922. Anwendung der Wasserstoffsuperoxydmethode auf die Zahnpulpa. H_2O_2 spaltet in Berührung mit Körpersäften (Katalase der Lymphe) Sauerstoff ab und macht im Gewebe die kleinen Lymphbahnen sichtbar. Träufelt man auf die Pulpa eines gespaltenen Zahnes H_2O_2 , so fällt zunächst eine Gasfüllung der Blutcapillaren auf; diese Füllung ist sehr flüchtig, sie entleert sich wieder, um dann ein anderes, tiefer gelegenes, morphologisch von dem ersten leicht zu trennendes System sichtbar werden zu lassen. (Betrachtung mit einem Zeisschen Planktonsucher unter physiologischer Kochsalzlösung bei seitlicher Beleuchtung.) Es handelt sich um ein Gewirr von offenbar präformierten Hohlräumen, die miteinander zusammenhängen, deutlich von Bluträumen verschieden. Ob und wieweit es wirkliche mit Endothel ausgekleidete Lymphgefäße oder Lymphspalten sind, kann nicht entschieden werden. Der Nachweis der Lymphgefäße im Bindegewebe der Pulpa kann als gesichert angesehen werden. *Busch* (Erlangen).

Rienhoff, William Francis: Development and growth of the metanephros or permanent kidney in chick embryos. (Eight to ten days' incubation.) (Entwicklung und Wachstum des Metanephros oder der bleibenden Niere in Hühnerembryonen. [Acht bis zehn Tage der Bebrütung].) (*Dep. of surg., Johns Hopkins univ., Baltimore, a. dep. of embryol., Carnegie inst., Washington.*) Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 33, Nr. 381, S. 392—406. 1922.

Der Verf. fand, daß bei der Entwicklung und dem Wachstum des Metanephros von Hühnerembryonen eine kontinuierliche Schicht von Endothelzellen die Sammel- und gewundenen Kanälchen umgibt. Letztere gehen an Ort und Stelle aus einer kommaförmigen Masse undifferenzierten Nierengewebes hervor. Dieselbe kommaförmige Masse gibt auch den Ursprung für die S-förmigen Röhren. Die Glomeruli, einschließlich ihrer Capillaren und Blutelemente, bilden sich in situ von einer undifferenzierten Zellmasse, welche die distalen Enden der gewundenen Kanälchen vollständig erfüllt. Das Blutgefäßsystem umgibt zunächst sinusartig die Metanephroskanälchen und wird später durch ein Capillarsystem ersetzt. Letzteres steht aber anfangs nicht in Verbindung mit den Capillaren der peripheren Blutzirkulation, sondern zwischen beiden Blutgebieten findet nur Diffusion statt. Die gewundenen Kanälchen wachsen direkt in die Sammelkanälchen hinein. *Cori* (Prag).

Amberson, William R.: Kinetics of the bioluminescent reaction in Cypridina. I. (Kinetische Untersuchungen der Biolumineszenzreaktion bei Cypridina I.) (*Physiol. laborat., Princeton univ., laborat. of pure science, Nela research laborat., Cleveland, Ohio.*) Journ. of gen. physiol. Bd. 4, Nr. 5, S. 517—534. 1922.

Bisher ist es nicht möglich, die chemischen Substanzen, die als Träger der Biolumineszenz angesehen sind, zu isolieren. Nach den Untersuchungen von Dubois und Harvey handelt es sich bei solchen Reaktionen um Oxydation von einer Luciferin genannten Substanz, die zu den Proteosen gehört und vielleicht an der Grenze zwischen

diesen und den Peptonen steht, unter der katalytischen Wirkung eines Enzyms „Luciferase“; letzterer schreibt Harve y Proteincharakter zu und ordnet sie den Albuminen zu. Verf. stellt es sich zur Aufgabe, die physikochemischen Vorgänge dieses Leuchtprozesses quantitativ zu verfolgen. Zur Materialgewinnung diente ein japanischer Muschelkrebs *Cypridina Hilgendorfii*, der durch eine außerordentlich intensive Lumineszenz (14,5—16 Millilamberts maximaler Lichtstärke) ausgezeichnet ist.

Die getrockneten Tiere wurden gepulvert und mit Äther extrahiert. Das Enzym Luciferase wurde in der Weise gewonnen, daß je 5 g des getrockneten Ausgangsmaterials mit kaltem Wasser bis zum Erlöschen der Leuchtkraft ausgezogen wurden. Filtriert halten sich diese Auszüge 3—4 Tage, beim längeren Stehen ebenso wie beim Zusatz von Chloroform flocken die Enzymteilchen aus, so daß stets frisch bereitete Aufschwemmungen benutzt werden müssen. Das gilt auch für die Luciferinlösungen. Sie wurden so dargestellt, daß 2 g des Pulvers mit 40 ccm Wasser zunächst zur Zerstörung des koto labilen Ferments schnell aufgekocht und dann schnell abgekühlt wurden. Die klare Flüssigkeit wird dekantiert, da bei der Filtration zuviel Luciferin verlorengeht, und zwar im wesentlichen durch spontane Oxydation. Die Schnelligkeit des Reaktionsablaufs sowie die geringe Lichtstärke der Leuchterscheinung die beim Zusammengießen der so dargestellten Luciferin- und Luciferaselösungen entsteht machten es notwendig, an Stelle einfacher direkter Methoden eine komplizierte photographische Methode zur Untersuchung der Leuchtreaktion auszuarbeiten. Da die photographischen Messungen eingeschränkt sind durch die ungleichmäßige Verteilung der lichtempfindlichen Schicht, wurde der Film zunächst auf seine Schichtfehler untersucht. Unterschied der Schicht waren um so geringer (unter 3%), wenn immer nur ein kurzes Stück verwandt wurde. Die Filmlänge für den gleichen Versuch blieb daher auf 250 mm und 35 mm Höhe beschränkt; die spektrale Empfindlichkeit des Films bestand bis zu einer Wellenlänge von 590 μ . Der Film war auf einer automatisch laufenden Kymographiontrommel fixiert, die den Film in 1 mm Abstand an den Reaktionsgefäßen vorbeiführte. Als letztere dienten Reagensgläser von gleichem Durchmesser, auf die ein Streifen von Phosphorbronze aufgeklebt war, in der Fenster von 1,5 mm Breite und 6 mm Höhe mit großer Genauigkeit (Fehler < 1% ausgeschnitten sind. Es werden stets gleichzeitig zwei Kontrollaufnahmen gemacht. Von den Gläsern steht das Fenster des einen 10 mm über dem des entsprechenden. Trommelfläche Reagensglasachse und Fenstermitte liegen jeweils in einer Vertikalebene. Die Fenster stehen gegenüber dem unteren Rand des mittleren Filmdrittels; die Umlaufgeschwindigkeit des Films beträgt 4,123 mm pro Sekunde. In die Reagensgläser werden mit der Pipette 20 ccm Luciferinlösung eingefüllt, dann wird die Trommel in Bewegung gesetzt und in jedes der beiden Röhrchen aus je einer mit einem gemeinsamen Gummiballon entleerbaren Pipette 1 ccm Enzymlösung zugesetzt. Während der Reaktion rührt ein mit einem Motor betriebenes Rührwerk die Flüssigkeit dauernd gleichmäßig durch. Die so gewonnenen Aufnahmen der Lichte effekte wurden verglichen mit Bildern vom Lichte ffekte bekannter Intensität und auf diese Weise ausgewertet. Um für die Vergleichslichtquelle Licht von gleicher spektraler Zusammensetzung zu haben, benutzte Verf. ebenfalls die gleiche tierische Lichtquelle, Filmfehler schaltet er dadurch aus, daß er die Vergleichsbilder auf dem obersten unbenutzten Drittel des Films entstehen ließ. Es wird dabei so vorgegangen, daß der Film mit der Schichtseite nach der Konkavität auf einen bogenförmigen Messingstreifen aufgezogen wird; der Streifen trägt in seinem oberen Drittel 15 Fenster, die bis auf 2 mit Lichtfiltern von bekanntem Absorptionwert versehen sind. In der Mitte des Kreisbogens befindet sich das Reaktionsgefäß, das abgebildet ist, daß alle Fenster die gleiche Lichtmenge erhalten. Die Auswertung der Resultate erfolgte mit einem optischen Pyrometer.

Ellinger (Heidelberg).

Amberson, William R.: Kinetics of the bioluminescent reaction in *cypridina*. II. (Kinetische Untersuchungen der Biolumineszenzreaktion bei *Cypridina*. II.) (*Physiol. laborat., Princeton univ. a. laborat. of pure science, Nela research laborat., Cleveland Ohio.*) Journ. of gen. physiol. Bd. 4, Nr. 5, S. 535—558. 1922.

Mit der in der 1. Abhandlung (vgl. vorstehendes Referat) angegebenen Methode wird zunächst der Reaktionsverlauf der Biolumineszenz untersucht. Zunächst wird die Frage diskutiert, ob es sich bei dem Leuchtprozeß um eine Phosphoreszenz oder eine Lumineszenz handelt. Während ein Phosphoreszenzprozeß im Sinne einer bimolekularen Reaktion verlaufen müsse, sei die Lumineszenz als monomolekularer Prozeß aufzufassen. Für die Beobachtung ist die Hypothese erforderlich, daß die Lichtintensität ein direktes Maß für die Reaktionsgeschwindigkeit darstellt. Wenn k die Geschwindigkeitskonstante, A die Anfangskonzentration des Luciferins, X die in der Zeit t verbrauchte Luciferinmenge und I die Lichtintensität darstellt, so gilt für die monomolekulare Reaktion die Formel $I = \frac{dx}{dt} = k(A - X)$. Daraus

hält man durch Integration: $I = -kt + \log A k$. Dieser Formel folgt der Reaktionsablauf tatsächlich, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht.

Zeit m Film	Gefundene Intensität	Nach obiger Formel berechnete Intensität	Zeit mm Film	Gefundene Intensität	Nach obiger Formel berechnete Intensität
0	3,358	1,479	100	0,152	0,145
5	1,778	1,318	110	0,115	0,115
10	1,101	1,175	120	0,096	0,092
20	0,891	0,929	130	0,073	0,072
30	0,692	0,731	140	0,059	0,058
40	0,575	0,575	150	0,044	0,046
50	0,468	0,460	160	0,035	0,036
60	0,355	0,367	170	0,030	0,029
70	0,295	0,293	180	0,022	0,023
80	0,215	0,232	190	0,018	0,018
90	0,184	0,184	200	0,014	0,014

Eine Ausnahme machen lediglich die Werte für die ersten 10 mm, wo beim ersten Zündflammen die gefundenen Intensitäten die berechneten bei weitem übertreffen. Dies wird so erklärt, daß beim Zusammentreffen von Luciferin und Katalysator durch die Ansprache der gesamten freien Enzymoberfläche der Prozeß außerordentlich rasch eingeleitet wird und sich erst nach einiger Zeit ein Gleichgewicht zwischen den Enzymteilen und dem unverbrauchten Luciferin einstellt. Kontrollen, die unter denselben Bedingungen angestellt sind, liefern gut übereinstimmende Ergebnisse. Während die Durchmischung ohne Einfluß auf den Reaktionsablauf bleibt, ist die Geschwindigkeit abhängig von der Konzentration des Katalysators. Die Konzentration des Luciferins beeinflußt die Geschwindigkeitskonstante nicht, sie hat stets für natürliche Logarithmen den Wert 5,59. Schließlich wird noch der Temperaturkoeffizient Q_{10} der Reaktion berechnet. Aus der Formel $Q_{10} = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{\frac{10}{t_1 - t_0}}$ ergibt sich für 15–25° hierfür der Wert 4,5, für 25–35° der Wert 3,0. Bei der Diskussion der gefundenen Tatsachen wird darauf hingewiesen, daß der Verlauf des Prozesses als monomolekulare Reaktion stets einen erheblichen Sauerstoffüberschuß voraussetzt. Ebenso folgt daraus, daß der Oxydationsprozeß nicht im Sinne der Zystein-Zystinoxydation vom Typ $(R-S-H) + O = R-S-S-R + H_2O$ verläuft, sondern im Sinne der Leuko-äthylblauoxydation im Sinne $M-H_2 + O = M + H_2O$. Die spontane Reaktion des Luciferins mit dem Luftsauerstoff ist von so viel geringerer Größenordnung, daß sie das Bild der Enzymreaktion nicht beeinträchtigt. Sie verläuft wahrscheinlich nach der gleichen Formel.

Ellinger (Heidelberg).

Minnich, Dwight E.: A quantitative study of tarsal sensitivity to solutions of saccharose, in the red admiral butterfly, *Pyrameis atalanta* Linn. (Eine quantitative Untersuchung über die Empfindlichkeit der Fußglieder des Admirals, *Pyrameis atalanta* L., gegen Saccharoselösungen.) (*Dep. of anim. biol., univ. of Minnesota, Minneapolis.*) *Journ. of exp. zool.* Bd. 36, Nr. 4, S. 445–457. 1922.

Dem Verf. ist es gelungen, beim „Admiral“ Geschmacksorgane an den Fußgliedern nachzuweisen (vgl. diese Berichte 15, 204). Läßt man einen solchen Schmetterling längere Zeit dursten, so entrollt er seinen Rüssel, sobald mittelst eines durchtränkten Wattebäuschchens seine Fußglieder mit destilliertem Wasser oder mit wässerigen Lösungen in Berührung gebracht werden. Läßt man nun das Tier sich mit Wasser sättigen, so reagiert es nicht mehr bei Berührung der Fußglieder mit destilliertem Wasser, wohl aber bei Berührung mit einer 1 M Saccharoselösung (gemeint ist offenbar Mol in 1 l Wasser. Ref.). Diese Reaktion der Schmetterlinge wurde zu einer quantitativen Untersuchung ihrer Geschmacksempfindlichkeit benützt.

Methode: Die Schmetterlinge wurden ohne Futter und Wasser gefangengehalten, bis sie auf Berührung der Fußglieder mit Wasser in 100% der Fälle positiv reagierten. Von da ab wurde ihnen morgens und abends destilliertes Wasser gereicht, womit sie sich einige Tage bei Kräften halten ließen; schließlich wurden sie schwach, und nun erhielten sie 3 Tage lang als Futter eine 1 M-Saccharoselösung. Dann ließen sie sich durch eine abermalige Hungerkur nochmals für die Versuche geeignet machen. Vor jeder Prüfung der Tarsalorgane mit einer

Saccharoselösung wurde ein Kontrollversuch mit destilliertem Wasser gemacht. Wenn auf Wasser keine Reaktion, auf Saccharoselösung aber binnen 1 Minute ein Vorstrecken des Rüssels erfolgte, galt der Versuch als positiv.

Ergebnis: Die gefundenen Schwellenwerte waren vom Ernährungszustand des Schmetterlings abhängig. Während der Periode, in welcher das Versuchstier auf reine Wasserdiät gesetzt war, sank der Schwellenwert außerordentlich und man erhielt schon mit Saccharoselösungen von M/3200, M/6400, ja sogar M/12 800 positive Reaktionen. Die Fußglieder des Admirals sind also für Saccharose 256 mal empfindlicher als die menschliche Zunge. Sobald der Schmetterling aber (in der folgenden Diäperiode) mit Saccharoselösung gesättigt ist, sind viel konzentriertere Lösungen erforderlich, um eine Rüsselreaktion auszulösen.

K. v. Frisch (Rostock).

● Morgan, Thomas Hunt: Some possible bearings of genetics on pathology (Einige mögliche Beziehungen der Genetik zur Pathologie.) Lancaster: New era printing company 1922. 33 S.

Vortrag (Middleton Goldsmith lecture). Betrachtungen über die Vererbung gewisser Abnormitäten und krankhafter Erscheinungen. Über die Verbreitung rezessiver Gene, die Defekte und Mißbildungen beim Menschen veranlassen, wissen wir sehr wenig. Tritt ein solcher erblicher Defekt bei einem menschlichen Individuum in Erscheinung, so sind wahrscheinlich die betreffenden Gene in den vorhergehenden Generationen bereits in heterozygotem Zustande vorhanden gewesen. Ist der Defekt so, daß eine Elimination des Individuums zu erwarten ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß das betreffende Gen in der Rasse weite Verbreitung finden wird, gering. Selbst wenn das rezessive Merkmal vorteilhaft ist, ist die Möglichkeit, daß es verloren geht, sehr groß. Handelt es sich um einen dominanten Defekt (Beispiel: Kurzfingerigkeit), so ist die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung des Genes noch geringer, da das Merkmal ja auch bei den Heterozygoten auftritt und diese infolgedessen ebenso wie die Homozygoten eliminiert werden können. Günstig für die Ausbreitung liegen die Verhältnisse nur, wenn das Merkmal gleichzeitig dominant und vorteilhaft ist. Auffällig ist, daß ein hoher Prozentsatz der bei *Drosophila* und anderen Tieren (die gleichen Beobachtungen machte Baur bei *Antirrhinum* — Ref.) beobachteten dominanten Mutationen in homozygotem Zustande nicht lebensfähig ist, und zwar vielfach auch dann, wenn die bei den Heterozygoten zu beobachtenden Mutationsmerkmale die Lebensfähigkeit des Individuums durchaus nicht herabsetzen; die Ursache dieser Letalwirkung ist unbekannt. Sichere Beobachtungen über letale Dominanten beim Menschen liegen bisher nicht vor. Häufig sind die Bastarde kräftiger und fruchtbarer als die elterlichen Rassen und haben daher bessere Aussicht zu überleben als diese. Die Frage, inwieweit diese bei Pflanzen und Tieren gemachte Beobachtung auch für den Menschen gilt, wo die Bedeutung der sog. „Rassereinheit“ meist ausschließlich nach politischen, religiösen oder militaristischen Gesichtspunkten beurteilt werde, ist biologisch bisher kaum in Angriff genommen worden. Nach einem kurzen Hinweis darauf, daß die Mehrzahl der erblichen Anomalien beim Menschen wahrscheinlich durch multiple Faktoren bedingt ist, wodurch eine Klarlegung des Erbganges außerordentlich schwierig wird, zumal bei den geringen Nachkommenzahlen und der Unmöglichkeit bestimmte Kombinationen herzustellen, wendet sich Morgan einigen speziellen Fällen zu. Als Beispiele für geschlechtsgebundene Vererbung werden Farbenblindheit und Bluterkrankheit besprochen. Als einer der bemerkenswertesten Fälle von Vererbung beim Menschen werden die sog. Blutgruppen behandelt. Die Vererbung der vier Blutgruppen läßt sich nach M. ohne weiteres erklären, wenn man zwei Faktorenpaare als wirksam annimmt. An der Hand einiger Schemata wird dies ausführlich dargestellt. Über die Vererbung der Körpergröße beim Menschen ist Sicheres noch nicht bekannt. Wahrscheinlich sind auch hier multiple Faktoren wirksam. M. weist sodann auf erblichen Eigenschaften der Drüsen mit innerer Sekretion hin und bespricht kurz seine Untersuchungen an verschiedenen Hühnerrassen (*Campines*, *Sebrights*), die

e ein Zusammenhang zwischen diesen Drüsen und bestimmten Erbfaktoren festgestellt wurde. Die Erbllichkeit geistiger Störungen ist ein noch viel umstrittenes Gebiet. M. warnt davor, gewisse Geisteskrankheiten als einfach mendelnde Merkmale zu betrachten oder gar zu glauben, daß ihr Erbgang bereits klargelegt sei. Das statistische Material ist nicht überzeugend. Untersuchungen über erbliche Immunität und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten sind in den letzten Jahren an Tieren und Pflanzen von verschiedenen Seiten ausgeführt worden. Auch hier sind meist mehrere Faktoren im Spiele. Die Möglichkeit der Entstehung eines spontanen Krebses durch Mutation wird erörtert. Bei *Drosophila* entstand eine Mutationsrasse mit einem geschlechtsgebundenen rezessiven Letalfaktor. Bei allen ♂ Larven mit diesem Faktor im X-Chromosom entwickelt sich ein Tumor, und die Larven gehen zugrunde, die heterozygoten ♀ leben normal, vererben aber das „Tumorgen“ auf die Hälfte ihrer Nachkommen, von denen die ♂ wieder zugrunde gehen. Bemerkenswert ist, daß bei fortgesetzter Zucht der Tumor bei den ♂ Larven mit dem „Tumorgen“ nicht mehr zur Entwicklung kommt, die Larven sterben bereits auf einem früheren Entwicklungsstadium. Bei Paarung der ingezüchteten Individuen mit solchen fremder Stämme erscheint der Tumor wieder. Auf die Frage, ob auch im Plasma Erbfaktoren lokalisiert sind, die für von der Mendelschen Vererbung abweichende Vererbungstypen verantwortlich machen sind, erwidert M., daß wir zwar die Existenz derartiger Erbräger nicht unbedingt verneinen können, daß sie aber jedenfalls keine bedeutende Rolle spielen können; bisher ist uns bei Tieren kein Fall bekannt geworden. Schließlich wird noch die Frage der Vererblichkeit individuell erworbener Eigenschaften berührt. 3 Fälle sind hier für den Pathologen von besonderem Interesse: Brown-Sequards Experimente über Vererbung nervöser Störungen bei Meerschweinchen, Stockards Alkoholexperimente ebenfalls mit Meerschweinchen und Guyers Experimente über die Vererbung induzierter Augendefekte bei Kaninchen. Die erstgenannten Experimente haben bei sämtlichen Wiederholungen negative Resultate gezeitigt und können als erledigt gelten, Stockards und Guyers Resultate bedürfen noch der genaueren Analyse. Erst dann läßt sich sagen, ob sie mit den sonstigen mendelistischen Ergebnissen harmonisieren.

Nachtsheim (Berlin).

Morgan, T. H.: On the mechanism of heredity. (Über den Mechanismus der Vererbung.) Proc. of the roy. soc., Ser. B, Bd. 94, Nr. B 659, S. 162—197. 1922.

Allgemein verständlich gehaltener Vortrag (Croonian lecture), mit besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der *Drosophila*forschung. — Nach einer kurzen Darstellung der Grundtatsachen (Zellteilung, Chromosomenkonjugation, Reifungsteilungen) werden im ersten Kapitel die beiden Mendelschen Gesetze, das Spaltungsgesetz und das Gesetz der freien Kombination, besprochen. Im zweiten Kapitel wird eine Reihe von Beweisen aus der *Drosophila*forschung dafür beigebracht, daß die Chromosomen in der Tat die Träger der Erbfaktoren sind. Es werden hier behandelt die Haplo-IV, die Triplo-IV, beide von Bridges entdeckt und zytologisch untersucht, die ebenfalls von Bridges entdeckte und zytologisch studierte Erscheinung der Non-disjunction sowie der Fall der jüngst von Frau Morgan entdeckten „doppelt gelben Weibchen“ (♀ mit zwei aneinanderhängenden X-Chromosomen, vgl. das vorausgehende Referat). Im dritten Kapitel wird auf Grund der Untersuchungen an nunmehr fünf *Drosophila*-Spezies das Gesetz der Koppelung abgeleitet. Das vierte Kapitel bringt eine Darstellung der Erscheinung des Faktorenaustausches, wobei Morgan sich zu zeigen bemüht, inwieweit die Konstruktion der Chromosomenkarten auf Grund des Austauschprozentsatzes unabhängig ist von den Vorstellungen, die man sich über die Art dieses Austausches machen kann. Das fünfte Kapitel ist dann einer kritischen Betrachtung dieser Vorstellungen und der Versuche, bestimmte zytologische Beobachtungen in dieser Richtung auszuwerten, gewidmet. M. kommt zu dem Resultat, daß zu der Zeit, wo nach den Untersuchungen der Genetiker der Austauschprozeß vor sich gehen muß, nach den Untersuchungen der Zytologen sich zwischen den homo-

logen Chromosomen Vorgänge abspielen, die als außerordentlich günstig für die Annahme eines solchen Austausches bezeichnet werden müssen. Wie aber der Prozeß im einzelnen verläuft, darüber müssen erst weitere zytologische Untersuchungen an günstigen Objekten Klarheit schaffen. Im letzten Kapitel stellt M. einige kurze Betrachtungen über die Beschaffenheit und Wirkungsweise der Faktoren an. Wir wissen, daß die Gene in den Chromosomen linear angeordnet sind, daß es materielle Teilchen sind, die sich durch Teilung fortpflanzen, und daß sie lange Perioden hindurch unverändert bleiben können. Wie sie die Zellen beeinflussen, ob sie dauernd wirksam sind oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen, wissen wir nicht, doch ist so viel sicher, daß der Organismus weitgehend das Ergebnis der Summe ihrer Aktivitäten ist. Den Schluß bilden einige spekulative Erörterungen über die Zahl und Größe der Gene bei *Drosophila melanogaster*. Zur Berechnung der Zahl sind verschiedene Methoden versucht worden, zu denen M. ausdrücklich bemerkt, daß sie nur eine ganz rohe Vorstellung über die wirkliche Zahl zu geben vermögen. Die Faktorenzahl bei *Drosophila* wird hiernach auf mehr als 2000 geschätzt, auf über 4000 also bei jedem Individuum, da jedes zwei Faktorensätze besitzt. Die Berechnungen der Größe der Gene führen zu Schätzungen, die zwischen 20 und 77/1000 eines Mikrons für das Gen liegen. Die Größe eines Hämoglobinmoleküls ist auf $2\frac{1}{2}/1000$ eines Mikrons berechnet worden, die eines Caseinmoleküls auf ungefähr ebensoviel. Das einzelne Gen scheint also nach diesen rohen Schätzungen etwas größer zu sein als einige Proteinmoleküle.

Nachtsheim (Berlin).

● **Jackmann, Otto:** Über die Vorstellbarkeit der direkt bewirkten Anpassungen und der Vererbung erworbener Eigenschaften durch das Prinzip der virtuellen Verschiebungen. Ein Beitrag zur theoretischen Biologie. (Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. von Wilhelm Roux, H. 28. Berlin: Julius Springer 1922. 123 S. M. 66.—.

Der Verf. führt aus, daß sich die organischen Anpassungen nur teilweise durch blastogene, richtungslose Abweichungen der Individuen von der Normalform (Selektionsprinzip Darwins) erklären lassen, während dies durch die Annahme der direkt bewirkten Anpassung und der Vererbung erworbener Eigenschaften (Lamarck leichter möglich ist. Zahlreiche Beobachtungen sprechen tatsächlich für die Lamarckschen Anschauungen; insbesondere ist es aber der experimentellen Forschung und der kausalanalytischen Betrachtungsweise zu danken, daß die Erkenntnis auf diesen Gebieten Fortschritte machte. Der Verf. versucht nun in der vorliegenden Schrift diese Fragen auch noch auf einem anderen Wege, nämlich auf dem der mathematischen Darstellung anschaulicher zu machen und bedient sich zu diesem Zwecke des Prinzip der virtuellen Verschiebungen. Durch Berücksichtigung der Eigenschaften dieses Prinzips würden die meisten Schwierigkeiten verringert werden, die für die Vorstellbarkeit der vorliegenden biologischen Probleme bestehen. Der Satz von der virtuellen Verschiebung besagt, daß lokale Gleichgewichtsstörungen auf das ganze System übertragen werden und überall Zustandsänderungen hervorrufen, die mit den Bedingungen des Systems verträglich sind, bis ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist. Diese Eigenschaft ist es aber gerade, die von den Vertretern der direkt bewirkten Anpassung und der Vererbung erworbener Eigenschaften für deren Zustandekommen vorausgesetzt wird. Sollten sich diese Darlegungen als richtig erweisen, so würden dadurch die Hauptsätze der Lehre von Lamarck bestätigt werden.

Cori (Prag).

Morgan, Lillian V.: Non-criss-cross inheritance in *Drosophila melanogaster* (Keine Übers-Kreuz-Vererbung bei *Drosophila melanogaster*.) Biol. bull. of the mar. biol. laborat. Bd. 42, Nr. 5, 267—274. 1922.

Normalerweise werden bei geschlechtsgebundener Vererbung die rezessive geschlechtsgebundenen Merkmale der Mutter auf die Söhne vererbt, die dominante allelomorphen Merkmale des Vaters auf die Töchter. In einem seit kurzem gezüchteten

Philosophia-Stamm ist eine völlige Umkehr dieser Verhältnisse eingetreten: alle Töchter weisen die geschlechtsgebundenen rezessiven Merkmale der Mutter auf, alle Söhne die dominanten allelomorphen Merkmale des Vaters. Diese Umkehr läßt sich erklären mittels der Annahme, daß die beiden X-Chromosomen der Mutter verbunden sind und sich bei der Reduktion wie ein einzelnes Chromosom verhalten. Die zytologische Untersuchung der Eier ergab die Bestätigung der Richtigkeit der auf Grund der experimentellen Ergebnisse gemachten Annahme. Das ♀, von dem der Stamm seinen Ausgang nahm, war ein somatisches Mosaik, indem in den vorderen und hinteren Körperteilen verschiedene geschlechtsgebundenen Merkmale ausgebildet waren. Kopf und Brust waren grau, der Hinterleib gelb (rezessiver geschlechtsgebundener Faktor yellow; nach Morgan bezeichnet die Gene als „Differentiale“). Gepaart mit grauem ♂ lieferte das ♀ lauter gelbe Töchter und graue Söhne. Dies ist zu erwarten, wenn die Hälfte der Eier des ♀ die beiden zusammenhängenden X-Chromosomen erhalten hat, die andere Hälfte kein X-Chromosom. Es sind dann folgende Kombinationen möglich: mütterliche $X + 1$ väterliches $Y = XXY$ -♀ (gelb, da beide X vom ♀), 2 mütterliche $X + 1$ väterliches $X = XXX$ -♀ (nicht lebensfähig), 0 mütterliches $X + 1$ väterliches $X = X$ -♂ (grau, da X vom ♂, infolge Fehlens des Y-Chromosoms aber steril), 0 mütterliches $X + 1$ väterliches $Y = Y$ -♂ (nicht lebensfähig). Ist die Annahme richtig, so muß also die Hälfte der ♀ und die Hälfte der ♂ Nachkommen der „doppelt gelben“ ♀ zugrunde gehen, und außerdem müssen die überlebenden ♂ Nachkommen steril sein. Beides war in der Tat der Fall. Da die ♀ Nachkommen außer den beiden zusammenhängenden „gelben“ X-Chromosomen noch ein Y-Chromosom haben, müssen auch sie wieder abweichende Vererbungsverhältnisse aufweisen; die Hälfte der Eier erhält zwei gelbe X-Chromosomen, die andere Hälfte ein Y-Chromosom. Gepaart mit grauen ♂ müssen diese ♀ infolgedessen gelbe XX -♀ und graue fertile Y -♂ ergeben. Auch dies war der Fall. Neben dem großen theoretischen Interesse haben die „doppelt gelben“ ♀ auch noch ein praktisches Interesse insofern, als es möglich ist, mit ihrer Hilfe gewisse Stämme mit Merkmalen des ersten Chromosoms am Leben zu erhalten, bei denen die ♀ unfruchtbar sind. Die ♂ solcher Stämme, gepaart mit doppelt gelben ♀, haben den Vätern gleiche Söhne und doppelt gelbe Töchter, es kommen mit anderen Worten die X-Chromosomen der Mutter immer nur auf die ♂ Nachkommen, das X-Chromosom des Vaters immer nur auf die ♂ Nachkommen. Hatte das zur ersten Kreuzung benutzte ♀ die Chromosomenkonstitution XXY , so sind alle lebensfähigen Nachkommen fertil, der Stamm reguliert sich selbst. Gegenüber überleben einzelne XXX -♀. Die X-Triploiden haben vom Normalen abweichende Augen und Flügel, der Hinterleib ist unvollkommen entwickelt, alle sind sehr schwächlich und vollständig steril. Sie haben graue Körperfarbe, da zwei Gelbfaktoren rezessiv sind gegenüber einem Graufaktor. Der Prozentsatz der überlebenden X-Triploiden wechselte in den verschiedenen Kulturen (in einer Kultur waren zeitweise ungefähr ebensoviele graue wie gelbe ♀ vorhanden, d. h. alle XXX -♀ überlebten); die Ursache hierfür ist unbekannt. In seltenen Fällen können die Doppelchromosomen voneinander getrennt werden. Die Vererbungsverhältnisse sind dann ganz normal. Hinsichtlich der Vererbung in den Autosomen lokalisierter Merkmale scheinen sich die doppelt gelben ♀ nicht von normalen zu unterscheiden. Die zytologische Untersuchung der doppelt gelben ♀ ergab bei diesen zwei zusammenhängende X-Chromosomen und dazu ein Y-Chromosom, bei dem selten überlebenden grauen ♀ konnten drei X-Chromosomen nachgewiesen werden. Die Entstehung des ursprünglichen Mosaik-♀ ist wahrscheinlich so zu erklären, daß es aus einem Ei mit einem X (den Graufaktor enthaltend) hervorging, welches durch ein Spermium mit Doppel- X (zwei Gelbfaktoren enthaltend) befruchtet wurde. In dem vorderen Teil (Kopf und Brust) dieses XXX -Individuums wurde diese Chromosomenkombination beibehalten, im hinteren Teile (Hinterleib) wurde das graue X eliminiert, der Hinterleib wurde gelb und das ♀ fruchtbar.

Nachtsheim (Berlin).

Gowen, Marie S. and John W. Gowen: Complete linkage in *Drosophila melanogaster*. (Vollständige Koppelung bei *Drosophila melanogaster*.) *Americ. naturalist*. Bd. 56, Nr. 644, S. 286—288. 1922.

Im Jahre 1917 erhielten die Verff. in einer Kultur von *Drosophila melanogaster* ein ♀, bei dem kein Faktorenaustausch im Geschlechtschromosom erfolgte. Von diesem ♀ ausgehend wurde ein Stamm gezüchtet, der in 80 Generationen bei über 3000 beobachteten Paarungen in keinem Fall Faktorenaustausch im X-Chromosom ergab. In weiteren Experimenten, bei denen im zweiten und dritten Chromosom lokalisierte Faktoren im Spiele waren, wurde festgestellt, daß auch in diesen Chromosomen der Austausch unterbleibt. Die Ursache dieser totalen Koppelung ist auf ein Gen zurückzuführen, das im dritten Chromosom in der Region zwischen *dichaete* (zweiborstig) und *hairless* (haarlos) lokalisiert ist. Der Faktor für totale Koppelung verhält sich gegenüber seinem normalen Allelomorph rezessiv. Beim ♂ von *Drosophila* findet niemals ein Austausch statt. Die Ursache ist unbekannt; bestimmte Gene, die dafür verantwortlich zu machen sind, sind bisher nicht gefunden worden. Den Austauschprozentsatz beim ♀ herabsetzende Gene beschrieb zuerst Sturtevant. Sie verhindern aber den Austausch nicht völlig und wirken auch nur auf das Chromosom bzw. Teile des Chromosoms, in dem sie lokalisiert sind. Das von den Verff. entdeckte Gen verhindert augenscheinlich den Austausch beim ♀ überhaupt. *Nachtsheim*.

Schmidt, Johs.: Rassenuntersuchungen. VI. Statistische Untersuchungen über Erbllichkeit bei *Zoarces viviparus* L. *Meddel. fra Carlsberg laborat.* Bd. 14, Nr. 2 S. 1—52. 1921. (Dänisch.)

Die Untersuchungen schließen sich an die Arbeiten von J. Schmidt (*Race Under søgelsel* I, II *Meddel. fra Carlsb. lab.* 13. Nr. 3. 1917 und 14. Nr. 1. 1917) an. Schon untersucht bei *Zoarces* die Anzahl der Wirbel, die Anzahl der Strahlen der rechten und linken Brustflosse und die der Pigmentflecken der Rückenflosse. Der Mittelwert für diese drei Charaktere ist bei den beiden Geschlechtern der gleiche. Es wurden zu den eigentlichen Untersuchungen nur Weibchen benutzt, und zwar aus 6 Proben, und von jedem Weibchen wieder 10 Embryonen. Die Gesamtzahl der untersuchten Tiere betrug für die Zahl der Wirbel und Flossenstrahlen 857, für die der Pigmentplatten 488 Mütter. Die einzelnen Populationsproben umfaßten 168 bis 842 Tiere, und zwar annähernd gleich viel Männchen und Weibchen. Verf. gibt dann noch die benutzten statistischen Formeln an, denen er eine neue für die geschwisterliche Korrelation hinzufügt. Sie ist brauchbar, wenn die einzelnen Familien gleich Individuenzahl besitzen, und lautet: $r_f = \frac{1}{9} \left(\frac{10\sigma_d^2}{\sigma_z^2} - 1 \right)$, wobei σ_d die mittlere Abweichung der Werte für die einzelnen Embryonen von ihrem Mittelwert, σ_d die der Mittelwerte der einzelnen Embryonendekaden, die ja von je einer Mutter stammen, von dem Mittelwert aller Dekaden bedeutet. — Im Abschnitt V werden dann die wichtigsten statistischen Angaben gebracht. Die Mittelwerte für die Wirbelanzahl und die Zahl der Flossenstrahlen ist im wesentlichen in den 6 Proben konstant, die für die Zahl der Pigmentplatten schwankt dagegen von einer Probe zur anderen. Die einzelnen Werte folgen dem gewöhnlichen Verteilungsgesetz. Die Regressionskurve ist eine Linie. Der Wert für die mütterliche Korrelation beträgt: Wirbel: 0,398 (0,407 mit der Shepardschen Korrektur), Flossenstrahlen: 0,262 (0,329), Pigmentplatten: 0,366 (0,379). Für die geschwisterliche Korrelation ergibt sich: Wirbel: 0,470 (0,480), Flossenstrahlen: 0,353 (0,420), Pigmentplatten: 0,350 (0,362). Diese Werte sind alle geringer als entsprechende Werte bei Säugetieren; sie erinnern aber an die von Punnett an Spinnweben gefundenen Werte. Die Frage, ob es sich bei den einzelnen Embryonen um Vollgeschwister handelt oder nicht, läßt sich auf statistischem Wege nicht entscheiden. Es wird dann noch die Genauigkeit der Werte für die Wirbelzahl bei verschiedenen Zahl und Größe der Nachkommenproben festgestellt. Ungeeignet für die Bestimmung der geschwisterlichen Korrelation ist eine geringe Anzahl vielköpfiger Familien.

wird dann auch die Genauigkeit der Werte bei der Untersuchung vieler Familien mit verschiedener Kopffzahl (1—10) festgestellt. Zum Schluß werden die Konsequenzen der Hypothese von Sch. über die „generativen Werte“ an dem neuen Zahlenmaterial von Zoarces geprüft.

F. Brieger (Jena).

Schmidt, Johs.: Rassenuntersuchungen. IX. Smith, Kirstine: Fortgesetzte Statistik über Erbllichkeit bei Zoarces viviparus L. Meddel. fra Carlsberg laborat. I. 14, Nr. 19, S. 1—42. 1922. (Dänisch.)

Es wird Material von der Station Langholm im Roskildefjord auf die Wirbelzahl, die Anzahl der Strahlen in der rechten Brustflosse und der Pigmentflecke untersucht. Das Material bestand aus Populationsproben, die in den Jahren 1915—1920 im Spätherbst gesammelt wurden zu einer Zeit, wo die Weibchen wohlentwickelte Embryonen enthielten. Da nach den Untersuchungen Schmidts die Mittelwerte der Rassencharaktere, wenigstens für die Wirbel und die Brustflossenstrahlen, von einem zum anderen Jahrgang ein wenig schwanken, so wurde das Material nach dem Jahrgang der Mütter und Embryonen in der Weise sortiert, daß in einer Gruppe sich nur Mütter desselben Jahrganges finden und Embryonen, die sich in ein und demselben Jahr entwickelten. Nach Erläuterung der angewandten Formeln wird die mütterliche und geschwisterliche Korrelation in bezug auf die genannten Charaktere an der Hand von zahlreichen statistischen Tabellen besprochen. Es wird festgestellt, daß die Korrelationskoeffizienten aller drei Charaktere vollkommen übereinstimmen mit den schon früher an Material aus Nakkehoved gewonnenen Resultaten, daß dagegen die Mittelwerte für Wirbel und Pigment an beiden Stationen durchaus verschieden sind. Ein Versuch zu entscheiden, ob die Nachkommen zweier in bezug auf die durchschnittliche Anzahl von Brustflossenstrahlen von einander stark abweichender Jahrgänge eine entsprechende Verschiedenheit aufwiesen, ergab keine entscheidende Resultate. Bei der Erpflanzung einer Probe von Nakkehage, wodurch die durchschnittliche Anzahl, besonders der Wirbel und Brustflossenstrahlen, sich stark veränderte, wurde nur für die Mittelabweichung und geschwisterliche Korrelation der Brustflossenstrahlen ein gewisser Unterschied von den Werten gefunden, die die Erbllichkeitsgesetze unter natürlichen Bedingungen beschreiben. (Vgl. auch vorstehendes Referat.) Taube (Riga).

Schmidt, Johs.: Diallel crossings with the domestic fowl. (Diallele Kreuzungen von Hausgeflügel.) Journ. of genetics Bd. 12, Nr. 3, S. 241—245. 1922.

Um eine Anzahl von Individuen nach quantitativen Merkmalen zu ordnen, wird diallele Kreuzung angewandt. Jedes Weibchen wird mit jedem Männchen gepaart, so daß bei a Weibchen und b Männchen die Zahl der verschiedenen Kombinationen in der Nachkommenschaft $a \times b$ beträgt. In jeder dieser Gruppen wird das zu untersuchende Merkmal von jedem Individuum durch Zählen, Messen oder Abwägen bestimmt und der Mittelwert festgestellt. Es wird unterschieden der „persönliche“ Wert eines Individuums — im vorliegenden Falle die Wirbelzahl — und der „generative“ Wert, d. h. der Wert, der auf die Nachkommenschaft übertragen wird. Da sie stark voneinander abweichen können, so darf von ersterem nicht auf letzteren geschlossen werden. Für den Forscher und praktischen Züchter ist die Kenntnis des generativen Wertes von besonderer Wichtigkeit. Wird nur ein Männchen mit a Weibchen gekreuzt, so ist der Mittelwert der a Nachkommengruppen ohne weiteres ein Ausdruck für die Verschiedenheit der generativen Werte der Weibchen. Umgekehrt kann durch Paarung desselben Weibchens mit verschiedenen Männchen nacheinander deren generativer Wert festgestellt werden. Frühere Untersuchungen an der Forelle zeigten, daß nicht nur die generativen Werte oder die Unterschiede zwischen ihnen, sondern auch die persönlichen Werte Brüche sein können. Gewisse Verschmelzungen von zwei Wirbeln wurden als Versuche gedeutet, Teile eines Wirbels hervorzubringen. Zu ähnlichen Untersuchungen wurde neuerdings vom Autor das Haushuhn herangezogen. Es wurden 2 Hähne (x und p) und 5 Hennen (a, b, d, e, f) miteinander gekreuzt. In Tab. I ist die Wirbelzahl der 10 Nachkommengruppen für jedes Hühnchen an-

gegeben, Tab. II gibt die mittlere Wirbelzahl jeder Gruppe und die Differenz der generativen Werte der Hähne x und $y \left(\frac{y-x}{2} \right)$. Aus den Tabellen ist zu ersehen, daß der eine Hahn (y) einen größeren generativen Wert als der andere (x), hat und daß die fünf Werte für $\frac{y-x}{2}$ zwischen 0,63 und 0,69 schwanken, mithin also gut mit den Prinzipien einer diallelen Kreuzung übereinstimmen. Es erwies sich später, daß die Hähne x und y dieselbe Zahl von 42 Wirbeln hatten, daß sie also trotz des gleichen persönlichen Werte in bezug auf den generativen Wert stark differierten. Taube (Riga).

Landauer, Walter: Untersuchungen über die Verschiebung der Vererbungsrichtung bei Echinodermen-Bastardlarven unter dem Einfluß von Ammoniak. (Zoo. Inst., Univ. Heidelberg.) Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 52, H. 1/2. S. 1—94. 1922.

Dem Verf. handelte es sich darum, die Ursachen dafür aufzudecken, daß Nachkommen nicht stets in dem gleichen Maße beiden Eltern ähneln, sondern daß sie Verschiebungen in der Ähnlichkeit, selbst auch ganz einseitig, ergeben. Die hierfür verantwortlichen Faktoren können durch äußere Bedingungen des Milieus veranlaßt werden oder sie sind im Organismus selbst gelegen. Bezügliche Bastardierungsversuche unter Anwendung von NH_3 haben gezeigt, daß äußeren Ursachen gegenüber die inneren eine geringe Rolle zukommt. Im vorliegenden Falle wurde *Paracentrotus lividus* mit *Sphaerechinus* gekreuzt. Als Indicator für die gestellte Frage wurde das Kalkskelett der Bastardplutei herangezogen. Dabei zeigte sich, daß dieses bei Larve aus Eiern mit vergrößertem Kern eine starke Annäherung an das *Sphaerechinusskelett* aufwies. Plutei mit verschobener Vererbungsrichtung hatten auch vergrößerte Kerne. Ferner konnte der Verf. die Anschauung Boveris bestätigen, daß die Kernoberfläche der Chromatinmenge proportional ist. Die Kerngröße einer Zelle ist aber kein unmittelbarer Ausdruck ihres Chromatinbestandes. Für die Größengestaltung müssen auch noch andere Faktoren, wie Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe, Umfang der umgebenden Plasmamenge usw. verantwortlich sein. Diese und andere aus den Versuchen gewonnenen Tatsachen liefern den sicheren Beweis dafür, daß in Verbindung mit einer Vermehrung der Eikernmenge eine Verschiebung der Vererbungsrichtung erfolgt, bei der man aber immer noch den väterlichen Einfluß deutlich erkennen kann. Cor.

Pézar, A. et F. Caridroit: L'hérédité sex-linked chez les Gallinacés. Interprétation fondée sur l'existence de la forme neutre et sur les propriétés de l'hormone ovarienne. (Geschlechtsbegrenzte Vererbung bei Hühnern; erklärt aus dem Vorkommen von Neutra und aus den Eigenschaften des Ovarialhormons.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 20, S. 910—912. 1922.

Es wurden Kreuzungen ausgeführt zwischen den beiden reziproken Hühnerrassen Leghorn ♂ und Dorking ♀, und die beide einen starken sexuellen Dimorphismus aufweisen. In F. I zeigten die erwachsenen Hühner das Federkleid des Vaters. In F. II dagegen zeigten in beiden Fällen Mischcharaktere. Die geschlechtsbegrenzte Vererbung der Hühner erscheint dem Verf. physiologisch als eine direkte mütterliche Erblichkeit, die, nach Einführung des Hemmungsfaktors, beim Weibchen die entgegengesetzten Charaktere in Erscheinung treten läßt. Harms (Königsberg).

Sverdrup, Aslaug: Postaxial polydactylism in six generations of a Norwegian family. (Postaxiale Polydaktylie in sechs Generationen einer norwegischen Familie.) (Univ.-Inst. f. Arvelighetsforskning, Christiania.) Journ. of genetics Bd. 12, Nr. 1. S. 217—240. 1922.

Verf. beschreibt eine Familie, in der er Sechsfingrigkeit in ununterbrochener Reihe durch 6 Generationen verfolgen konnte. Von 23 Mitgliedern der Familie wurden Röntgenaufnahmen gemacht; 15 von diesen waren sechsfingrig; von 2 weiteren sechsfingrigen Mitgliedern konnten wenigstens photographische Aufnahmen gemacht werden. Die Anomalie trat in der Familie ziemlich variabel auf, in mehreren Fällen nur an einer Seite, meist an Händen und Füßen gleich. In einer Familie der Linie war die Anomalie besonders häufig und hier zugleich besonders ausgesprochen; an der linken Hand war der kleine Finger meist verdoppelt und be-

lie zu gleichmäßigen Fingern ausgebildet; rechts dagegen war die Spaltung des kleinen Fingers meist unregelmäßiger und der so entstandene überzählige Finger klein und krumm. In einer anderen Linie der Familie trat die Anomalie seltener auf und hier meist nur in Form eines Anhängsels ohne knöcherne Verbindung mit der sonstigen Hand. Individuen mit der ausgesprochenen Form der Anomalie hatten teilweise Kinder mit der weniger ausgesprochenen Form, während der umgekehrte Fall nicht vorkam. Das Zahlenverhältnis in 12 Geschwisterfamilien, deren einer Elter die Anomalie hatte, betrug 34 kranke zu 23 normalen. Auch in anderen Familien mit Polydaktylie, die Verf. anführt, wurde ein ähnliches Überwiegen der kranken Geschwister beobachtet. Das ist gewiß bemerkenswert; doch läßt sich ein solches Verhalten nicht gut durch Polymerie erklären, wie Verf. meint. Ref. möchte auch darauf hinweisen, daß in der beschriebenen Familie die Abweichung von dem theoretischen Verhältnis 1:1 merhin innerhalb des dreifachen Standardfehlers der kleinen Zahl liegt. Die wertvolle Arbeit durch einen Stammbaum und 5 Tafeln mit Röntgenaufnahmen illustriert. Lenz (München).

Remy, P.: Sur le rejet de sang par les argasidae. (Über die Blutabsonderung bei den Argasiden.) Arch. de zool. exp. et gén. Bd. 61, Nr. 1, S. 1—16. 1922.

Verf. führt den Nachweis, daß die von verschiedenen Zecken (Argas, Ornithodoros) gelegentlich ausgeschiedenen Flüssigkeitstropfen, genau wie bei vielen Insekten, aus Blut des Tieres selbst bestehen. In der abgeschiedenen Flüssigkeit sind stets Amöbocyten nachweisbar, die, wenn man von der Abscheidung eine Carmin suspension ins Schizocöl injiziert hat, die Carminkörnern beladen sind. Sie gibt auch dieselben chemischen Reaktionen wie das Blut, die in der Hauptsache das Vorhandensein von NaCl dartun. Das Gewicht der spontan abgeschiedenen Flüssigkeitstropfen verhält sich zum Körpergewicht der nüchternen Zecke und der aufgenommenen Blutmenge nach dem Saugakt wie 1,5 : 1 resp. 1 : 3. Die Austrittsstelle ist eine Querspalte an den Coxen des ersten Beinpaares; während des Austretens ist eine deutliche Kontraktion des Chitinpanzers feststellbar. Ausgelöst wird diese Blutausscheidung durch Erwärmung der Tiere auf 40°, ferner durch starke chemische, elektrische und mechanische Reize; spontan tritt sie stets nach dem Saugakt auf. Verf. interpretiert sie als Einrichtung zur Regulierung des durch die beim Saugen aufgenommene große Blutmenge stark erhöhten Binnendruckes der Zecke; dafür sprechen auch Versuche, bei denen die Ausscheidung durch künstliche Erhöhung des Binnendruckes (Injektion ins Schizocöl) sehr gefördert wird.

Karl Bělář (Berlin-Dahlem).

Geschwülste

Smith, Erwin F.: Appositional growth in crown-gall tumors and in cancers. (Appositionswachstum bei Pflanzengallen und Tiergeschwülsten.) Journ. of cancer research Bd. 7, H. 1, S. 1—105. 1922.

An der Hand von bis jetzt noch nicht beschriebenen Material unterzieht der Autor auch einmal die Ansichten älterer und neuerer Autoren über die Umwandlung von Virgsgewebe an den Grenzen von Tumorzellen in Tumorzellen einer erneuten Betrachtung. Mit einem einzigen Einstich war in junge Tabakspflanzen das Bacterium tumefaciens (Sm. und T.) eingeführt und schon nach drei Wochen wurden die entstandenen Geschwülste fixiert, geschnitten und noch einmal nach 15 Jahren wieder präpariert. Um den Tumor herum war eine Lage eigenartiger Zellen (0,5 mm), die morphologisch ein Aussehen hatten, das sowohl an die Tumorzellen selbst als auch an die Zellen der Rinde erinnerte. Oft waren auch unveränderte Rindenzellen von diesen veränderten eingeschlossen. — Nach nochmaliger Überprüfung älteren, von diesem verschiedenen Materials, glaubt Smith, daß ein Vordrängen der Wirtszellen ausgeschlossen ist und daß diese Pflanzentumoren das überzeugendste Beispiel von „Tumorzellwachstum durch Apposition“ sind. Eine Rindenzelle, die also in eine „Tumorzelle“ umgewandelt ist, erzeugt hunderte von neuen bösartig wuchernden Zellen und trägt so lange zum peripheren Wachstum der Geschwulst (Pflanzenzelle) bei, bis durch den eintretenden Platzmangel die neugebildeten Zellen gedrückt und zerdrückt werden. S. führt eine ganze Reihe von Namen ins Feld von Autoren, die bei tierischen echten Geschwülsten — also nicht durch Bakterien erzeugten — an ein Wachstum durch Apposition glauben. Waldeyer, Cohnheim, Virchow, Hauser, Krompecher, v. Hansemann, Petersen, Cornil, Fabre, Domergue, Menetrier und andere haben dahin zielende Beobachtungen niedergelegt, die aber nicht Anerkennung gefunden haben, da die Menschentumoren dem Experiment nicht zugänglich sind und weil durch die passive und aktive Wanderung von Tumorzellen die Deutung bei Säugetierkrebsen

erschwert ist. — Nachdem also in ausgedehntem Maße die einschlägige Literatur berichtet und oft wörtlich angeführt ist, und auch die abweichenden Meinungen theoretisch widerlegt sind, stützt sich S. besonders auf die Funde von Siegenbeek von Henkelom als Analoga, der einen multizentrischen Ursprung der Spontan-, Adenomata und Adenocarcinomata der Leber annimmt und ihr Wachstum durch Apposition behauptet. Er führt die Bestätigungen von Witwichtzy, v. Schmieden, Cloir, C. H. Travis, Wells, Weglin, Polak - Daniels, Oertel, Muir, S. Milne, Goldzieher und besonders Goldzieher und Bokay, F. Fischer und mancher anderen an. Er selbst findet, daß das Appositionswachstum bei Pflanzengallen die häufigste Wachstumsform ist, da die Pflanzenzellen nicht aktiver Wanderung fähig sind. In den ersten Stadien der Umwandlung der Rindenzellen in Tumorzellen ist durch ihr Größe werden angezeigt, dann folgen interstitiale Zellteilungen, bei denen Zellen in sehr dünnen Zellwänden gebildet werden; auch fehlen die Interzellularräume. Die Kernplasmarelation verschiebt sich zu Ungunsten des Plasmas, die Färbbarkeit des Plasmas wächst, bis die entstandenen Zellen den Tumorzellen vollkommen gleichen. Die Tumorzellen selbst zeichnen sich durch ihre strukturelle Undifferenziertheit, ihre Kleinheit und ihren Reichtum an Kernmasse aus. Auch die zackige Form der Kerne ist typisch, auch schwach färbbare Granulationen sind nur ihnen eigen. Ab Übergänge von der Rindenzelle zur Tumorzelle sind in den feinsten Abstufungen erkennlich. S. schließt mit Schmieders Worten über das Wachstum der Leberzellen, die auf die Pflanzenzellen vollkommen passen: „aus diesen Riesenzellen wächst unmittelbar eine Brut hervor, die keine Leber- (S. sagt Rinden-) Zellen mehr sind, sondern Zellen des Tumors“.

Rhoda Erdmann (Berlin-Wilmersdorf).

Waterman, N.: Physikalisch-chemische Untersuchungen über das Carcinom (Laborat. Antoni von Leeuwenhoeckhuis, Amsterdam.) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4 S. 535—597. 1922.

I. Verhalten des Kaliums und Calciums: Tumoranalysen von Beebes (1906) und Clowes (1903) ergaben bei schnellwachsenden, besonders malignen Geschwülsten einen hohen Kalium- und niedrigen Calciumgehalt. Zur näheren Prüfung dieser Verhältnisse bestimmte Verf. den Calciumionengehalt im Blutserum Tumorkranker. Die Calciumionenkonzentration wurde indirekt auf Grund der von Rona und Takahashi (1913) aufgestellten Formel $(Ca^{++} = K(350) \cdot \frac{H^+}{HCO_3^-})$ berechnet; es ergab sich eine Herabsetzung der Ca^{++} -Konzentration von ungefähr 10%. Die Alkalizität des Plasmas (bestimmt nach van Slyke) war um etwa 10% erhöht. Die $[H^+]$ im Urin Tumorkranker ergab Werte bis zu $p_H = 8,0$; die NH_3 -Ausscheidung war verringert. Die ausgedehnten theoretischen und methodologischen Erörterungen, die sich an diese und die folgenden Untersuchungen anschließen, können im Rahmen eines kurzen Referates nur gestreift werden. Sie müssen im Original nachgelesen werden. — II. Tumor und Permeabilitätsproblem: Bei der Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit von Zellen und lebenden Geweben treten Polarisationswiderstände auf. Verf. bestimmt diese Polarisationsgröße mittels variabler, reversibler Selbstinduktion. (Die Arbeit enthält eine detaillierte Beschreibung der angewendeten Methode.) Als Versuchsmaterial diente einerseits fertiges Tumorgewebe, andererseits in der Entwicklung begriffenes carcinomatöses Gewebe in verschiedenen Stadien des pathologischen Prozesses. Letzteres Material wurde gewonnen durch Teerpinselung von Tierhaut. Durch Vergleich des Polarisationswiderstandes mit dem reinen Ohmschen Widerstand ($\frac{P}{W}$ -Konstante), der auftritt bei der Durchströmung des Versuchsobjektes mit verschiedenen Elektrolytlösungen, kommt Verf. zu Ergebnissen, die er in den folgenden Sätzen zusammenfaßt: Satz 1: „Der bei normalen Gewebe, gegenüber physiologischer Flüssigkeit (Ringers Lösung), bestehende Polarisationswiderstand nähert sich bei Tumoren einem Minimum.“ Satz 2: „Bei normalen

geweben hat die Substitution von Ringerlösung durch isotonische Na- und KCl-Lösung einen bedeutenden Einfluß auf Verhältnis zwischen Widerstand und Polarisation ($\frac{P}{V}$ -Konstante), isotonische CaCl_2 -Lösung aber erniedrigt die Konstante; bei malignen Geweben aber und in der Entwicklung begriffenen Tumoren steigert CaCl_2 -Durchströmung den Polarisationswert bedeutend und bringt diesen bisweilen auf das normale Niveau.“ Bedingt werden diese Erscheinungen durch Unterschiede in der Eindringmöglichkeit der Ionen in die Zellen. Bei der normalen Zelle dringen bei der Durchströmung mit den Kationen Na^+ und K^+ dieselben leichter ein als die Anionen — starke Polarisation. Die Durchströmung mit Ca -Ionen festigt bekanntlich die Grenzflächenkolloide, verringert ihre Dispersität und behindert daher das Eindringen der Na^+ , K^+ und Ca^{++} -Ionen — Abnahme der Polarisation. Bei Tumorzellen ist das verschiedenartige Verhalten der Zellmembranen den einzelnen Ionenarten gegenüber, infolge von Veränderungen der Grenzflächenkolloide, geschwunden. Anionen und Kationen ringen gleichmäßig leicht ein — Widerstand und Polarisation nehmen ab. Wird bei der Tumorzelle mit Ca^{++} durchströmt, so werden durch die Änderung der Dispersität die normalen Verhältnisse wiederhergestellt. Nur die beweglichsten Ionen (Na^+ , K^+) der auch die, die größte Affinität zur Wasserphase der Kolloide haben, können eindringen. Die gewöhnliche Polarisation tritt wieder auf. — Zur Erklärung dieser Erscheinungen werden die Auffassungen H. G. Clowes über den Aufbau der Zellmembranen herangezogen. Clowes nimmt in der Grenzschicht zwei gesonderte Phasen an; eine wässrige (eiweißhaltige) und eine fettartige (seifenartige), die von ersterer umschlossen wird. Die Fettstoffe der Zellwand bestehen aus Phosphatiden und Sterinen in einem bestimmten Verhältnis zueinander (Brinkman). Durch Ca^{++} -Ionen und durch Teerpinselung kommt es zu einer Änderung des Dispersitätsgrades des kolloidalen Systems und zu einer Störung des Verhältnisses zwischen Phosphatiden und Sterinen und dadurch zu einer Änderung der Ionenpermeabilität. — III. Mikrochemische Untersuchungen: Hautschnitte wurden nach den mikrochemischen Methoden Macallums auf Calcium und Kalium untersucht. Die Ergebnisse werden an Hand von Mikrophotogrammen demonstriert. Unter normalen Verhältnissen bindet das Bindegewebe Calcium in großen Mengen und nur Spuren von Kalium; das Epithel hingegen nur K und Spuren Ca . Wird die Haut systematischen langdauernden Teerpinselungen ausgesetzt, so ändern sich diese Verhältnisse. Im Anfangsstadium treten Kaliumniederschläge auch im Bindegewebe auf, während Calcium auch im Epithel in größeren Mengen auftritt. Vor allem verwischen sich die im Normalbilde so deutlichen Unterschiede in der Verteilung der Elemente: es kommt zu einer „Entdifferenzierung“. Beim weiteren Fortschreiten des carcinomatösen Prozesses wird der deutliche Unterschied zwischen Epithel und Bindegewebe noch mehr verwischt. Die Calciumverteilung im Bindegewebe nimmt weiter ab, die Calciumeinlagerung im wuchernden Epithel nimmt zu. Das in die Tiefe dringende Epithel behält seine große Kaliumaffinität bei. Eine eindeutige Erklärung dieser Befunde kann noch nicht gegeben werden (außerdem muß erwogen werden, ob durch die chemischen Reaktionen etwa Verschiebungen des Calciums infolge von Diffusionen zustande kommen). Wahrscheinlich beruht die Calciumverarmung des Bindegewebes auf einer Verhinderung der Calciumbindung an das Substrat durch auftretende Stoffwechselprodukte. Die Calciumeinlagerung im Epithel ist vielleicht zurückzuführen auf Steigerung der Permeabilität der Zellgrenzschichten als Folge der im vorigen Kapitel beschriebenen Änderungen der Grenz-kolloide. (Vgl. diese Berichte 16, 447.)

L. Farmer Loeb (Berlin).

Sokoloff, Boris: Mitochondries de la cellule maligne. (Mitochondrien der Geschwulstzelle.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 37, S. 1202 bis 1204. 1922.

Sokoloff findet einen Unterschied der Form und Masse von Mitochondrien der Krebszelle. Es dienten zu diesen Untersuchungen 22 menschliche Epitheliomata und

8 Tumoren der weißen Maus. Allgemein kann gesagt werden, daß in jungen, also sich eben geteilt habenden Zellen, nur wenige fadenförmige oder stäbchenförmige Mitochondrien sich finden, in älteren oder „Depressionszellen“, in denen das Verhältnis von Kern und Plasma sich zugunsten des Plasmas verschoben hat, werden viele grobe, stark färbbare Körner gebildet. Der Verf. betrachtet den Mitochondrienbestand einer Zelle als einen Index ihres Alters oder ihrer Vitalität. Viele grobe Mitochondrien zeigen also dem Untergang geweihte Zellen an, sie sind keine typischen Mitochondrien mehr.

Rhoda Erdmann (Berlin-Wilmersdorf).

Bierich, R.: Über den experimentellen Teerkrebs. Ein Versuch, die Art und Wirkungsweise der krebsbildenden Faktoren zu bestimmen. Klin. Wochenschr Jg. 1, Nr. 46, S. 2272—2274. 1922.

Die Teerkrebsbildung erfolgt als Reaktion des normalen Zellprotoplasmas auf zell- oder gewebsfremde Stoffe des Teers, die in der direkten Umgebung der betreffenden Zellen angereichert werden. Die Reaktionsbedingungen dieser Krebsbildung sind also gegeben einerseits in den physikalischen und chemischen Eigenschaften des wirksamen Teerbestandteils und andererseits in den gleichen Eigenschaften des Protoplasmas bestimmter Zellen. An der Krebsbildung ist gleichzeitig mit dem Epithel das angrenzende Bindegewebe beteiligt, mit dessen spezifischer physikalischer Zustandsänderung das Tiefenwachstum des Epithels gehemmt wird. Erst wenn diese Bindegewebsänderung, die sich histologisch vor allem in einer Quellung seiner Fasern und Zunahme ihrer Elastinfärbbarkeit nachweisen läßt, vom vordringenden Krebs zerstört wird, beginnt das pathologische Tiefenwachstum. Die formale Bindegewebsänderung läßt sich ebenso wie durch Teer auch durch subcutane Arsenzufuhr erzielen. Wenn man sie dann zuerst durch Arsen hervorruft und danach die übliche Teerkrebsbildung erzielt, wird in solchen Fällen das Auftreten des Carcinoms zeitlich um nahezu 50% verzögert. Mit einer Steigerung der erwähnten Zustandsänderung des Bindegewebes ist also offenbar seine Widerstandszunahme gegen das Tiefenwachstum des Epithels verbunden. Die neuen Eigenschaften, die im Epithel und im Bindegewebe unter der Teerwirkung auftreten, sind also eine direkte Funktion der dabei abgeänderten physikalisch-chemischen Struktur beider protoplasmatischer Systeme. *Bierich (Hamburg).*

Bell, W. Blair: The influence of saturnine compounds on cell-growth, with special reference to the treatment of malignant neoplasms. A preliminary communication. (Einfluß von Bleiverbindungen auf das Zellwachstum mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung bösartiger Geschwülste. Vorläufige Mitteilung.) Lancet Bd. 203, Nr. 20, S. 1005—1009. 1922.

Auf Grund theoretischer Erwägungen — Blei verbindet sich wahrscheinlich chemisch mit Lecithin; der Lecithingehalt maligner Neoplasmen steht in direktem Verhältnis zu ihrem Wachstumstendenz — wendet Bell bei Tumoren intravenöse Injektionen von kolloidalem Blei (Art des Mittels, Menge nicht angegeben) zu therapeutischen Zwecken an und will Wachstumsstillstand und in einigen Fällen Heilung gesehen haben, empfiehlt aber auch Operation und Bestrahlung; gerade letztere soll durch die Bleispeicherung im Tumor infolge der Sekundärstrahlung besonders wirksam sein. — Der längstbeobachtete Fall liegt erst etwas über 2 Jahre zurück.

Groll (München).

Allgemeine Muskel- und Nervenphysiologie.

Bayliss, W. M.: The excitatory state. (Der Erregungszustand.) Bull. of the Johns Hopkins hosp. Bd. 33, Nr. 380, S. 347—350. 1922.

Besprechung aller bekannten Begleiterscheinungen bei erregten Gebilden.

E. v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Mangold, Ernst: Die Totenstarre. Naturwissenschaften Jg. 10, H. 41, S. 8 bis 899. 1922.

Zusammenfassende Besprechung der zahlreichen diesem Gegenstand gewidmeten Abhandlungen des Verf. und seiner Mitarbeiter mit interessanten Ausblicken für klinische und pathologisch-anatomische Forschung.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Mangold, Ernst: Über physiologische Härtemessung. (*Physiol. Inst., Univ. Freiburg i. Br.*) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 185 s. 189. 1922.

Verf. bedient sich zur Härtebestimmung der Gewebe unter verschiedenen Bedingungen eines eigenen Verfahrens, bei dem der Eindruck einer auswechselbaren Pelotte unter wechselnder Belastung durch Hebelvergrößerung mit großer Genauigkeit bestimmt wird. Als Maßstab für die Härte dient hier die Eindrückbarkeit. Die Apparat ist wegen ihrer großen Handlichkeit für physiologische und klinische Zwecke im weitesten Maße zu gebrauchen.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Mangold, Ernst: Untersuchungen über Muskelhärte. I. Mitt. Eine allgemein verwendbare Methode zur physiologischen Härtebestimmung. (*Physiol. Inst., Freiburg i. Br.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 196, H. 2, S. 200—214. 1922.

Die in dieser Abhandlung beschriebene Methode kann als Gewichtssklerometrie bezeichnet werden. Den Hauptbestandteil der Apparatur bildet ein um eine wagerechte Achse drehbarer zeismiger Hebel, der auf der einen Seite eine auswechselbare Pelotte trägt, die dem Organ aufgesetzt wird, dessen Härte bestimmt werden soll. In deren Nähe befindet sich noch ein kurzes, verschiebliches Röhrchen mit Haken, so daß der Hebel in jeder beliebigen Entfernung von der Achse nacheinander mit verschiedenen angehängten Gewichten belastet werden kann. Mit Hilfe dieser Vorrichtung wird als Maßstab für die Härte die Eindrückbarkeit der Organe gleichmäßig bestimmt. Die elastische Nachwirkung spielt bei dieser Methode eine Rolle, und zwar sowohl beim Einsinken der Pelotte auf der Muskeleoberfläche nach dem Anhängen der Lastbelastung, wie auch bei dem Ausgleich der Deformation des Muskels nach dem Abnehmen des Gewichts. Bei hoher Spannung des Muskels kommt beides kaum in Betracht, da hier die Pelotte sofort auf einen definitiven Wert sinkt und sich der Hebel nach Abnehmen des Gewichts alsbald auf die Nullstellung zurückerhebt. Bei geringer Muskelspannung dagegen folgt einem ersten schnellen ein weiteres langsames Einsinken der Pelotte. Hier erweist sich zweckmäßig die Ablesung in dem Augenblicke vorzunehmen, wo das erste rasche Einsinken der Pelotte zu Ende ist. Es bildet also die elastische Nachwirkung für die brauchbare Anwendung des Verfahrens kein Hindernis. Das Verfahren läßt sich am isolierten Muskel ebenso anwenden wie auch bei dem in situ belassenen. Von Bedeutung ist, daß es sich auch beim Menschen für die Messung der Muskelhärte und ihre Vergleichung in verschiedenen Zuständen als sehr brauchbar erwiesen hat. Die Methode besitzt eine allgemeine Verwendbarkeit zur Härtemessung für physiologische, pathologische und klinische Zwecke.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Mangold, Ernst: Untersuchungen über Muskelhärte. II. Mitt. Die Härtemessung in Totenstarre und Wärmestarre. (*Physiol. Inst., Freiburg i. Br.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 196, H. 2, S. 215—228. 1922.

Mit der von ihm angegebenen sklerometrischen Methode, bei der als Maßstab für die Härte des Muskels die Eindrückbarkeit gemessen wird, hat Verf. an Kaninchenmuskeln (*Triceps surae*) nunmehr die durch Totenstarre und Wärmestarre bedingte Härtezunahme quantitativ verfolgt. Bei der Totenstarre beginnt die Härtezunahme erst 3 Stunden nach dem Tode und befindet sich nach 24 Stunden auf dem Höhepunkt. Im Gegensatz zur Verkürzung, die am isolierten Muskel zur Zeit der erwarteten Totenstarre manchmal ausbleibt, scheint die postmortale Härtezunahme regelmäßig aufzutreten. Verkürzung und Härtung sind auch bei der Wärmestarre weitgehend voneinander unabhängig. Am *Triceps surae* des Kaninchens läßt sich bei der Wärmestarre eine bei 52° C beginnende und bei 58° C vollendete Verkürzungsstufe und eine bei 62° C beginnende und bei 68° C zum Stillstand gelangende Verkürzungsstufe unterscheiden, die als erste und zweite Wärmestarre benannt werden. Die Verkürzung findet in der ersten Wärmestarre um 13—20%, in der zweiten Wärmestarre um 42% der Anfangslänge statt; der in der ersten Wärmestarre noch kaum getriebene, frisch aussehende Muskel wird in der zweiten Wärmestarre vollkommen weißlich getriebe, wie gekocht. Im Gegensatz zur Verkürzung und dem Aussehen ändert sich der in der ersten Wärmestarre erreichte Härtegrad durch die zweite Wärmestarre nicht mehr. Dies spricht für eine Verschiedenartigkeit der Muskelveränderung, die der ersten und zweiten Wärmestarre zugrunde liegt, oder für die Beteiligung verschiedener Gewebelemente. Der Zeitpunkt nach dem Tode ist für den Grad der durch die Wärmestarre bedingten

Härtezunahme im Vergleich zum Anfangswerte am frischen Muskel gleichgültig nicht aber im Vergleich zu dem gegebenenfalls vorher durch spontane Totenstarre hervorgerufenen Härtezustand. Der einmal wärmestarre Muskel verändert sein Härte tagelang nicht mehr. Es bestätigt sich also auch für die Härtezunahme, daß der wärmestarre Muskel nicht mehr totenstarr werden kann. Umgekehrt kann aber, hinsichtlich der Härtezunahme, im Gegensatz zur Verkürzung, auch ein totenstarrer Muskel nicht mehr in Wärmestarre versetzt werden, da die maximale Härtezunahme des Muskels durch die Totenstarre in Prozenten der am frischen Muskel gemessenen Sklerometerwerte ebenso groß ist wie diejenige durch die erste oder zweite Wärmestarre; sie beträgt im Gesamtdurchschnitt der Versuche am *Triceps surae* des Kaninchens nahezu 70%. Nur während des unvollendeten Anstieges der Totenstarre wird der Härtegrad durch die Wärmestarre noch auf jenen Wert erhöht. *Emil v. Skramlik.*

Lange, Hermann und B. W. Müller: Untersuchungen über Narkose. 1. Mit Über die Einwirkung der Narkotica auf den Permeabilitätszustand von Muskelfasergrenzschichten. (*Inst. f. vegetat. Physiol., Univ. Frankfurt a. M.*) *Hopp Seylers Zeitschr. f. physiol. Chem.* Bd. 124, H. 1/2, S. 103—122. 1922.

Quantitativ-nephelometrische Untersuchungen über die Phosphorsäureausscheidung isolierter, in Ringerlösung suspendierter Gastrocnemien von Fröschen unter der Wirkung von Narkotica. Die Phosphorsäureausscheidung dient, entsprechend den Vorstellungen Emdens, als Maß der Permeabilität der Muskelfasergrenzschichten. Als Narkotica wurden verwandt Heptylalkohol, Amylalkohol und Urethan. Die Ergebnisse zeigen, daß je nach Konzentration des Narkoticums und Dauer seiner Einwirkung die Permeabilitätsverhältnisse sich verschieden gestalten. Stark wirkende Konzentrationen setzen zuerst die Phosphorsäureausscheidung, also die Permeabilität herab, steigern sie aber bei längerer Einwirkung auch dann, wenn die Narkose wieder vollständig rückgängig zu machen ist. Niedere, eben noch narkotisch wirksame Konzentrationen machen dagegen auch bei lang anhaltender Wirkung nur Herabsetzung der Phosphorsäureausscheidung, der Permeabilität. Die Tatsache, daß völlige Narkose eines Muskels sowohl mit gesteigerter wie mit herabgesetzter Permeabilität einhergehen kann, beweist, daß weder Steigerung noch Herabsetzung der Durchlässigkeit für die Zustandekommen der Narkose bedingend sind. *Riesser (Greifswald).*

Cords, Elisabeth: Über „funktionslose“ Muskeln. (*Anat. Inst., Königsberg i. Pr.*) *Zeitschr. f. d. ges. Anat., I. Abt., Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch.* Bd. 65, H. 1/3, S. 254—276. 1922.

Unter vielen sogenannten funktionslosen Muskeln erwähnt Cords auch die unser Gebiet fallenden Muskeln des Schapparates. Der *M. levator bulbi* des Frosches hat Fasern, die vom *Os frontoparietale* entspringen und am *Proc. zygomaticus os tympanici* sowie an der *Crista parotica* des *Prooticums* inserieren. Sie sind so zwischen 2 unbeweglichen Skelettstücken ausgespannt. Doch wird wohl ein Heben des Bulbus durch ihre Kontraktion angenommen werden können. Ebenso wird auf die gewaltigen Augenmuskeln der Wale hingewiesen, die keine Bewegungen des Bulbus zustande bringen und nach Pütter allein für die Wärmeproduktion in Betracht kommen. Die Anschauung schließt sich C. nicht an, da es noch genug andere Muskeln gibt, die, ohne eine Funktion auszuüben, sich weiter erhalten. Nach der Meinung der Autoren werden von C. werden die funktionslosen Muskeln erhalten, weil sie noch Nervenreize bekommen; dazu läge der Gedanke nahe, daß nur solche Muskeln oder Muskelteile erhalten bleiben, die ihr Träger einzeln nicht zu kontrahieren imstande ist, oder mit anderen Worten es gehen unter normalen Verhältnissen — bei aufgehobener Funktionsmöglichkeit — diejenigen Muskeln zugrunde, die ihr Besitzer gesondert zu innervieren gelernt und sich zur Gewohnheit gemacht hatte. *E. Kallius.*

Valenti, Adriano: L'azione dell'acqua minerale solfurea sui muscoli lisci. (Die Wirkung schwefelhaltiger Mineralwässer auf glatte Muskeln.) (*Istit. di farm.*)

ateria med., univ., Parma.) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, 496—501. 1922.

Wenn zu je 60 ccm physiologischer NaCl-Lösung, in der ein Muskelring des Froschens oder ein Meerschweinchenuterus suspendiert sind, 10 ccm eines H₂S-haltigen Mineralwassers, wie sie in der Provinz Parma vorkommen, zugefügt werden, so ergeben sich charakteristische Veränderungen der spontanen Bewegungen. Die Peristaltik des Froschmagens wird stark angeregt unter gleichzeitiger Tonussteigerung. Der Uterus gerät zunächst in starke Contractur, während derer die spontanen Bewegungen aufhören; die Contractur läßt dann allmählich nach und die Bewegungen kehren gleichzeitig wieder. Verf. glaubt, daß sich aus diesen Untersuchungen neue Gesichtspunkte für das Verständnis der physiologischen bzw. therapeutischen Wirkungen der Mineralwässer gewinnen lassen.

Riesser (Greifswald).

Pflanzenphysiologie. Agrikulturchemie.

Correns, C.: Alkohol und Zahlenverhältnis der Geschlechter bei einer getrenntgeschlechtigen Pflanze (Melandrium). *Naturwissenschaften Jg. 10, H. 49, S. 1049 bis 1052. 1922.*

Durch Alkoholisierung der ♂ gelang es A. Bluhm, bei weißen Mäusen das Geschlechtsverhältnis zugunsten der ♂ zu verschieben (vgl. diese Berichte 9, 359—360). Verf. versuchte Ähnliches bei einer Pflanze, Melandrium. Da bereits der Nachweis gebracht ist, daß die weiblichen und männlichen Geschlechtszellen von Melandrium ein verschiedenes physiologisches Verhalten zeigen können (Alternlassen des Blütenaubes bedingt eine Zunahme der männlichen Nachkommen), erschien die Lichtnelke als besonders günstiges Objekt für diese Versuche. Die reifen, frisch aufgesprungenen Staubbeutel wurden in Exsikkatoren über 94proz. Alkohol gebracht und verschieden lange (30—120 Minuten) den Alkoholdämpfen ausgesetzt. Dann wurden sie gleich in Bestäubungen verwendet. Auffallende Unterschiede in der Keimung oder im Aussehen der Nachkommen aus alkoholisiertem Pollen und aus normalem Pollen waren nicht vorhanden, hingegen war das Geschlechtsverhältnis bei den Alkoholkulturen deutlich zugunsten der ♂ verschoben. Die Differenz im Geschlechtsverhältnis beträgt 5,92% (mittlerer Fehler $\pm 1,72$, also nicht einmal der 9. Teil). Bei längerer Wirkung der Alkoholdämpfe (40, 60, 80 Minuten) nimmt die Zahl der befruchteten Samenanlagen ab. Wahrscheinlich sind die männchen- und weibchenbestimmenden Pollenkörner verschieden stark resistent gegen die schädigende Wirkung des Alkoholdampfes. Die Weibchenbestimmer sterben rascher ab als die Männchenbestimmer. Das Resultat stellt eine völlige Parallele zu der Wirkung des Alternlassens der Pollenkörner dar.

Nachtsheim (Berlin).

Sando, Charles E. and H. H. Bartlett: Pigments of the mendelian color types in maize: Isoquercitrin from brownhusked maize. (Pigmente der mendelierenden Farbstofftypen von Mais: Isoquercitrin aus dem braunschaligen Mais.) (*Physiol. a. ferment. invest., bureau of plant indust., U. St. dep. of agricult., Washington a. dep. of botan., univ. of Michigan, Ann Arbor.*) *Journ. of biolog. chem. Bd. 54, Nr. 3, S. 629 bis 645. 1922.*

In einer früheren Arbeit hat Verf. bereits darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die in Blüten, Samen- und Fruchtschalen vorkommenden Farbstoffe, deren genetische Faktorenanalyse bereits durchgeführt ist, einer genauen chemischen Untersuchung zu unterziehen. Nur auf diese Weise kann man hoffen, ein besseres Verständnis für die wahre Natur der Faktoren, die in der Vererbungslehre durch Symbole bezeichnet werden, zu gewinnen. Die genannten Pflanzenpigmente, die in ihrer Farbe von Weiß über Gelb, bis Rot und Purpur variieren können, sind alle chemisch mehr oder weniger verwandt, indem sie sich von der Gruppe der Flavone und Flavonole ableiten lassen. Letztere sind gelbe Farbstoffe, die durch Hydrieren in die farblose Pseudobase übergeführt werden. Verbindet man diese mit einer Säure und spaltet ein Molekül Wasser

ab, so erhält man die rot gefärbten Anthocyanidine. In den Pflanzen kommen nicht die genannten aglukonen Verbindungen vor, sondern Glykosidderivate derselben, wie z. B. die weit verbreiteten roten Anthocyanine. Durch Einwirkung von heißem Wasser können die roten Farbstoffe wieder in die Pseudobase zurückgeführt werden, was vielleicht die Erscheinung erklärt, daß *Primula sinensis* var. *rubra* bei 30—35° weiße Blüten bildet, bei 15—20° dagegen rote. Wir ersen daraus, daß eine ganz geringfügige chemische Veränderung schon einen auffälligen Farbumschlag hervorrufen kann, und gerade diese Farbänderungen spielen in der Vererbungsforschung eine große Rolle. Sowohl Flavonole wie auch Anthocyanidine haben mehrere Hydroxylgruppen die mit Zucker (Rhamnose, Galaktose und Glucose) Glykosidverbindungen eingehen können, was eine große Zahl von isomeren Farbstoffen ermöglicht. Wenn nun bei einer Pflanzenspezies einmal ein gelber und das andere Mal ein roter Farbstoff auftritt so liegt die Annahme nahe, daß der eine aus dem anderen auf die einfachste Art und Weise entstanden ist, es muß sich also das dem roten Farbstoffe entsprechende Anthocyanidin direkt vom gelben entsprechenden Flavonol ableiten lassen und gleich zeitig auch die Zucker der Glykosidverbindungen und ihre Stellung im Molekül die gleiche sein. Diese Verhältnisse zu untersuchen stellt sich Verf. zur Aufgabe. Er benutzt dazu das von Emerson genetisch genau analysierte Maismaterial. Wir haben bei derselben zwei grüne Linien mit dem Faktor B einerseits und dem Faktor P andererseits. Für sich allein genommen ergeben B und P keinen Farbstoff, gekreuzt dagegen erhält man eine braunschalige Maissorte. Ein dritter Faktor A gibt mit P allein einen sonnenroten Farbstoff, mit P Hellpurpur und mit B und P zusammen Purpur. A ist also ein Faktor, der die Bildung eines Anthocyanins, dessen Konstitution durch die Anwesenheit der anderen Faktoren bedingt wird, hervorruft. In vorliegender Arbeit hat Verf. für den Anfang den braunen Farbstoff isoliert und identifiziert. Es ist ein Glykosid mit einem Schmelzpunkt bei 200—222,5°. Es werden weiterhin auch die anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften desselben beschrieben und das Adsorptionsspektrum angeführt. Das gewonnene Glykosid scheint mit demjenigen von Heyl aus den Pollenkörnern der *Ambrosia artemisiaefolia* und dem durch Perkin aus den Blüten von *Gossypium* erhaltenen Isoquercitrin identisch zu sein. Nach Hydrolyse geben alle Quercetin und Glucose nach der Formel $C_{21}H_{22}O_{12} + H_2 = C_{15}H_{10}O_7 + C_6H_{12}O_6$. (Vgl. diese Berichte 2, 208). H. Walter (Heidelberg.)

Stiles, Walter: The suction pressure of the plant cell. An note on nomenclature. (Der Saugdruck von Pflanzenzellen. Eine Bemerkung zur Nomenklatur.) (*Dep. of botany, univ. coll., Reading.*) *Biochem. journ.* Bd. 16, N. 6, S. 727—728. 1922.

Die Saugkraft einer Pflanzenzelle ist nach Ursprung und Blum $S = P - T$, wo P der osmotische Druck des Zellsaftes, T der nach innen gerichtete Wanddruck ist. Im Wasser ist $P = T$ und die Saugkraft demnach gleich Null. Verf. nimmt daran Anstoß, daß wir in solch einer Gleichung links eine Kraft, rechts dagegen Druckgrößen hätten. Er schlägt deshalb vor, den Ausdruck „Saugkraft“ durch „Saugdruck“ zu ersetzen, da ihm ein anderer von Thoday vorgeschlagener Ausdruck „Wasserabsorptionsvermögen“ ebenfalls nicht zweckmäßig zu sein scheint. H. Walter (Heidelberg)

Campbell, Douglas H.: The gametophyte and embryo of *Botrychium simplex* Hitchcock. (Der Gametophyt und Embryo von *Botrychium simplex* Hitchcock) *Ann. of botany* Bd. 36, Nr. 144, S. 441—456. 1922.

Verf. beschreibt eingehend die Entwicklung des Gametophyten und des Embryos von *Botrychium simplex* Hitchcock. Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Wurmser, René et Raymond Jaquot: Sur la relation entre l'état colloïdal et les fonctions physiologiques du protoplasme. (Über die Beziehungen zwischen den kolloidalen Zustände und den physiologischen Funktionen des Protoplasmas.) *C. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences* Bd. 175, Nr. 18, S. 782—784. 1922.

Die Atmung und die Assimilation — die beiden Hauptfunktionen der Pflanze

üssen in hohem Grade vom kolloidalen Zustande des Protoplasmas abhängen. Letzter wiederum wird durch die Temperatur stark beeinflusst. Hält man Algen 2 Minuten Wasser bei 35—45°, so läßt sich mikroskopisch noch nicht die geringste Schädigung abnehmen. Trotzdem fanden Verff., daß in normal temperiertes Wasser zurückbracht die Menge des am Licht durch die Algen ausgeschiedenen Sauerstoffes um so ehr abnahm, je höher die vorher einwirkende Temperatur war. Bei vielen Meeresgen konnte sogar eine starke Sauerstoffabsorption eintreten. Daraus schlossen Verff., daß die Assimilation sehr viel stärker herabgesetzt wird als die Atmung. Im untern ausgeführte Versuche bestätigten diese Annahme. Die Atmung nimmt mit eigener Temperatur nur sehr langsam ab. Bei Rhodymenia und Laminaria konnte gar von einer bestimmten Temperatur an ein Anstieg über die normale Atmung hinaus beobachtet werden.

H. Walter (Heidelberg).

Funke, G.-L.: Sur les pousses supplémentaires estivales. (Über die sommerhen Ergänzungstriebe.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 20, S. 901—904. 1922.

Verf. untersucht die vielen Bäumen und Sträuchern eigentümliche Erscheinung, daß im Laufe des Sommers ein Austreiben der für die nächste Vegetationsperiode anliegenden Knospen zustande kommt, jene Erscheinung, die so auffällig ist, daß sie uns mit dem volkstümlichen Namen „Johannistrieb“, in Frankreich mit dem Namen „Augusttrieb“ belegt wird. Ohne die gründlichen deutschen Arbeiten zur gleichen Frage zu erwähnen, gibt er eine Einteilung der „Augusttriebe“ in drei Gruppen, solche, die aus Knospen des gleichen Jahres, in solche, die aus Knospen eines früheren Jahres und in solche, die durch Wiederaufnahme des früheren Wachstums nach einer Ruhepause entstehen. Er bespricht die Bildung dieser Triebe bei einigen Laubbäumen und untersucht auch den Einfluß auf die Holzstruktur. Es läßt sich zeigen, daß die Erzeugung von „Augusttrieben“ nicht notwendig zu Irrtümern bei Altersbestimmungen durch die Jahresringe führen muß. Meistens weicht die Holzstruktur bei „Augusttrieben“ nicht von der normalen ab. Nur bei einigen Bäumen kommt es zur Bildung solcher Jahresgrenzen, die den echten ähnlich sind. W. Lamprecht (Friedenau).

Priestley, J. H. and W. H. Pearsall: Growth studies. III. A „volumometer“ method of measuring the growth of roots. (Eine Volumometermethode zur Messung des Wachstums der Wurzeln.) Ann. of botany Bd. 36, Nr. 144, S. 485—488. 1922.

Während Wachstumsmessungen bei lebenden Tieren sich leicht durchführen lassen, sind es bei Pflanzen äußerst schwierig anzustellen. Für das Längenwachstum unverzweigter Pflanzenteile benutzt man das Auxanometer. Es ergibt keine genauen Resultate mehr, sobald die Wurzeln z. B. verzweigt sind. Die Verff. haben nun einen sinnreichen Apparat zur Volumenmessung konstruiert. Die Wurzeln des Keimlings, der in fester Lage erhalten wird, befinden sich in einem mit Nährlösung erfüllten Behälter. Die Lösung kann ständig erneuert werden, in Wasserbad sorgt für gleichmäßige Temperatur. Die Wurzeln wachsen im Dunkeln; die Pflanze ist dem Lichte ausgesetzt. Die Füllung des Gefäßes geschieht zunächst aus größeren, reinen Rauminhalt nach bekannten Behältern; die genaue Bestimmung erfolgt durch Nachfüllung aus einem engen Steigrohr, an dem Hundertstelkubikzentimeter abgelesen werden können. Die Unterschiede zwischen den Ablesungen bei zwei Füllungen ergeben den Zuwachs in Kubikzentimetern ausgedrückt. Eine Zeichnung erläutert den Bau des Apparates. (I. u. II. vgl. diese Berichte 14, 215.) W. Lamprecht (Friedenau).

Thoday, D.: On the organization of growth and differentiation in the stem of the sunflower. (Über Wachstum und Differenzierung im Stengel der Sonnenblume.) Ann. of botany Bd. 36, Nr. 144, S. 489—510. 1922.

Der Verf. untersucht das primäre und sekundäre Wachstum und die Differenzierung des Stengels von Helianthus annua, indem er Größe und Bau von entsprechenden Stellen bei Pflanzen verschiedener Größe und verschiedenen Alters vergleicht. Bei der primären Differenzierung des Blattspurstranges läßt sich schon frühzeitig in Procambium unterscheiden; sein Hauptteil wird zum Phloëm, sein Rand bildet das Cambium, aus dem das Xylem hervorgeht. Neue Gefäßbündel schieben sich zwischen die Lücken der ersten. Ihr Wachstum steht in Korrelation zu dem der

Blattgefäßbündel. Das sekundäre Dickenwachstum ist vor allen Dingen veranlaßt durch die lebhafte tangentielle und radiale Ausdehnung des Cambiums. Infolge starken Tangentialwachstums der Cambialzone breitet sich auch das Mark sehr stark aus und entwickelt einen Hohlraum. Dabei ist das Cambium im oberen Teile der Gefäßbündel oft noch inaktiv, während es im unteren Teile schon allmählich zu aktiven Wachstum gelangt. Nach dem Grunde zu befindet sich der Stengel also auf einem späteren ontogenetischen Stadium, in welchem das fasciculare Cambium Holz bildet. Zeichnungen und Mikrophotographien erläutern die Ergebnisse. *W. Lamprecht.*

Lenoir, Maurice: La cinèse somatique dans la tige aérienne d'Equisetum arvense L. (Die somatische Kinese im oberirdischen Stengel von *Equisetum arvense* L.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 174, Nr. 24, S. 1559-1562. 1922.

Aus den im Anschluß an die Berichte von Bargagli-Petrucci und Beer gemachten Untersuchungen des Verf. über die Kernteilung im *Equisetum* stengel deren Phasen eingehend beschrieben werden, scheint hervorzugehen, daß die Grundsubstanz des Chromosoms das Nucleolin (das Pyrenin oder Platin der Autoren) ist; das Chromatin entsteht erst aus dieser Substanz. *W. Herter* (Berlin-Steglitz).

Sinnott, E. W. and I. W. Bailey: The significance of the „foliar ray“ in the evolution of herbaceous angiosperms. (Die Bedeutung des „Blattstrahls“ in der Entwicklung krautiger Angiospermen.) Ann. of botany Bd. 36, Nr. 144, S. 523 bis 534. 1922.

Die in zwei neueren Arbeiten von Jeffrey und Torrey (1921) erhobenen Einwände gegen die Auffassung der Verff. über die Entwicklung der Stengel krautiger Angiospermen werden zurückgewiesen (vgl. diese Berichte 7, 39; 8, 130). *Dörries* (Berlin-Zehlendorf).

Vuillemin, Paul: Valeur morphologique des émergences antitropes. Mécanisme de leur production par déplacement des monastiques. (Morphologischer Wert der antitropischen Emergenzen. Mechanismus ihrer Erzeugung durch desmonastische Verlagerung.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 2, S. 849-852. 1922.

Der Verf. untersucht die Emergenzen, die denselben Bau haben wie die Glieder zu denen sie gehören, aber eine inverse Orientierung. Sie entstehen im Laufe der Entwicklung durch Verlagerung von Teilen dieser früher gebildeten Glieder, sind also keine Neubildungen. Darum haben sie auch den morphologischen Wert der Glieder, denen sie entstammen. Die Verlagerungen werden hervorgebracht durch einen Tropismus, dessen innere Ursache in dem Widerstand der Gefäßbündel und der dadurch bedingten ungleichen Wachstumsgeschwindigkeit der Gewebe zu suchen ist, ein Tropismus, den Verf. als Desmonastie bezeichnet. *W. Lamprecht* (Friedenau).

Sonèges, René: Embryogénie des Caryophyllacées. Les derniers stades de développement de l'embryon chez le *Sagina procumbens* L. (Embryogenie der Caryophyllaceen. Die letzten Stadien der Entwicklung des Embryos von *Sagina procumbens* L.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 2, S. 894-896. 1922.

An vorhergehende Arbeit (vgl. dies. Ber. 16, 333) anschließende Beschreibung des Schicksals der einzelnen Zellgruppen im Laufe der Embryoentwicklung, besteht aus Einheiten und ist darum nicht referierbar. Die Embryoentwicklung von *S. p.* ist die „schärfste und beschleunigteste“, die bekannt ist. *H. Bremer* (Proskau).

Williams, Maud: On the influence of immersion in certain electrolytes upon the cells of *Saxifraga umbrosa*. (Über den Einfluß von bestimmten Elektrolytlösungen auf die Zellen von *Saxifraga umbrosa*.) Ann. of botany Bd. 36, Nr. 144, S. 576 bis 576. 1922.

Verf. untersucht die durch Elektrolyteinwirkung bedingte Permeabilitätsänderungen der Zellen der Oberseite des Blattstieles von *Saxifraga umbrosa*. Diese Zellen sind sehr gerbstoffhaltig. Die Permeabilität kann deshalb leicht mit Kaliumdichromat, das beim Eindringen einen Niederschlag in den Zellen erzeugt, nachgewiesen werden. Als permeabel werden solche Zellen bezeichnet, die mit 0,1% Kaliumdichromatlösung

nerhalb 3 Minuten einen deutlichen Niederschlag geben. Untersucht wurde die Einwirkung von Kaliumdichromat und der Jodide, Chloride und Nitrate des Kaliums und Natriums. Es zeigte sich, daß für sie die Gleichung $\log T + k(\log C + 1) = K$ lt, wo T die Zeit ist, welche man braucht, um die Zellen permeabel zu machen, C die entsprechende Elektrolytenkonzentration, und k und K Konstanten sind, die von der Natur des Elektrolyten abhängen. Streng genommen gilt die Gleichung nur für Werte angefangen von 10 Minuten bis 4 Stunden. Aluminiumsalze hatten schon in den geringeren Konzentrationen dieselbe Wirkung. Die Permeabilitätssteigerung scheint ein irreversibler Vorgang zu sein, der eine Schädigung der Zelle anzeigt.

H. Walter (Heidelberg).

Rosenthaler, L.: Zur Prüfung der Treubischen Hypothese. (*Pharmazeut. Inst., Univ. Bern.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 134, H. 1/4, S. 215—224. 1922.

Traub (1896) hat die Hypothese entwickelt, daß Blausäure das erste erkennbare Produkt der Stickstoffassimilation und ein Eiweißbaustoff sei. Danach müßte sie in allen grünen Pflanzen nachzuweisen sein. Verf. untersucht verschiedene Pflanzen auf ihren Blausäuregehalt. Zu diesem Zwecke werden, um eine sekundäre Entstehung von Blausäure zu vermeiden, die zerkleinerten Pflanzenteile 24 Stunden mit Wasser ausgelaugt und durch den Pflanzensaft während 10 Stunden ein kräftiger Luftstrom durchgeleitet. Zur Absorption der Blausäure leitet man die Luft durch Waschflaschen mit Natrium. Nachgewiesen wird sie vor allen Dingen mit der Rhodanreaktion nach dem Verfahren von Lavialle und Varenne und außerdem noch mit der Jodsilber-, Jodstärke- und Phenolphthaleinreaktion. In 56 von 88 untersuchten Pflanzenarten konnte Blausäure meist in Spuren festgestellt werden. Jedoch spricht dieser Befund nicht für die Richtigkeit der Treubischen Hypothese, denn die Blausäure kann ebenso ein Abbauprodukt sein. Sie kommt in den Pflanzen niemals frei vor, sondern in Verbindungen z. B. des Benzaldehyds, p-Oxybenzaldehyds und Acetons, die in Beziehungen zu einzelnen Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin und Valin stehen. Führt man eine derartige Aminosäure in eine geeignete Blausäure-Pflanze ein, so dürfte nach den Treubischen Anschauungen keine Zunahme der Blausäure eintreten. Tatsächlich konnte aber bei Sorghum vulgare bei Einführung von Tyrosin eine erhebliche Steigerung des Blausäuregehaltes festgestellt werden. Damit wäre aber auch die Treubische Hypothese widerlegt, und wir müssen annehmen, daß die Blausäureverbindungen durch Umwandlung von Aminosäuren, die gerade im Überschuß vorhanden sind, entstehen, später aber wieder zum Aufbau benützt werden können. Zum Schluß betont Verf. aber noch, daß nicht alle Vorkommen von Blausäure in Pflanzen auf diese Weise zu erklären sind und man noch mit anderen Entstehungsweisen rechnen muß.

H. Walter (Heidelberg).

Chibnall, Albert Charles: Investigations on the nitrogenous metabolism of the higher plants. Pt. III. The effect of low-temperature drying on the distribution of nitrogen in the leaves of the runner bean. (Untersuchungen über den Stickstoffwechsel höherer Pflanzen. III. Die Wirkung des Trocknens bei niedriger Temperatur auf die Verteilung des Stickstoffs in den Blättern der Feuerbohne.) (*Biochem. dep., mp. coll. of science a. technol., London.*) *Biochem. journ.* Bd. 16, Nr. 5, S. 599—607. 1922.

(Vgl. diese Ber. 8, 127; 15, 488.) Es wurde an den Blättern der Feuerbohne (*Phaseolus vulgaris*, multiflorus) der Einfluß des Trocknens bei 40—50° auf die Verteilung des N untersucht. Der Gehalt an Gesamteiweiß nimmt ab (von 74,83 auf 61,15% vom Gesamt-N). Die Eigenschaften und Zusammensetzung des Eiweiß werden, soweit es sich mit der Hausmann-Methode feststellen läßt, nicht verändert. Die Proteosen nehmen etwas ab, wahrscheinlich nur deswegen, weil sie aus den getrockneten Blättern nicht so vollständig extrahiert werden können. Der N in dem vom Eiweiß und von den Proteosen befreiten Filtrat nimmt deutlich zu, und zwar annähernd proportional der Dauer des Trocknens, infolge einer Autolyse der Proteine. Die Produkte dieser Eiweißzersetzung sind vorzugsweise NH_4 -Salze, Asparagin und Aminosäuren. In den ge-

trockneten Blättern kommen eiweißspaltende Fermente vor, die durch Wasser aktiviert werden. Versuche an zerriebenen Blättern, die längere Zeit in Wasser stehen gelassen wurden, ergaben, daß durch die Wirkung dieser Fermente der wasserlösliche N rasch bis zu einer gewissen Grenze zunimmt, der Monoamino-N dauernd ansteigt, der Basen-N eine Zunahme zeigt, die im weiteren Verlauf nicht beibehalten wird, der NH_3 -N rasch ab- und der Amid-N des Asparagins fast entsprechend zunimmt, wobei die Summe von NH_3 -N und Amid-N des Asparagins nur wenig abnimmt. Verf. nimmt an, daß das Asparagin nicht schon als solches aus dem Eiweiß frei wird, sondern erst aus der Aminosäure und dem NH_3 synthetisiert wird, und zwar unter dem Einfluß eines Fermentes, einer Asparaginase.

K. Felix (Heidelberg).

Chibnall, Albert Charles: Investigations on the nitrogenous metabolism of the higher plants. Pt. IV. Distribution of nitrogen in the dead leaves of the runner bean. (Untersuchungen über den Stickstoffwechsel in höheren Pflanzen. IV. Verteilung des Stickstoffs in toten Blättern der Feuerbohne.) (*Biochem. dep., imp. coll. of science a. technol., London.*) *Biochem. journ.* Bd. 16, Nr. 5, S. 608—610. 1922.

Vgl. vorstehendes Referat. Eine Reihe von Pflanzen wurden vom Keimen an fortlaufend untersucht, bis das Chlorophyll Degenerationserscheinungen zeigte. In der 24. Woche starben sie ab infolge von Nachtfrost. Es konnte so die Wirkung des Altern und Absterbens auf den Gehalt an N-haltigen Substanzen in den Blättern festgestellt werden. Ein nennenswerter Abtransport von N aus den Blättern nach den Stengel und Wurzeln fand nicht statt. Die protein- und proteosenfreien N-Substanzen nehmen etwas zu. Der Nitrat-N vermindert sich gegen das Ende des Lebens der Pflanze. Die Proteine in den Blättern sind etwas amidiert worden. Das Verhältnis zwischen Eiweiß und Nicht-eiweiß-N wird durch das Altern und Absterben nicht verändert. K. Felix.

Colin, H. et H. Belval: La genèse des hydrates de carbone dans le blé. Présence de lévulosanes dans la tige. (Die Bildung von Kohlehydraten in Weizen. Vorkommen von Lävulosanen im Sproß.) *Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences* Bd. 175, Nr. 26, S. 1441—1443. 1922.

Die einzigen Kohlehydrate, die in den Blättern von Weizen vorkommen, sind Saccharose und deren Hydrolysisierungsprodukte. Stärke läßt sich weder mikroskopisch noch durch diastatische Spaltung nachweisen. Dasselbe gilt auch für den Stengel solange noch keine Ähren vorhanden sind, nur ist die Menge der reduzierenden Zucker relativ größer als in den Blättern. Von Juni an, zu einer Zeit, in der sich die Ähren entwickeln, ändern sich jedoch die Verhältnisse wesentlich. Während das Verhältnis von Dextrose zu Lävulose im Mai 1,48 betrug, sinkt es in den ersten Julitagen auf 0,28. Invertase hydrolysiert jetzt nur einen Teil der Zucker. Der Rest sind Lävulosane, die durch Säuren leicht in Fructose gespalten werden. Die Bestimmungen wurden auf optischem Wege ausgeführt. Es ist also falsch, vorauszusetzen, daß eine Pflanze mit stärkehaltigen Samen in ihrem Sproß nur Glucose oder Glucosane enthalten wird. Die Lävulose und deren Derivate übertreffen ihrer Menge nach die Glucose bei weitem zu einer Zeit, in der die Körner sich bereits mit Stärke füllen. H. Walter (Heidelberg).

Nicolas, E. et G. Nicolas: Influence du formol sur les végétaux supérieurs (Einwirkung von Formol auf höhere Pflanzen.) *Cpt. rend. hebdom. des séances l'acad. des sciences* Bd. 175, Nr. 26, S. 1437—1439. 1922.

Verff. kultivieren Bohnen in reiner Knopflösung und in Knop mit Zusatz von 0,321 g, 0,803 g und 1,606 g Formol auf 1 l Lösung. Nach etwa $2\frac{1}{2}$ Monaten betrug das Gesamtgewicht der Pflanzen in reiner Knopflösung 6,110 g (Wurzeln 1,370 und Sproß 4,740), bei Zusatz von 0,321 g Formol — 7,770 g (Wurzeln 1,290 und Sproß 6,480) bei 0,803 g Formol — 4,770 g (Wurzeln 0,620 und Sproß 4,150), während der letzten Kultur das Wachstum schon vollkommen gehemmt wurde. Man sieht daraus, daß Formol in geringen Konzentrationen (0,321 g) als Nährstoff dienen kann, da das erzielte Gesamtgewicht größer ist als in normalem Knop. Sehr interessant ist dabei die Tatsache, daß chlorophyllfreie Teile (Wurzeln) schon bei diesen Konzentration

entlich geschädigt werden, während die Blätter sich besser entwickeln. Das Chlorophyll scheint demnach die Fähigkeit zu besitzen, das Formol zu assimilieren und dadurch zu entgiften. Wir finden es deshalb auch niemals in den Blättern in freiem Zustande, obgleich es das erste Zwischenprodukt der Kohlensäureassimilation sein soll (vgl. diese Berichte 19, 460).

H. Walter (Heidelberg).

● **Appel, Otto:** Beispiele zur mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenkrankheiten. 3. verm. u. verb. Aufl. Berlin: Julius Springer 1922. 54 S.

Auf 54 Seiten sind 25 der wichtigsten Pilzkrankheiten und 13 der wichtigsten rischen Schädlinge von Kulturgewächsen in klarer, übersichtlicher Weise behandelt. In jedem Kapitel wird eine kurze Beschreibung des makro- und mikroskopischen Krankheitsbildes geliefert und durch klare, das Charakteristische hervorhebende Figuren erläutert; diagnostische Merkmale und das Wesentlichste aus der Lebensgeschichte des betr. Schädlingsorganismus werden mitgeteilt und Bekämpfungsmaßnahmen angegeben. Kartoffelkrankheiten, Getreiderost und -brand sind außerdem in Tabellenform behandelt. Das Buch ist vorwiegend für die Bedürfnisse wissenschaftlich vorgebildeter Praktiker geschrieben, doch wird insbesondere Übersichtlichkeit und Hervorhebung des Problematischen auch dem dienen, der auf diesem Gebiet forschend arbeiten will.

H. Bremer (Proskau).

Butler, E. J.: Some characteristics of the virus diseases of plants. (Einige Eigentümlichkeiten der Viruskrankheiten der Pflanzen.) Brit. med. journ. Nr. 3229, 963—964. 1922.

Verf. teilt die durch ultramikroskopische Erreger verursachten Pflanzenkrankheiten in 4 Gruppen ein, die er kurz charakterisiert. Eingehender bespricht er sodann die Übertragungsmöglichkeiten, unter denen Pflöpfen und Okulieren erkrankter Gewebe auf gesunde Pflanzen, Übertragen durch Insekten, Impfung gesunder Pflanzen durch den Gewebssaft erkrankter (Mosaikkrankheiten), sowie der seltenere Fall der Übertragung durch den Samen besonders hervorgehoben werden. In zwei weiteren Abschnitten werden die gegenwärtigen Kenntnisse über die Wanderungsmöglichkeit innerhalb des Pflanzenkörpers und über die Eigenschaften des Virus mitgeteilt.

Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Mitscherlich, E. A.: Das Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren. Biedermann's Zentralbl. Jg. 51, H. 11, S. 280—285. 1922.

Die Höhe des Pflanzenertrages ist eine Erscheinung, die durch die zufällige Konstellation einer großen Zahl physiologisch-chemischer und physikalisch-chemischer Faktoren bedingt ist. In welcher Weise die einzelnen Faktoren ihren Einfluß geltend machen, ist noch vielfach ungeklärt. Das gilt besonders für die „inneren“ Wachstumsfaktoren physiologischer Natur. Leichter zugänglich sind im allgemeinen die „äußeren“ Wachstumsfaktoren, die klimatischen und bodenkundlichen, die chemischen und physikalischen. Die Abhängigkeit der Ertragshöhe von den einzelnen Faktoren wurde vom Verf. in der Weise geprüft, daß ein einziger Faktor variiert wurde, während alle anderen Faktoren einer bestimmten Normierung unterworfen wurden. Zunächst wurde der chemisch-bodenkundliche Wachstumsfaktor Phosphorsäure als Variable gewählt. Um die „inneren“ Faktoren konstant zu erhalten, wurde gut ausgesuchtes Saatgut einer Nutzpflanze benutzt und dabei bekannte Fehlerquellen (durch Parallelansätze) möglichst ausgeschaltet. Auch Saat, Ernte, Wassergabe, Belichtung, Verteilung der Feuchtigkeit, Gefäß- und Bodenmaterial und übrige Pflanzenbedarfsstoffe wurden konstant gehalten. Wird der variable Wachstumsfaktor gesteigert, so ist der Höchstertrag bedingt durch die Konstellation sämtlicher übrigen Wachstumsfaktoren, auch wenn diese sämtlich möglichst günstig normiert waren. Aus Vegetationsversuchen, die zur Erzielung von Höchsterträgen so ausgeführt wurden, daß neben Phosphorsäure in anderer Faktor für einen möglichst hohen Ertrag nicht in ausreichender Menge vorhanden war, wird folgendes Gesetz abgeleitet: „Ein jeder Wachstumsfaktor bedingt nicht nur den Pflanzenertrag, sondern er übt einen ganz bestimmten Einfluß auf seine Höhe aus, der einmal von der Menge abhängig ist, welche dem Pflanzenbau von ihm zur Verfügung stand und der ferner durch den Wirkungsfaktor, d. i. der proportionale

Ertragssteigerungswert, des betreffenden Wachstumsfaktors bedingt wird.“ Das Liebigsche Gesetz vom Minimum kann demnach nicht mehr aufrecht erhalten werden. Denn der Ertrag wird nicht lediglich durch den Faktor bestimmt, der verhältnismäßig am meisten im Minimum ist, sondern er wird von sämtlichen Faktoren bedingt. Derjenige Faktor wird einen größeren Einfluß auf den Ertrag ausüben, der den größten Wirkungsfaktor besitzt. Durch dieses Gesetz des Verf. kommt erst zum Ausdruck, daß selbst wenn ein Wachstumsfaktor verhältnismäßig am meisten im Minimum ist, durch Steigerung eines zweiten Wachstumsfaktors eine weitere Ertragssteigerung erzielt werden kann. Wie mathematisch nachgewiesen wird, ist der Wirkungswert eines Wachstumsfaktors konstant. Verf. formuliert hiernach sein Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren wie folgt: „Der Pflanzenertrag wird bedingt durch eine große Reihe von Wachstumsfaktoren, deren jeder einen ganz bestimmten qualitativen und quantitativen Einfluß auf die Höhe des Ertrages ausübt. Mit der Steigerung eines jeden dieser Faktoren steigt der Pflanzenertrag proportional dem Ertrage, welcher an dem unter den gegebenen Bedingungen erzielbaren Höchstertrage fehlt. Dieser Anstieg muß um so schnell erfolgen, je größer der dem einzelnen Wachstumsfaktor typische Wirkungsfaktor ist und je geringere Mengen des betreffenden Wachstumsfaktors der Pflanze bisher zur Verfügung standen.“ Wegen weiterer eingehender Begründung des Gesetzes und das aus ihm zu ziehenden praktischen und theoretischen Folgerungen muß auf das Original verwiesen werden. (Originalmitteilung in Zeitschr. f. Pflanzenernährung u. Düngung Teil A, 1, 49—84. 1922.)

Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Wiegner, Georg: Agrikulturchemie und Kolloidechemie. Kolloid-Zeitschr. Bd. 5, H. 5, S. 271—275. 1922.

In dieser Wiedergabe eines kurzen Vortrages zeigt Verf., hauptsächlich an Beispielen aus dem agrikulturchemischen Teilgebiet der Bodenkunde, daß sowohl in den Fragestellungen als auch in Arbeitsmethoden Kolloidechemie und Agrikulturchemie mancherlei Verbindendes haben. Von besonderem Interesse wird für den Agrikulturchemiker das Studium der groben Dispersionen sein. Aus der Vereinigung beider Forschungsgebiete wird die Dispersionschemie grobdispersen Systeme hervorgehen.

Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Harrison, W. H. und S. Das: Die Bindung löslicher Phosphate in kalkhaltigen und kalkfreien Böden. Biedermanns Zentralbl. Jg. 51, H. 11, S. 286—288. 1922.

Bei gewöhnlicher Temperatur verläuft die Reaktion zwischen CaCO_3 und $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ sehr schnell. Hierbei entsteht CaHPO_4 und in geringer Menge $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. In Lösung reagiert CaHPO_4 ebenso schnell mit CaCO_3 unter Bildung von $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, während die Reaktion zwischen den festen Stoffen bei Gegenwart von Wasser viel langsamer vor sich geht. Das bei der Reaktion gebildete CO_2 erhöht die Menge der Ca -Ionen stark und vermindert dadurch die in Lösung gebildete Phosphorsäure. Die Kulturmaßnahmen müssen also für kalkhaltige Böden so gewählt werden, daß der Ca -Gehalt der Bodengare auf einem Minimum erhalten wird, weil dadurch eine größere Konzentration der Phosphorsäure in der Bodenlösung herbeigeführt wird. Die Phosphorsäure der Superphosphate wird wahrscheinlich durch Absorption oder chemische Bindung im Boden zurückgehalten. Die Schnelligkeit der Reaktion mit CaCO_3 führt zu der Annahme, daß die Bindung in kalkhaltigen Böden wesentlich durch diesen Faktor bestimmt wird. — Weiterhin wird experimentell gezeigt, daß lösliche Phosphate, die nicht mit CaCO_3 reagieren, in kalkhaltigen und kalkfreien Böden durch Absorption zurückgehalten werden. Phosphate vom Typ des $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, die leicht mit CaCO_3 reagieren, werden in kalkfreien Böden durch Absorption, in kalkhaltigen dagegen infolge anderer Ursachen zurückgehalten. Im letzten Teil wird über die Verteilung löslicher Phosphate auf Grund von Perkolationsversuchen berichtet. In kalkfreien Böden dringt die Phosphorsäure in beträchtliche Tiefe. Die Wirkung von Superphosphatgaben ist bei solchen Böden daher eine weitgehende. Im Gegensatz hierzu findet sich die Phosphorsäure in kalkhaltigen Böden in den oberen Lagen. Superphosphatdüngung ist hier deshalb nur von beschränkter Wirkung. Die kalkfreien Böden enthalten die Phosphorsäure in besser ausnützbarer Form. Der wesentlichste Faktor

er die Beurteilung der Wirksamkeit und Verteilung der Phosphorsäure im Boden das CaCO_3 . Werden Präparate löslicher Phosphorsäure, die keine oder nur geringe Reaktion mit CaCO_3 zeigen, angewandt, so kann auf kalkhaltigen Böden eine weit gleichmäßigere Verteilung erreicht werden. Düngung mit Superphosphaten ist also in kalkhaltigen Böden verhältnismäßig viel wirksamer als in kalkhaltigen. *Dörries* (Berlin).

MacIntire, W. H.: Das Wesen der Bodensäure in bezug auf ihre quantitative Bestimmung. *Biedermanns Zentralbl.* Jg. 51, H. 11, S. 275—277. 1922.

Aus mineralischen Böden ist zwar eine Anzahl Salze anorganischer Säuren, doch niemals eine freie organische Säure extrahiert worden. Wenn der organische Kohlenstoff diesen Böden als Bestandteil einer bestimmten organischen Säure angesehen wird, würde diese hypothetische Säure nur einen Bruchteil derjenigen Säuremenge äquivalent sein, die nach den verschiedenen Bestimmungsmethoden festgestellt wurden. Die lösten Basen des Bodens scheinen durch Kieselsäure gebunden oder adsorbiert zu werden, und zwar hauptsächlich durch Aluminosilicate. Durch die Größe ihrer Wasserbindung wird die Anfangsintensität und Dauer der Reaktion bestimmt. Durch Verlust anorganischen Salzen des Ca und Mg entsteht die Acidität des Bodens, in der Regel durch Hydrolyse der Erdalkali-Kieselsäurekomplexe. Hierdurch steigt der Säurewert der sauren Silicate. Indem die Masse der Kieselsäure schrittweise hydrolysiert, wird der Abbau der Ca- und Mg-Carbonate fortgesetzt, sofern die freie Kohlensäure der Lösung entzogen wird. Die wäßrigen Extrakte mancher Böden reagieren zwar gegen einige gewöhnliche Indicatoren alkalisch, zeigen aber bei elektrometrischer oder colorimetrischer Untersuchung H-Ionenkonzentration. Die H-Ionenkonzentration saurer Böden ist zwar im allgemeinen für höheres Pflanzenleben nicht giftig, mag aber doch auf das Wachstum von Bakterien und Pilzen einwirken. Etwaige ungünstige Säurewirkung könnte bis zu einem gewissen Grade toxischen Salzen (Aluminium u. a.) zugeschrieben werden; sie beruht aber in der Hauptsache wohl auf dem zu geringen Ersatz des nutzbaren Ca aus dem erschöpften Ca-Vorrat des Bodens. Der Umlauf etwa im Boden gebildeter Säuren (Salpetersäure) kann nur kurz sein, da sie durch natürliche oder künstlich zugeführte basische Stoffe neutralisiert werden. Weiterhin beschäftigt sich die Mitteilung mit den Reaktionen zwischen Böden und Erdalkalicarbonaten. (Originalmitteilung in *Journ. Americ. soc. agron.* 13, 137. 1921.)

Dörries (Berlin-Zehlendorf).

Comber, Norman M.: A modified test for sour soils. (Eine abgeänderte Prüfungsmethode für saure Böden.) (*Dep. of agricult., univ., Leeds.*) *Journ. of agricult. science* Bd. 12, Nr. 4, S. 370—371. 1922.

An Stelle der früher zur Charakterisierung saurer Böden empfohlenen alkoholischen Rhodankaliumlösung, deren Bestandteile häufig schwer erhältlich sind, läßt sich eine wässerige, etwa 5proz. Lösung von Kaliumsalicylat verwenden. Die in wäßrigen Lösungen von Salicylure und Salicylaten durch Spuren von Ferrisalzen hervorgerufene Violettfärbung ist eine empfindlichere Reaktion als die Eisenprobe mit Rhodanid. Es war deshalb zu erwarten, daß bei Anwendung von Salicylaten auf saure Böden, also solche, in denen die Abwesenheit starker Eisen die Auflösung des vorhandenen Eisens nicht verhinderten, eine Violettfärbung aufzutreten würde. In Wirklichkeit zeigten saure Böden nach wenigen Minuten immer eine rote, die anderen dagegen eine gelbe bis bräunlich-gelbe Färbung der Lösung. Die Gelbfärbung tritt sich offenbar bei allen Böden auf, und die rote Färbung im Falle der sauren Böden entsteht durch Überlagerung der gelben und der violetten Färbung. Eine große Anzahl von Versuchen zeigte Übereinstimmung zwischen den Angaben des Rhodan- und des Salicylatnachweises.

Walter Neumann (Oranienburg).

Comber, Norman M.: The flocculation of soils. III. (Die Flockung von Böden III.) (*Dep. of agricult., univ., Leeds.*) *Journ. of agricult. science* Bd. 12, Nr. 4, S. 372—386. 1922.

Das früher an Suspensionen von Bodenteilchen beobachtete abnorme Fällungsvermögen von $\text{Ca}(\text{OH})_2$, welches darin bestand, daß oberhalb einer bestimmten, niedrigen Konzentration $\text{Ca}(\text{OH})_2$ stärker fällend wirkt als neutrale Calciumsalze, wurde auch bei Suspensionen verschiedener anderer Stoffe festgestellt, insbesondere bei Aluminium-

und Eisenphosphat und einigen natürlichen Calciumphosphaten, und wie im früheren Falle wird dieses Verhalten darauf zurückgeführt, daß $\text{Ca}(\text{OH})_2$ auf den Kern der Teilchen dispergierend, auf die emulsoide Oberfläche dagegen fällend wirkt. Die Gegenwart kolloider Kieselsäure erhöht die Beständigkeit mancher Suspensionen, während andere nicht beeinflusst werden. Die Überlegenheit des $\text{Ca}(\text{OH})_2$ als Fällungsmittel im Vergleich zu CaCl_2 oberhalb einer bestimmten Konzentration ist ausgesprochen bei fetten als bei mageren Tönen. Die Konzentration, oberhalb deren $\text{Ca}(\text{OH})_2$ stärker fällend wirkt als CaCl_2 , ist bei einem mageren Ton viel niedriger als bei einem fetten, weil dort infolge der geringeren Menge von vorhandenem Emulsoid das $\text{Ca}(\text{OH})_2$ früher die zur Ausübung der maximalen Fällungswirkung erforderliche Konzentration erreicht. Kurzes Glühen der Böden erhöht die Löslichkeit des darin enthaltenen Eisens und Aluminiums beim Ausziehen mit Salzsäure, da das Gel-Binde mittel zwischen den Bodenteilchen durch das Glühen entwässert wird, zusammen schrumpft und Risse erhält, wodurch die dem Lösungsmittel ausgesetzte Oberfläche zunimmt. Für diese Auffassung sprechen die Ergebnisse von Versuchen, die zeigten, daß die Löslichkeit von Eisenoxyd, das mit Wasser und $\text{Ca}(\text{OH})_2$ eingedampft worden war, durch kurzes Glühen erniedrigt wurde, während nach Eindampfen mit Kieselsäure-Sol oder mit Kieselsäure-Sol und $\text{Ca}(\text{OH})_2$ kurzes Glühen die Löslichkeit erhöht. Die Aufnahme des Kalkes durch Tone vollzieht sich an der kolloidalen Oberfläche, und deren Absorptionsbestreben muß weitgehend befriedigt sein, bevor die abnorme Fällung durch das $\text{Ca}(\text{OH})_2$ verursacht wird. Das Basenbindungsvermögen von Böden wird durch kurzes Glühen verschieden beeinflusst. Böden, ohne organische Substanz, aus denen die absorbierten Basen durch verdünnte Säuren ausgezogen worden sind, zeigen eine Verminderung des Bindungsvermögens wegen der Zerstörung des kolloidalen Gelmaterials. Nicht behandelte Böden ohne Gehalt an organischer Substanz, ab mit absorbiertem Kalk, zeigen nach kurzem Glühen erhöhtes Basenbindungsvermögen infolge Bildung neuer Oberflächen, dagegen weisen Böden mit hohem Gehalt an organischer Substanz eine starke Abnahme des Bindungsvermögens auf, weil durch d. Glühen die absorbierten kolloidalen Humusstoffe vernichtet werden.

Um eine Tonsuspension ohne Verwendung eines Überschusses von Ammoniaklösung herzustellen, muß das Optimalverhältnis von Tonsubstanz zur Wassermenge durch Suspensionsversuche experimentell festgestellt werden. Eine fast neutrale Tonsuspension erhält man, indem man den Boden mit verdünnter Säure auszieht, mit Überschuß von Kalkwasser rührt, absaugt, mit heißem Wasser gründlich wäscht und den Rückstand ungetrocknet suspendiert (II. vgl. diese Berichte 11, 259).

Walter Neumann (Oranienburg)

Müller, H. C. und E. Molz: Versuche zur Erhöhung der Produktionskraft der Saatkartoffel. (*Versuchsstat. f. Pflanzenkrankh., Halle.*) Landwirtschaftl. Jahrbuch Bd. 57, H. 5, S. 679—706. 1922.

Als „Produktionsreife“ bezeichnen die Verf. das Reifestadium der Kartoffelknolle, welchem sie als Saatknohle die höchsten Erträge liefert. Die Produktionsreife fällt mit physiologischen Reife nicht zusammen. Sie wird vielmehr erreicht, wenn die Saatkartoffel geerntet werden, solange die Mutterstauden sich noch in grünem Zustande befinden, oder wenn das Kraut der Mutterstauden in noch grünem, nicht senilem Zustande abgeschnitten wird. Die auf diese Weise erhaltenen Knollen zeichnen sich vor den normal geernteten durch gleichmäßigen Aufbau, größere Frohwüchsigkeit und höhere Erträge aus. Werden die Saatknohlen von Stauden genommen, die im Jugendzustande geschädigt wurden (späte Pflanzzeit, Spätfrost, Schädigung des Krautes durch Krankheiten), so wird die nächstjährige Ernte ungünstig beeinflusst. Höhere Erträge liefern ebenso wie frühgeerntete Knollen diejenigen solcher Stauden, deren Kraut dauernd mäßig beschattet wurde. Außer den Belichtungs-, scheinen auch die Transpirationsverhältnisse der Mutterstauden, die im Stärkegehalt der Knollen in Erscheinung treten, von Einfluß auf die Produktionskraft der Saatknohlen zu sein. Auch durch Auslese ertragreicher Stauden kann der Ernteertrag sehr wesentlich erhöht werden. Innerhalb derselben Linie hat die Größe der Knollen einen sehr großen Einfluß auf den Ertrag. „Auf Jahren, an denen die Kartoffelstauden in ihrer letzten Entwicklung durch Trockenheit oder Krautfäule (Phytophthora) usw. gelitten haben, folgen gemeinhin Kartoffeljahre mit hohen Erträgen.“ Die Verf. konnten so im Winter 1921/22 für das Jahr 1922 eine gute Ernte voraussagen.

Dörries (Berlin-Zehlendorf)

Stoffwechsel. Energiewechsel.

● **Sjollema, B.:** Ergebnisse und Probleme der modernen Ernährungslehre. München u. Wiesbaden: J. F. Bergmann 1922. 206 S.

Vgl. diese Berichte 17, 40.

Berti, A.: Sur l'appétit et sur la faim. (Appetit und Hunger.) (*Inst. de méd., univ., Padoue.*) Arch. ital. de biol. Bd. 71, H. 1, S. 15—21. 1922.

Zur leichten Prüfung des Appetits wurde den Versuchstieren — Katzen — stets gleiche Nahrung, ein mit Milch angemachtes Kartoffelpüree, gereicht. Am Versuchstage wurde etwas Wismutbrei zugefügt. Die röntgenologische Untersuchung ergab, daß im Zustande der Appetitlosigkeit die Peristaltik längs der großen Krümmung und die Pyloruspartie sehr herabgesetzt ist und daß sich besonders die obere Hälfte des Magens in einem hypotonischen Zustand befindet. Anfänglich besteht eine Verzögerung der Pylorusentleerung, später eine solche in der Entleerung des Gesamtmagens. Im Hungerzustand sind die auftretenden Erscheinungen den beschriebenen gerade entgegengesetzt.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Grandis, Valentino: Il grado di raffinazione della farina di frumento in rapporto al valore alimentare del pane. (Der Verfeinerungsgrad des Weizenmehls im Verhältnis zum Nährwert des Brotes.) Pathologica Jg. 14, Nr. 323, S. 599—605. 1922.

Von der zugeführten Nahrung dient ein Teil der Befriedigung der vegetativen Bedürfnisse des Individuums, der andere der Deckung des Leistungszuwachses. Der erste ist konstant und begreift die lebensnotwendigen Bausteine, vor allem die Proteine in sich, der zweite wechselt mit den gestellten Anforderungen. Von dem Stickstoff des Weizenmehls ist etwa 1/3 nicht in Form von Eiweiß vorhanden, sondern in Gestalt weniger gut ausnutzbarer Verbindungen. Die räumliche Verteilung der Eiweißkörper im Weizenkorn begünstigt ihre Entwertung beim Mahlprozeß, da sie nahe der Schale reichlich, im Inneren des Korns aber spärlicher sind und deshalb leicht mit der Schale verlorengehen. In Zeiten großer Knappheit wird es notwendig, den Bestand des Getreidekorns an Nahrungssubstanzen möglichst ungeschmälert in das Brot zu überführen. Alle Brotarten, die aus weniger scharf gesiebtem Mehl hergestellt sind wie das Grahambrod und viele andere Sorten, können als Zwischenstufen auf dem Wege vom Weißbrod des Wiener Typs zum Vollkornbrod angesehen werden. Mit diesem letzteren könnte das physiologische und nationalökonomische Ideal verwirklicht erscheinen. Vor dem Kriege angestellten Stoffwechselversuche haben jedoch zu dem Ergebnis geführt, daß der effektive Nutzwert eines Brotes um so größer ist, je weiter das verwendete Mehl raffiniert war. In dem preussischen Kommißbrod wurde der Eiweißstickstoff nur zu 69% ausgenutzt. Auch französische Autoren, z. B. Fauvel, kommen zu dem Ergebnis, daß das Vollkornbrod die Ausnutzung der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel, besonders des Fleisches, erschwert. Das Körpergewicht pflegt allerdings konstant zu bleiben, wenn beliebig viel Nahrung aufgenommen werden kann. Angesichts dieser Resultate erscheint die Zweckmäßigkeit mancher Nahrungsmaßnahmen, die während des Krieges getroffen wurden, sehr fraglich. Bei einer im Kriege entstandenen „Fruges“ genannten Brotsorte läßt man das reichlich angefeuchtete Getreide 48 Stunden bei 30° keimen. Dabei werden die schlummernden Fermente aktiviert, die Stärke in Malz und alle Reservestoffe des Korns in leichter assimilierbare Form übergeführt. Hierin liegt ein großer Vorteil gegenüber dem Gelinck-Verfahren, bei dem das Getreide 2 Stunden in 50grädigem Wasser maceriert wird. Dadurch werden zwar die Proteine freigelegt, aber keine Nahrungsstoffe in löslichere Form gebracht. Bei dem Fruges-Verfahren werden insbesondere die Pentosane des Getreides in Pentosen übergeführt. Im ganzen wird aber die Überlegenheit dieses Verfahrens über die Vollkornbrodbereitung in physiologischer und ökonomischer Beziehung noch zu erweisen sein.

Schmitz (Breslau).

Salvador, Wenceslao: The food value of Philippine Bananas. (Der Nährwert der Bananen von den Philippinen.) (*Bur. of science, Manila.*) Philippine Journ. of Science Bd. 20, Nr. 3, S. 363—366. 1922.

Die Früchte liefern vorwiegend Kohlenhydrate. Ihr Nährwert beruht auf dem Zucker, den sie enthalten. Dessen Menge erreicht in einigen Sorten 27,03%. Der Säuregehalt der Früchte beruht auf Butter- und Citronensäure. *Korff-Petersen.*

Taylor, William: Note on the non-protein nitrogen in goat's milk. (Mitteilung über den Reststickstoff der Ziegenmilch.) (*Rowett inst., Aberdeen.*) Biochem. Journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 611—612. 1922.

Der Gehalt der Ziegenmilch an Eiweiß, Fett, Milchzucker und Asche hängt mehr von dem Tempo der Sekretion als von der Beschaffenheit der Nahrung ab. Der Rest-

stickstoff setzt sich aus Aminosäuren, Kreatin und Kreatinin, Harnsäure und Harnstoff zusammen, wobei der letztgenannte Körper bei weitem überwiegt. Die Konzentration des Reststickstoffs hängt von der im Blute ab. Die Milchdrüse verhält sich den Reststickstoffkörpern gegenüber wie ein Exkretionsorgan. Es besteht eine deutliche Beziehung zwischen dem Gesamt-N des Harns und dem Rest-N der Milch.

Schmitz (Breslau).

Randoin, L. et P. Portier: Les boissons fermentées et les idées nouvelles sur la nutrition. (Die gegorenen Getränke und die neuen Anschauungen über die Ernährung.) Bull. de la soc. scient. d'hyg. aliment. Bd. 10, Nr. 6, S. 345—355. 1922.

Nach einer kurzen allgemeinen Übersicht über die Eigenschaften des Alkohols im Organismus zu verbrennen, als Energiequelle zu dienen und andere Nahrungstoffe zu sparen, und einem geschichtlichen Abriß, aus dem hervorgeht, daß alle Völker die gekochte Nahrungsmittel zu sich nehmen, auch den Genuß der gegorenen Getränke kannten, wird die Ansicht verfochten, daß sich in den gegorenen Getränken bei der Herstellung herrührend Vitamine, und zwar B- und C-Vitamin, finden müßten. Diese Ansicht wird durch Versuche an 3 Tieren, 2 Meerschweinchen und einer Taube, die bis zum Auftreten von Karenzerscheinungen mit vitaminfreier Nahrung gefüttert wurden und bei denen dann durch geringe Mengen von Rotwein die Erscheinung zurückgingen, zu stützen versucht.

Hannes (Hamburg).

Okuneff, N.: Zur Morphologie der lipoiden Substanzen im Hungerzustand (Inst. f. allg. u. exp. Pathol., milit.-med. Akad., St. Petersburg.) Beitr. z. pathol. An. u. z. allg. Pathol. Bd. 71, H. 1, S. 99—114. 1922.

Morphologische Untersuchungen über den Lipoidgehalt der Organe hungernder Tiere sind bis jetzt vor allem an der Nebenniere und an der Leber gemacht worden. Verf. prüft diese Untersuchungen nach und dehnt sie auf eine Reihe anderer Organe aus. Seine Versuchstiere waren Kaninchen, die solange hungerten, bis man den gewöhnlichen Aufbrauch des Reservefetts annehmen durfte und dann durch Luftembolie getötet wurden. Als Kontrolle dienten mit Hafer, Heu und Gemüse normal ernährte Tiere derselben Rasse. Bei allen 6 Hungertieren wurden in der Nebennierenrinne fettartige Substanzen in verschiedener, meist aber ansehnlicher Menge gefunden. Unter ihnen waren sowohl isotrope, als anisotrope Lipide. Jedenfalls tritt im Hungerzustande keine Verminderung des Lipoid- und speziell des Cholesteringehaltes in der Nebennierenrinde ein, vielmehr kann man in Zusammenhang mit der Gewichtszunahme dieses Organs eher an eine Fettzunahme denken. Die Eigenschaften der Lipide bleiben im ganzen dieselben, insbesondere sind die anisotropen Lipide reichlich vertreten. Auch in der Leber tritt im Hungerzustand eine Ablagerung von Lipiden vor und zwar in den Kupfferschen Sternzellen und in den Epithelzellen der kleinen Gallengänge. Nach ihren optischen und färbereischen Eigenschaften gehören sie zum Teil zu den Cholesterinestern. Bisweilen wurden auch in den Leberzellen selber lipide Körnchen angetroffen, die sich von den Neutralfetten durch ihre Blaufärbung mit Nilblausulfat unterschieden. In verschiedenen Zellelementen der Milz fanden sich Zelleinschlüsse, die ein Gemisch von Cholesterinestern mit isotropen Lipiden darstellten. Öfter wurden Zellen angetroffen, die den von Anitschkoff beschriebenen Xanthomzellen glichen. Vorzugsweise fanden sich die Einschlüsse in den Zellen des endothelialen Apparats, aber auch in den Wandzellen der kleineren Milzarterien. Hier war die Erscheinung den anfänglichen Stadien der experimentellen Atherosklerose durch Cholesterinfärbung ähnlich. In den Nierenzellen wurden nicht als lipide Substanzen gefunden. Die Schilddrüse wies bei Normal- und Hungertieren keine Unterschiede auf. Die Zellkörner waren hier klein und wenig zahlreich. Ähnlich lagen die Verhältnisse bei den Epithelkörperchen. In der Thymus hungernder Kaninchen wurden immer große Mengen von isotropen und besonders von anisotropen Lipiden gefunden. Beim Pankreas war kein Unterschied gegenüber der Norm zu konstatieren, ebenso waren die Leydigischen und Sertolischen Zellen der Hoden ganz unbeeinflusst.

bachteten Cholesterinanreicherungen in der Nebennierenrinde, den Kupfferschen Sternzellen und den retikuloendothelialen Zellen der Milz erklären sich aus der im Hunger auftretenden Hypercholesterinämie, da diese selben Zellen sich auch bei der alimentären Hypercholesterinämie mit Cholesterin beladen. Die Hypercholesterinämie selber dürfte durch Zerfall von Zellmaterial zustande kommen. Auch eine rein endogene Cholesterinämie kann, wie der Befund an den kleinen Milzarterien zeigt, beim Zustandekommen der Atherosklerose mitwirken. *Schmitz (Breslau).*

Ikedo, Yasuo: Beiträge zur Pathologie des Hungers, mit besonderer Berücksichtigung der Fettwanderung und der Veränderung der lymphatischen und hämatopoetischen Organe. (*Inst. f. Infektionskrankh. u. pathol. Inst., Univ. Tokio.*) Mitt. a. med. Fak. d. kais. Univ. Tokyo Bd. 29, H. 1, S. 131—178. 1922.

Ikedo hat bei Kaninchen in verschiedenen Stadien des absoluten Hungers, ferner auch bei protrahierten Hungerversuchen und bei Wiederauffütterung, das Blut und auch die Tötung der Tiere besonders die hämatopoetischen Organe untersucht. Von Blutveränderungen sei als wesentlichste nur die — nach anfänglicher kurzer Verhinderung — dauernd fortschreitende Verminderung der Lymphocyten im Blut vorgehoben. Die Milz verfällt relativ früh einer hochgradigen Atrophie, in den mesenterialen und peripheren Lymphknoten sieht man neben der Atrophie und Verkümmern auch eine Nekrose des Parenchyms, in den Lymphfollikeln der Appendix sieht man neben den degenerativen Vorgängen gleichzeitig besonders deutlich regenerative Prozesse mit Karyokinese der Lymphocyten beobachten. Im Gegensatz zu normalen Mesenterialdrüsen findet man bei Hunger Fett im Parenchym, aber nicht frei im Sinus als extracelluläres Fett. Die Thymusatrophie, die am schnellsten eintritt, wird hauptsächlich durch Auswanderung der Thymuslymphocyten aus dem Organ, z. T. auch durch Zerfall des Parenchyms bedingt. Knochenmark zeigt im Beginn vorübergehende Wucherung der myeloischen, geringe der erythroblastischen Elemente, im weiteren Verlauf Rückkehr zur Norm und bei langdauerndem Hunger Atrophie des myeloischen Gewebes. Bei Auffütterung folgt bald Regeneration in allen hämatopoetischen Organen. Tiere, deren Blut lymphocytenreich und deren lymphatisches System gut entwickelt war, erwiesen sich viel widerstandsfähiger gegen den Hunger als andere. In frühen Hungerstadien findet sich als Ausdruck der Lipämie eine Fettinfiltration in Leber und Niere, die im weiteren Verlauf wieder verschwindet. *Groll (München).*

Abderhalden, Emil: Weitere Beiträge zur Kenntnis von organischen Nahrungsstoffen mit spezifischer Wirkung. XIX. Mitt. Vergleichende Fütterungsversuche mit Fleisch von normal und von ausschließlich mit geschliffenem Reis ernährten Tauben. (*Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 89—96. 1922.

In Mitteilung XVI (vgl. diese Berichte 15, 234) wurde dargelegt, daß keine Hauptpunkte dafür vorhanden sind, daß Tiere, die an alimentärer Dystrophie erkrankt sind, als Nahrungsmittel erheblich minderwertig sind, sofern die Versuchstiere ausreichend ernährt werden. Ein neuer Versuch in dieser Richtung wird jetzt mitgeteilt, der insgesamt 129 bzw. 137 Tage umfaßt. Beide Tauben werden vollständig gleichmäßig ernährt. Nur erhält die eine Taube Fleisch und Organgemenge von Normaltauben, die andere dasselbe von Tauben, die lange nur mit geschliffenem Reis ernährt waren. Im Verhalten beider Tauben zeigte sich kein wesentlicher Unterschied. Krampferscheinungen traten nicht ein. Beide Tiere gingen schließlich unter starkem Gewichtsverlust ohne besondere Erscheinungen zugrunde. Hefe wirkte nicht wie bei Reistauben so, daß eine Gewichtszunahme erfolgte, sondern wie bei Hefegartentauben; das Gewicht sank auf Hefezulage. Nur im Gaswechsel trat bei dem Tier, das mit Reistaubenorganen gefüttert wurde, bei Hefezulage eine Steigerung ein, bei der Kontrolltaube war dies nicht der Fall. Das Ergebnis ist nach dem jetzigen Stand unseres Wissens überraschend und kann nur auf Grund späterer

Versuche eine Erklärungsmöglichkeit finden. Die Tauben erhielten hauptsächlich Eiweiß. Spätere Versuche haben nun ergeben, daß eine Taube mit 20—30 g Fleisch oder Organgemenge auskommen kann. Kohlenhydrate begünstigen das Zustandekommen der Erscheinungen der alimentären Dystrophie. Somit tritt die Fragestellung auf, ob jene unbekannten Nahrungsstoffe nicht beim Stoffwechsel einer ganz bestimmten Gruppe von Nahrungsstoffen wirksam und unentbehrlich sind. Der Mangel an jenen Stoffen tritt rasch in Erscheinung, wenn den Zellen hauptsächlich Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Folgender Befund ist in dieser Hinsicht wichtig: Leber von Tauben, die ausschließlich mit geschliffenem Reis ernährt wurden, war immer glykogenfrei gefunden. — Beim Zustandekommen der alimentären Dystrophie bei ausschließlicher Ernährung mit geschliffenem Reis kommt nicht nur der Mangel an noch unbekannten Nahrungsstoffen in Betracht, die Art der Nahrung ist von erheblicher Bedeutung. Wertheimer (Halle).

Aberdalden, Emil: Weitere Beiträge zur Kenntnis von organischen Nahrungsstoffen mit spezifischer Wirkung. XX. Mitt. Vergleichende Fütterungsversuche mit verschiedenen reinen Nahrungsstoffen. (Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 97—104. 1922.

In der XVIII. Mitteilung wurde gezeigt, daß es gelingt mittels reiner Nahrungsstoffe alle Erscheinungen der alimentären Dystrophie bei Tauben nachzuahmen, bisher nur nach Verfütterung von geschliffenem Reis zur Beobachtung gekommen sind. Dieser wichtige Befund hatte der Intoxikationstheorie jeden Boden entzogen. In der Hand eines reichlichen Materials werden diese Befunde in dieser Mitteilung bestätigt. Die Erscheinungen der alimentären Dystrophie, hervorgerufen durch reine Nahrungsstoffe, lassen sich durch Hefe nicht immer so leicht beseitigen wie bei jenen, hervorgerufen durch Ernährung mit geschliffenem Reis. Vielleicht ist die Schädigung des Zellstoffwechsels eine besonders schwere. Die Gewebsatmung ist auch in diesen Fällen stark herabgesetzt und läßt sich durch Hefe wieder steigern. Wertheimer.

Aberdalden, Emil: Weitere Beiträge zur Kenntnis von organischen Nahrungsstoffen mit spezifischer Wirkung. XXI. Mitt. Versuche mit reinen Nahrungsstoffen mit Überwiegen der Kohlenhydrate bzw. eines Fettsäuren-Glyceringemisches. (Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 2, S. 105—120. 1922.

Vollständiger Nahrungsmangel erzeugt bei Tauben niemals die Erscheinungen der alimentären Dystrophie. Von dieser Beobachtung aus entstand die Fragestellung, ob jene unbekannten Stoffe (Nutramine) bei der Umsetzung ganz bestimmter Nahrungsstoffe notwendig sind. Werden eben diese Nahrungsstoffe in großer Menge zugeführt, so genügen, die in den Zellen vorhandenen Nutramine nicht, um den Zellstoffwechsel in normalen Bahnen zu halten; sie könnten jedoch ausreichen, wenn jene Nahrungsstoffe nur in geringer Menge zur Umsetzung kommen. Aus diesen Erwägungen wurden folgende Versuchsreihen angestellt: Es erhielten Tauben reines Casein, Mineralsalzgemisch und Fettsäure-Glyceringemisch, dabei traten keine Erscheinungen der alimentären Dystrophie auf. Eine andere Gruppe erhielt Casein, Mineralstoffgemisch und Kohlenhydrate—es blieben nur bei wenigen Versuchstieren ausgesprochene Krämpfe aus, dann zeigte sich immer eine ausgesprochene Temperatursenkung, worauf nach 2—3 Tagen der Tod eintrat. Tauben, die ausschließlich mit Fettsäuren und Glycerin ernährt wurden, glichen Hungertieren und zeigten keine charakteristischen Erscheinungen der alimentären Dystrophie. Endlich wurden Tiere ausschließlich mit Kohlenhydraten gefüttert. Es traten immer Krampferscheinungen oder Lähmungen ein. Die Gewebsatmung dieser Tiere war herabgesetzt und wurde durch Hefeautolysat gesteigert. — Ferner erhielten Tauben, die 3 Wochen ausschließlich mit geschliffenem Reis ernährt waren, Fettsäure-Glyceringemisch, es entstanden keine ausgesprochenen Erscheinungen der alimentären Dystrophie; andere erhielten Rohrzucker, es zeigten sich bald Krämpfe oder Lähmungen, wieder andere bekamen 15 g geschliffenen Reis;

Tiere gingen zugrunde bei fallender Temperatur, ohne Krampferscheinungen oder Zuckungen. — Der Mangel an bestimmten unbekannten Stoffen allein genügte also nicht, um die charakteristischen Erscheinungen der alimentären Dystrophie hervorzurufen, erst wenn ein Umsatz größerer Kohlenhydratmengen stattfand, traten die bekannten Erscheinungen auf. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, daß nicht Kohlenhydrate als solche maßgebend zu sein brauchen, wahrscheinlich bestehen Störungen in den Beziehungen zwischen den Abbaustufen verschiedener Nahrungsstoffe. — Interessante Hinweise auf die mögliche Bedeutung dieser Befunde für die Pathogenese der Nährschäden der Säuglinge bei einseitiger Ernährung und für den Diabetes mellitus mit seinen Folgeerscheinungen.

Wertheimer (Halle).

Abderhalden, Emil: Weitere Beiträge zur Kenntnis von organischen Nahrungsstoffen mit spezifischer Wirkung. XXII. Mitt. Fütterung von Tauben mit Fleisch und mit Zusätzen. (*Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.*) Pflügers Arch. f. d. ges. physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 121—130. 1922.

Es wurde der Frage nachgegangen, welchen Einfluß ein Nahrungsmittel auf das Leben von Tauben hat, das normalerweise von dieser Tierart nie aufgenommen wird. Es wurden Tauben auf lange Zeit mit Pferde- oder Rindfleisch ohne und mit anderen Zusätzen ernährt. Die Versuche zeigten, daß es gelingt, Tauben mit Fleisch monatelang hindurch zu ernähren, ohne daß besondere Erscheinungen auftreten. Voraussetzung ist, daß genügende Mengen zugeführt werden. Bei einem Körpergewicht von 400 g erwiesen sich 30—35 g frisches Fleisch als ausreichend. Der längste Versuch dauerte 150 Tage; es traten keine besonderen Erscheinungen bei den Versuchstieren dieser Zeitspanne auf. Günstig erwies sich ein Zusatz von Kohlenhydraten bzw. einem Fettsäure-Glycerinmischung. Es konnte dann im allgemeinen auf eine Menge von 25 g Fleisch pro 400 g Körpergewicht herabgegangen werden. Der Einfluß von Fett war in keinem Falle ein günstiger; es wurde im Gegenteil oft eine Gewichtsabnahme beobachtet, die erst behoben wurde, wenn die Hefe weggab. Wurden Fleischtauben, die monatelang nur Fleisch erhalten hatten, auf andere Nahrung (z. B. Reis oder Casein und Salzgemisch) umgestellt, so gingen sie auffallend rasch zugrunde. Tauben ließen sich auch mit vollkommen abgebautem Fleisch und Traubenzucker ernähren (Versuche bis zu 2 Monaten Dauer). Außer Durchfällen traten keine Störungen auf. Bemerkenswert ist, daß sich die Tauben an die vollkommen ungewohnte Fleischernährung sehr rasch gewöhnten; sie pickten bald selbständig das Fleisch auf und zogen bald der gewohnten Nahrung vor. Wurden solche Fleischtauben mit Rinderserum intramuskulär gespritzt, so gingen sie nach kurzer Zeit zugrunde, während normal ernährte Tauben am Leben blieben. Ob es sich hierbei um einen enteral herbeigeführten aphylaktischen Schock handelt, ist nicht entschieden.

Wertheimer (Halle).

Tscherkes, L.: Die Bedeutung der Vitamine im Haushalte des tierischen Körpers. I. Mitt. Die Rolle der Proteine und Kohlenhydrate bei Vitaminmangel. (*Inst. allg. u. exp. Pathol., med. Akad., Odessa.*) Biochem. Zeitschr. B. 133, H. 1/3, 75—84. 1922.

In Bestätigung älterer Angaben von Funk wird nachgewiesen, daß vitaminfrei (mit Casein, Stärke, Sonnenblumenöl und Salzgemisch) gefütterte Tauben früher und schwerer erkranken, wenn der Kohlenhydratanteil der Kost gesteigert wird. Eine ähnliche Bedeutung kommt auch dem Eiweiß der Nahrung zu: nur mit Fett gefütterte Tauben erkranken und sterben später als Tiere mit einer Zulage von Casein, und bei diesen tritt die Krankheit um so früher und heftiger auf, je mehr Casein gereicht wurde. Die theoretischen und praktischen Folgerungen, die sich aus diesen Beziehungen zwischen Vitaminmangel der Nahrung einerseits, ihrem Gehalt an Kohlenhydrat und Eiweiß andererseits ergeben, werden eingehend besprochen. Bei vitaminarmer Nahrung besteht die Gefahr darin, zu wenig Eiweiß und Kohlenhydrat zu geben und dadurch einen Zustand von Unterernährung zu erzeugen, die andere darin, durch reichliche Nahrungszufuhr Avitaminose zu bewirken. In vorläufigen Versuchen hat der Verf.

festgestellt, daß eine Taube von 250 g während 6 Monaten an der Grenze des Vitamin mangels gehalten werden kann, wenn man ihr täglich entweder eine ausreichend Kost (5 g frische und 15 g autoklavierte Gerste) oder eine vitaminarme (2 g frisch und 18 g autoklavierte Gerste) reicht. Anhangsweise wird bemerkt, daß die Zufuhr von Jod, Mangan und Silicium auf die Ausbildung der Krankheitszeichen, Lebensdauer usw. ohne Einfluß war.

Hermann Wieland (Königsberg).

Cramer, W.: On vitamin underfeeding. (Vitaminunterernährung.) (*Laboratory imp. cancer research fund, London.*) Brit. journ. of exp. pathol. Bd. 3, Nr. 6, S. 29 bis 306. 1922.

Nicht nur klinische Erfahrungen, sondern auch das Tierexperiment weisen darauf hin, daß der Organismus unter ungenügender Zufuhr von Vitamin leidet. So wurde beobachtet, daß zwischen den Ratten des Instituts, die bei der gewöhnlichen Kost (Brot und Wasser mit gekochtem Mais und Reis) gehalten wurden, und denen, die dazu eine Vitaminzulage in Form von Hefeextrakt (Marmite) und Lebertran erhielt, wesentliche Unterschiede bestanden. Die Tiere ohne Vitaminzulage waren zwar „normal“, d. h. gesund, litten nicht unter Seuchen und vermehrten sich ziemlich gut; unter Vitaminzulage trat aber eine erhebliche Förderung des Wachstums ein, und die Fortpflanzung war besser. Genauere Untersuchungen an einer Anzahl weiblicher Ratten bei gewöhnlicher Laboratoriumskost mit und ohne Vitaminzulage zeigten, daß die vitaminreich gefütterten Tiere während des Tragens erheblich an Gewicht zunehmen, im Gegensatz zu den anderen, und daß die Laktation entweder kein oder einen geringfügigen Gewichtsverlust bedingt. Die vitaminarm ernährten Tiere dagegen zeigen am Ende der Laktationsperiode ein erheblich geringeres Körpergewicht als bei der Begattung. An jungen Ratten macht sich der Einfluß der Vitamine (sonders von Vitamin A) dann in hohem Maße geltend, wenn sie auf eine von Vitamin freie Kost gesetzt werden; die an Vitamin unterernährten Tiere nehmen überhaupt nicht an Gewicht zu und gehen bald ein, während die Ratten der vitaminreich ernährten Gruppe noch lange (in dem mitgeteilten Versuch 20 Wochen) an Gewicht zunehmen. Der Verf. weist auf die Bedeutung dieser Untersuchungen sowohl für die Hygiene der Mutter und des Kindes als die Technik des Vitaminestversuchs hin.

Hermann Wieland (Königsberg).

Barton, E. A.: Vitamins in connection with infant feeding. (Vitamine in ihrer Beziehung zur Kinderernährung.) Journ. of State med. Bd. 30, Nr. 11, S. 470—479. 1922.

Vortrag, in dem die Bedeutung der neueren Ergebnisse der Vitaminforschung für die Kinderheilkunde sehr klar und verständlich besprochen wird.

Hermann Wieland

Stammers, Arthur Dighton: Feeding experiments in connection with vitamin A and B. III. Milk and the growth-promoting vitamin. IV. The vitamin A content of refined codliver oil. (Fütterungsversuche in Beziehung zu Vitaminen A und B. III. Milch und das wachstumsfördernde Vitamin. IV. Der Gehalt gereinigten Lebertrans an Vitamin A.) (*Research laboratory, Port Sunlight.*) Biochem. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 659—667. 1922.

Aus Fütterungsversuchen an Ratten, die eine längere Periode der Ernährung ohne Vitamin A überstanden hatten, aber im Wachstum erheblich zurückgeblieben waren, geht hervor, daß bei solchen Tieren auch reichliches Angebot von Vitamin A normales Wachstum nicht ermöglicht. Daß solche Ratten bei täglicher Zufuhr von 2 ccm Wintermilch an Gewicht zunehmen, scheint dem Verf. die Ergebnisse von Harkins gegenüber denen von Osborne und Mendel (vgl. diese Berichte 2, 304) zu stützen, allerdings unter der Voraussetzung, daß die beobachtete Gewichtszunahme bei jungen Ratten ohne Vorgeschichte die bei den Tieren des Verf. beobachtete Fütterung nicht zeigen sollte. Ein Unterschied zwischen medizinalem Lebertran und einem roheren, zur Verabreichung an Vieh bestimmten Präparat hinsichtlich des Gehalts an A ist in den Versuchen des Verf. nicht zu erkennen. (I. u. II. vgl. diese Berichte 2, 233.)

Hermann Wieland (Königsberg).

Funk, Casimir and Julia B. Paton: Studies on vitamins B and D. (Untersuchungen über die Vitamine B und D.) (*Biochem. laborat., Columbia univ. a. coll. of phys. a. surg., New York.*) Journ. of metabolic research Bd. 1, Nr. 6, S. 737—776. 1922.

Vitamin D ist die Bezeichnung für die Substanz, welche das Wachstum von Hefe fördern vermag; sie wird nun auch von Funk vom Vitamin B, der antineuritischen und vielleicht bei Ratten wachstumsfördernden Substanz scharf unterschieden. Die vorliegende Arbeit berichtet über eine Reihe von Versuchen, die mit Vitaminpräparaten angestellt sind; über die Herstellung und die Reinheit der Präparate werden keine Angaben gemacht; in den Tierversuchen sind zwar die Dosen als Kubikzentimeter einer Lösung angegeben, aber ohne daß die Konzentration der Lösung erwähnt wird. Tauben können bei Ernährung mit geschliffenem Reis durch Zugabe der Vitaminpräparate gesund und bei konstantem Körpergewicht gehalten werden. Der Fütterungsversuch an Tauben ist übersichtlicher, kürzer (etwa 5 Tage) als der Rattenversuch und deshalb besser geeignet, um den Vitamingehalt eines Präparats zu schätzen. Eiweiß, Casein und Eialbumin sind imstande, den minimalen Vitaminbedarf eines Tiers zu vermindern, wirken also vitaminsparend. Mit Kohlenhydrat sind klare Ergebnisse nicht erzielt worden, won deshalb nicht, weil Vermehrung dieser Stoffe in der Kost in der Regel mit einer Verminderung der Eiweißkörper einhergeht, also schon dadurch eine Vermehrung des Vitaminbedarfs eintritt. Steigerung der Vitaminzufuhr über das Optimum hat keine vermehrte Nahrungszufuhr zur Folge. Im Vitaminbedarf verschiedener Tauben bestehen wesentliche Unterschiede, die bisher nicht gedeutet werden konnten. Alkali und hitzen unter Druck zerstören Vitamin B, lassen aber, wie Versuche über das Hefewachstum zeigen, Vitamin D unverändert. Wachsende Hefe nimmt aus einer Lösung jeder Vitamine nur das Vitamin D heraus, läßt aber Vitamin B unverändert; es ist mit einer Methode gegeben, die beiden Vitamine voneinander zu trennen. *Wieland.*

Iwabuchi, Tomoji: Über Organanalysen bei experimentellem Skorbut der Meerschweinchen nebst einigen Angaben über den Blutbefund. (*Univ.-Kinderklin., Wien.*) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 30, H. 1/6, S. 65—79. 1922.

Beim experimentellen Skorbut der Meerschweinchen (Fütterung mit gekochter und auf die Hälfte eingeeengter, zum Teil nachher wieder verdünnter Vollmilch; Kontrollen dasselbe mit täglich 7—10 cem Kohlrübensaft) ist der Eiweißgehalt des Blutes refraktrometrisch bestimmt) im allgemeinen etwas, der Hämoglobingehalt stets deutlich vermindert. Die Trockensubstanz skorbutischer Tiere ist niedriger als die normaler; der Fettgehalt der Muskulatur ist vermindert; besonders auffällig ist der auf $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{6}$ herabgesetzte Fettgehalt der Nebennieren. Im Calcium- und Phosphorgehalt einiger Organe wurden geringe Abweichungen gefunden; eine Abnahme von Ca und P im Gelekt konnte entgegen den Literaturangaben bei Barlow nicht festgestellt werden.

Hermann Wieland (Königsberg).

Tisdall, Frederick F.: The calcium and phosphorus concentration in the serum of infants with mild rickets or a condition simulating mild rickets. (Die Calcium- und Phosphorkonzentration im Serum bei Kindern mit Rachitis oder mit einem Rachitis simulierenden Zustand.) (*Wards a. laborat., hosp. f. sick childr. a. dep. pediatr., univ., Toronto.*) Americ. journ. of dis. of childr. Bd. 24, Nr. 5, S. 382 is 386. 1922.

Echte Rachitis geht mit Phosphatverarmung des Serums einher. In einigen Fällen mit leichter Craniotabes und geringem Rosenkranz konnte Verf. mäßig herabgesetzte Serumkalk- und normale Serumphosphatwerte nachweisen. Er glaubt diese Fälle von der echten Rachitis abtrennen und in die Gruppe der osteoporotischen Verkalkungsstörungen einreihen zu müssen. *György (Heidelberg).*

Morinaka, Kiyoshi: Über die anorganischen Bestandteile des Körpers bei vitaminose. (*Pathol. Inst., Univ. Berlin.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 1/3, S. 63—66. 1922.

Mäuse wurden 7, 19 und 23 Tage bei einer vitaminfreien Kost aus gekochtem

geschliffenen Reis und Salzgemisch (NaCl 125, Ca lact. 50, Mg citr. 50, KCl 5) gehalten und dann mit Äther getötet. Nach Wägung wurde bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, dann verascht; in der Asche wurden Ca, Mg, K und P bestimmt. Der Wassergehalt des vitaminfrei ernährten Tiers ist prozentuell nicht verändert. Der Aschengehalt ist — infolge des Verlusts aschenarmer Weichteile — relativ vermehrt. Unter den Aschebestandteilen finden sich Ca und Mg bei den erkrankten Tieren in vermehrter Menge P ist unwesentlich, K, das eigentliche Kation der Zelle, erheblich vermindert. Der Verf. weist in diesem Zusammenhang auf die Beziehung des Kaliumions zum Kofermen der Zymase hin.

Hermann Wieland (Königsberg).

Telfer, S. V.: Studies on calcium and phosphorus metabolism. Pt. I. The excretion of calcium and phosphorus. (Untersuchungen über Calcium und Phosphorstoffwechsel. I. Teil. Die Ausscheidung von Calcium und Phosphor.) (*Med. dep., roy. hosp. f. sick children a. inst. of physiol., univ., Glasgow.*) *Quart. journ. of med.* Bd. 16 Nr. 61, S. 45—62. 1922.

Bei Ernährung mit reiner oder verdünnter Kuhmilch scheiden Kinder etwa 20 bis 30% des gesamten CaO als Kalkseifen im Stuhl aus. Ein großer Teil des aufgenommenen Ca und P wird im Darm zu Tricalciumphosphat gebunden, als solches im Stuhl ausgeschieden und ist daher unresorbierbar. Die Gesamtausscheidung von Ca und P ist ungefähr proportional der Aufnahme. Es fand sich kein Anhaltspunkt für die Annahme, daß Salze aus dem Körper in nennenswertem Maße in die Faeces ausgeschieden werden. Im Urin wird nur ein ganz kleiner Teil des Ca ausgeschieden; der Ca-Gehalt des Urins steigt nach Aufnahme saurer Salze oder bei Säurebildung im Darm. — Vom Gesamtphosphor werden von normalen Säuglingen 40% im Urin, 60% in den Faeces ausgeschieden. Bei Säurebildung nimmt die P-Ausscheidung im Urin zu und zwar ist der Anstieg der P-Ausscheidung im Urin um so größer, je größer die Menge der Fettsäure im Stuhl ist, weil Fettsäuren an Stelle des P sich an das Ca binden. Ein Überschuß von Ca-Salzen bedingt eine Mehrausscheidung von P im Stuhl; der in den Faeces ausgeschiedene P wird überhaupt als durch Bindung an das Ca zurückgehalten, nicht wieder ausgeschieden betrachtet. Bei P und fettarmer, Ca-reicher Kost kann der Urin P-frei werden. Von der Kalkseifenausscheidung hängt auch das Gewicht der Faeces ab, weil sich die Kalkseifen mechanisch mit unresorbiertem Material beladen. Ist die Nahrung sehr arm an P und an Fett, so kann im Überschuß aufgenommenes Ca als Carbonat ausgeschieden werden. Verf. glaubt nicht, daß Ca im Überschuß resorbiert und in den Darm wieder ausgeschieden wird; nur der im Urin wieder erscheinende Kalk ist vorher resorbiert. Starke Seifenbildung infolge eines Übermaßes von Fettsäuren im Darm ist vielleicht ein Zeichen einer relativen Insuffizienz der Leber.

Aron (Breslau).

Telfer, S. V.: Studies on calcium and phosphorus metabolism. Pt. II. The metabolism of calcium and phosphorus in rickets. (Untersuchungen über Calcium und Phosphorstoffwechsel. II. Teil. Der Stoffwechsel von Calcium und Phosphor bei Rachitis.) (*Med. dep., roy. hosp. f. sick children a. inst. of physiol., univ., Glasgow.*) *Quart. journ. of med.* Bd. 16, Nr. 61, S. 63—72. 1922.

Bei drei normalen mit Kuhmilch genährten Säuglingen wurde in Stoffwechselversuchen die Retention von P_2O_5 größer gefunden als der zur Knochenbildung notwendigen CaO-Menge entsprechen würde. Bei 7 rachitischen Kindern war die Retention von CaO und P_2O_5 geringer als bei den normalen, vor allem war die P_2O_5 -Retention stärker herabgesetzt als die des CaO. Die unzureichende P_2O_5 -Retention beruht nicht auf schlechterer Resorption, sondern auf ungenügender Bindung durch Calcium, das schlechter resorbiert wird. Da die Ca- und P-Bilanzen niemals negativ waren, können die Knochen bei Rachitis nicht durch Decalzifikation weich werden. Die verminderte Ca-Retention bei Rachitis kann wenigstens teilweise auf ungenügender Resorption aus dem Darm beruhen.

Aron (Breslau)

Przylecki, St. J., J. Opienska et H. Giedroyc: L'excrétion des substances azotées chez les grenouilles, à différentes températures. (Exkretion von Stickstoff bei Fröschen bei verschiedener Temperatur.) (*Laborat. de chimie physiol., univ., Varsovie.*) *Arch. internat. de physiol.* Bd. 20, H. 2, S. 207—212. 1922.

Es wird die Exkretion von Stickstoff (bestimmt als Gesamtstickstoff [Kjeldahl], Ammoniak und Harnstoff (Folin) durch die Niere, sowie durch die Haut (Gesamtstickstoff, Eiweißstickstoff, Nichteiweißstickstoff) nebst Chlorauscheidung an Fröschen Art nicht angegeben) studiert. In einen Luftstrom wird von Trockenfröschen, auch nach Einspritzung von Ammoniumcitrat, kein freies Ammoniak abgegeben. Temperaturerhöhung von 11° auf 22° steigert die N-Ausscheidung im Harn um 365%, Temperaturerhöhung von 22° auf 31° um 164%; dabei steigt die N-Konzentration von 22 mg bei 11° auf 40,1 mg bei 22°, und 66,5 mg bei 31° in 100 ccm Harn; der Gehalt an Harnstoff-N steigt von 15,3 mg % bei 11° auf 31,1 mg % bei 22°, die Gesamtausscheidung an Harnstoff-N (hier 100 g Frosch und 24 Stunden) von 1,57 mg (11°) auf 7,96 mg (22°); die gesamte Ammoniak-N-Ausscheidung steigt von 0,46 mg (11°) auf 1,22 mg, die Gesamt-N-Ausscheidung von 2,2 mg (11°) auf 10,03 mg (22°) und 26,5 mg (31°). Die Stickstoffverteilung im Harn verschiebt sich folglich mit der Temperaturerhöhung in der Richtung einer Zusammensetzung, die sich dem Menschenarn bei eiweißarmer Ernährung nähert. Durch die Haut wird Eiweiß, Harnstoff, Ammoniak, Chlor, Eisen, Schwefel, Calcium, Phosphor abgegeben. Temperaturerhöhung von 11° auf 22° steigert die Stickstoffausscheidung durch die Haut von 3,5 mg auf 9 mg für 100 g Frosch und 24 Stunden, wobei die Steigerung mit 110% den Eiweißstickstoff, mit 14% den Reststickstoff betrifft. Bei 11° scheiden die Frösche 61,4% des Gesamt-N und 40,5% des Nichteiweiß-N durch die Haut aus, bei 22° nur 36,8% resp. 14,5%. Während die Nierenausscheidung des Nichteiweißstickstoffes mit der Temperaturerhöhung von 10° um 330% steigt, geht die analoge Ausscheidung durch die Haut nur um 13% in die Höhe. Erstere wird als aktiver Sekretionsvorgang, letztere als einfache Diffusion aufgefaßt und auf diese Weise, unter Hinweis auf die Untersuchungen über die cutane CO₂-Ausscheidung beim Frosch (Krogh) der Unterschied zwischen den Temperaturkoeffizienten der Haut und Nierenausscheidung erklärt.

Parnas (Lemberg).

Delaunay, H.: L'augmentation de l'activité autolytique et aminocidogène du foie pendant le jeûne; ses rapports avec l'origine endogène des aminoacides du sang. (Die Vermehrung der autolytischen und aminosäurebildenden Kraft der Leber während des Hungers; ihr Zusammenhang mit dem endogenen Ursprung der Aminosäuren des Blutes.) *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* Bd. 87, Nr. 34, S. 1091—1093. 1922.

Nach neueren Anschauungen fließt die Eiweißnahrung den Zellen ausschließlich in Gestalt von Aminosäuren und ohne vorherige Überführung in Serumeiweiß in der Darmwand zu. Im Hunger bleibt der Aminosäuregehalt des Blutes konstant, entweder weil aminosäurespeichernde Organe ausgleichend wirken oder weil die Organe mit eigenen Beständen an Aminosäuren arbeiten. Verf. ist zu der Überzeugung gekommen, daß die Leber im Hunger Aminosäuren liefert. Er bestimmte den Gesamt- und Reststickstoffgehalt des frischen Lebergewebes, sowie die Zunahme des letzteren bei der Autolyse und berechnete daraus den „autolytischen Quotienten“, d. i. das Verhältnis des freigewordenen zum Eiweißstickstoff des Lebergewebes. Bei Hunden, die 48 Stunden gehungert haben, ist der Koeffizient ungleich größer als bei mit Fleisch gefütterten, etwa 50 gegenüber 20%. Bei Verwendung von Lebergewebe finden sich 60—70% des neuentstandenen Reststickstoffs in Form von Aminosäuren, bei den anderen Geweben, auch beim Pankreas, nur 40—50%. Man darf aus diesen Befunden an der Leber mit derselben Berechtigung auf eine regulatorische Tätigkeit dieses Organs im Aminosäurestoffwechsel schließen, wie aus Claude Bernards Untersuchungen über das Glykogen auf die zentrale Stellung der Leber im Zuckerstoffwechsel. Schmitz.

Stransky, Emil: Untersuchungen über Physiologie und Pharmakologie des Purinhaushaltes. V. Mitt. Über die Allantoinausscheidung von Kaninchen unter verschiedenen Verhältnissen und unter dem Einflusse von Giften. Nach Versuchsprotokollen von M. Yanagawa. (*Pharmakol. Inst., dtsh. Univ., Prag.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4/6, S. 434—445. 1922.

Die Bestimmung des Allantoins erfolgt nach der Titrationsmethode von Handovsky unter gleichzeitiger Kontrolle der N-Bestimmung des Allantoinquecksilberniederschlags nach Wiechowski. Dabei wurde als Nebebefund festgestellt, daß Allantoin im Harn beim Stehen sich schon nach 24 Stunden zersetzt, die Bestimmung also sofort nach Entleerung vorgenommen werden muß. Um den Einfluß der Fütterung auf die Allantoinausscheidung zu untersuchen, wurden Kaninchen teils mit Hafer, teils Wasser, teils mit Mohrrüben gefüttert, deren Gehalt an Purinbasen, Calcium und Magnesium vorher festgestellt war. Der Puringehalt des Hafers ist zwar höher als der der Rüben, aber so niedrig, daß er für die Gesamtallantoinausscheidung nicht nennenswert in Frage kommt. Dasselbe Tier schied während einer Rübenperiode ungefähr um 25% weniger Allantoin aus als bei einer Haferperiode. Die Ursache hierfür wird in dem verschiedenen Kalkgehalt des Futters gesehen. Im Hunger sinkt zunächst die Allantoinausscheidung, um später wieder anzusteigen. Abkühlung bewirkt eine gesteigerte Allantoinausschwemmung, während Tetrahydro- β -naphthylaminfieber ohne Einfluß auf sie bleibt. Schließlich wird die Wirkung einer Anzahl pharmakologischer Agenzien auf die Allantoinausscheidung untersucht und zusammen mit schon aus früheren Untersuchungen bekannten diskutiert. Eine Vermehrung findet sich beim Kaninchen nach Adrenalin, Casein, Coffein, Papaverin, Uzarin, Morphin, Blei, Arsen, beim Hund nach Adrenalin, Brombenzol, Morphin; Herabsetzung beim Kaninchen nach Calcium Atophan, beim Hund nach diesen beiden, Salicylsäure und Schilddrüse, ohne Wirkung sind Pilocarpin, Cholin, Chinin, Cyanid, Benzol, Tetrahydro- β -naphthylamin. Eine Wirkung haben also nur die Substanzen, die peripher am Sympathicus angreifen und zwar alle im Sinne einer Steigerung des Purinstoffwechsels. Bei Blei, Arsen und Brombenzol ist die Steigerung möglicherweise auf autolytischen Zellerfall zurückzuführen. (IV. Mitt.: Starkenstein, E., vgl. diese Berichte 3, 212.)

Ellinger (Heidelberg).

Stransky, Emil: Untersuchungen über Physiologie und Pharmakologie des Purinhaushaltes. VI. Mitt. Beeinflussung des Purinhaushaltes durch Karlsbader Mineralwasser. (*Pharmakol. Inst., dtsh. Univ., Prag.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4/6, S. 446—458. 1922.

Die Versuche wurden an Kaninchen und Menschen angestellt. Die Kaninchen wurden während der Versuchsperiode mit Hafer gefüttert und erhielten entweder Wasser oder Mühlbrunnen als Trinkflüssigkeit. Beim Versuch am Menschen bestanden die Kost aus: Eiern, Butter, Schweineschmalz, Mehlspeisen, Reis, Grieß, Kartoffeln, Kohl, Rüben, Obst, Weißbrot, Zwieback, Kornkaffee, zusammen 2000—2500 Calorien pro Tag. Allantoin wurde nach Handovsky unter Kontrolle des N nach Wiechowski bestimmt, die Harnsäure colorimetrisch nach Folin-Wu oder Morrie Macleod. Die Bestimmung des Purin-N erfolgte nach Cammerer-Arnstein, die des Gesamt-N nach Pregl, die des Kreatinin colorimetrisch nach Folin, die Phosphate wurden mit Uranyl mit Cochenille als Indicator titriert. Im Kote wurde das Gesamt-N nach Kjeldahl, der Purin-N nach Krüger-Schittenhelm bestimmt. Beim Menschen ruft Karlsbader Wasser eine nicht sehr erhebliche Harnsäureausschwemmung hervor, die nach einigen Tagen — wohl infolge Erschöpfung des Depots — zu Ende erreicht. Beim Kaninchen wird wahrscheinlich indirekt durch Besserung der Kalkbilanz der Purinstoffwechsel eingeschränkt, was durch Herabsetzung der Allantoinausscheidung zum Ausdruck kommt, was beim Menschen zunächst durch vermehrte Harnsäureausscheidung verdeckt wird.

Ellinger (Heidelberg)

Seuffert, R. W. und E. Sawallisch: Über den Einfluß großer, subcutan verabreichter Mengen von Ammonacetat auf den Eiweißstoffwechsel des Hundes. Beitr. Physiol. Bd. 2, H. 2/3, S. 37—42. 1922.

Fünf im Stoffwechselkäfig gehaltene Hündinnen erhielten pro Versuchsperiode 100 g gehacktes Fleisch und Wasser nach Belieben, in der Mitte der Periode 20 zw. 30 g Ammonacetat. An einem Hunde wurde ein reiner Hungerversuch durchgeführt — dieser erhielt nur 15 g Ammonacetat. Der gesammelte Harn der Tiere wurde auf N, P₂O₅ und zum Teil auf S untersucht. Bei 2 Versuchstieren trat durch die Injektion eine so schwere Schädigung auf, daß diese Versuche zur Beurteilung nicht herangezogen werden konnten. In den restierenden Versuchen konnte in keinem Falle eine sichere Eiweißersparnis nachgewiesen werden.

Krzywanek (Berlin).

Herrmann, Wilhelm: Über das Verhalten von Formamid und Ammoniumformiat im Organismus phlorhizindiabetischer Hunde. Beitr. z. Physiol. Bd. 2, H. 2/3, S. 33—36. 1922.

An nach Coolen diabetisch gemachten Hunden untersuchte Verf. die Frage, ob eine direkte Verfütterung bzw. subcutane Verabreichung von Formamid und Ammoniumformiat eine Vermehrung des Extrazuckers zur Folge habe, ob also eine Verwertung der Ameisensäure zum Zuckeraufbau stattfindet. Bei der Verabreichung von Formamid wurde ferner die Frage untersucht, ob eine Zunahme der mit Wasserdämpfen flüchtigen Säuren im Harn erfolgte. In beiden Versuchen wurde eine erhebliche Steigerung dieser Säuren gefunden, die rund 40% des Säuregehaltes der verabreichten Amidmenge betrug. Sowohl die perorale, als auch subcutane Verabreichung von Formamid lieferte nicht ganz die doppelte Menge an Extrazucker, deren Bildung aus dem Formamid mit einem Kohlenstoffatom theoretisch möglich ist. Kein so klares Bild ergaben die Ammoniumformiatversuche. Hier betrug die Menge Extrazucker das Vier-, Zwei- und Einfache der theoretisch möglichen Menge. Auf Grund dieser Ergebnisse hält Verf. eine ausschwemmende Wirkung für das Formamid erwiesen und hält diese auch für das Ammoniumformiat für das Wahrscheinliche, will aber auch die Möglichkeit einer kombinierten Wirkung (Glykoneogenie + Ausschwemmung) nicht durchaus verneinen. Krzywanek.

Fürth, Otto und Fritz Lieben: Colorimetrische Untersuchungen über das Tryptophan. VII. Mitt. Über den Tryptophanbedarf wachsender Ratten (zugleich ein Beitrag zur Frage der Cyclopoiese). (Physiol. Univ.-Inst., Wien.) Biochem. Zeitschr. Bd. 132, H. 4/6, S. 325—342. 1922.

Verf. stellen im Rahmen eines Fütterungsversuchs in der von Osborne und Mendel zuerst geübten Form eine Tryptophanbilanz für die wachsende Ratte auf. Als Eiweißnahrung diente in einem Teil der Versuche reine Trockenhefe, während diese in anderen Versuchen zum Teil durch Gelatine, Trockenmilch oder Pferdefleisch ersetzt wurde. Im übrigen war die Nahrung nach den Erfahrungen der amerikanischen Forscher zusammengestellt. Von den 8 Versuchstieren entstammten je 4 dem gleichen Wurf. Die Ratten der einen Serie wuchsen wesentlich schneller als die der anderen, jedoch wuchsen keineswegs die tryptophanreich ernährten Tiere schneller, als die mit dieser Aminosäure knapper versehenen. Der Tryptophangehalt der Rattenkörper betrug i. M. 0,23%, ist also von dem des menschlichen Körpers nicht deutlich unterschieden. Von der zugeführten Aminosäure wurde nur ein kleiner Bruchteil, etwa 3—8%, der Leibessubstanz einverleibt, der Rest fiel der Zerstörung anheim. Der Tierkörper vermag also seinen Bedarf an Tryptophan voll auf aus der Nahrung zu decken, ohne auf die Cyclopoiese angewiesen zu sein. Der nominale Tryptophanbedarf der Ratte kann, gleichviel, ob er durch Hefe, Trockenmilch oder Fleisch gedeckt wird, mit 50—90 mg pro 100 g Körpersubstanz und Woche oder 7—13 mg pro Tag und 100 g Gewicht angenommen werden. Er übertrifft den eines menschlichen Säuglings um das Doppelte, den eines Erwachsenen um das 3—6fache. Dieses Verhältnis ist von der gleichen Größe, wie das der Körperoberfläche und des Gaswechsels von Ratte und Mensch. (VI. vgl. diese Berichte 10, 340.)

Schmitz (Breslau).

Roger, H.: Le métabolisme des graisses. (Der Fettstoffwechsel.) (*Fac. de méd., Paris.*) Presse méd. Jg. 30, Nr. 92, S. 993—995. 1922.

Nach einer Übersicht über die Chemie und Physiologie der Fette bespricht Verf. seine Arbeiten über die Speicherung und Verarbeitung von Fetten in der Lunge und im Blut, die in diesen Berichten bereits ausführlich referiert sind (12, 293, 502; 13, 308). *Schmitz.*

Underhill, Frank P. and Robert Kapsinow: A study of metabolism in chloroform poisoning. (Eine Stoffwechselstudie bei Chloroformvergiftung.) (*Dep. of pharmacol. a. toxicol., Yale univ., New Haven.*) Journ. of metabolic research Bd. 2, Nr. 1, S. 57—72. 1922.

Nach einer Annahme von Graham sollen die tödlichen Vergiftungen durch Chloroform dadurch zustande kommen, daß aus dem Chloroform durch Oxydation Salzsäure freigemacht wird und diese Nekrosen, besonders in der Leber, bewirkt. Verf. prüften diese Annahme, indem sie bei Kaninchen den Gehalt des Urins an Chloriden untersuchten. Dieser sinkt nach 3 tägigem Hungern fast auf Null herab. Injiziert man dann subcutan 1 ccm CHCl_3 in 1 ccm Olivenöl pro Kilogramm Körpergewicht, so steigt der Gehalt des Harns an Chloriden nicht an, wie man nach der Annahme von Graham erwarten müßte, desgleichen nicht nach einer Äthernarkose. Dagegen läßt sich als NaCl gegebenes Chlorid auch nach einer Narkose im Harn wiederfinden. Die Annahme von Graham ist daher abzulehnen. Eine alkalische Diät hat keinen Einfluß, weder auf die Chloroformvergiftung, noch auf den Gehalt des Harns an Chloriden.

Wachholder (Breslau).

Neumann und Reinhardt: Zur Ätiologie der Lecksucht des Rindes. (*Poliklin. f. gr. Haust., tierärztl. Hochsch., Berlin.*) Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilk. Bd. 49, H. 1/3, S. 9—34. 1922.

An 6 Junggrindern wurde in einem 6 monatigen Versuch ein Meliorationswiesenheu verfüttert dessen Analyse eine geringe Alkaleszenz und hohen Rohfasergehalt ergeben hatte, das aber botanisch als gut anzusprechen war. Die Wirkung dieser einseitigen Verfütterung kennzeichnete sich im Blute durch das Auftreten anämischer Anzeichen: Die Erythrocyten das Hämoglobin, der Eisengehalt und die Viscosität nahmen ab, ebenso das Kohlensäurebindungsvermögen des Plasmas. Die Mineralanalyse des Harns ergab eine Natriumverarmung im Organismus und eine Verminderung in der täglich ausgeschiedenen Eisenmenge. Die Bestimmung von Stickstoff, Phosphorsäure, Traubenzucker, Indican und Harnsäure im Harn ergaben keine Abweichungen durch die Fütterung. Dagegen konnte nachgewiesen werden daß die einseitige Moorheufütterung nicht instande ist, den Nährstoffbedarf des tierischen Organismus dauernd zu decken.

Krzywanek (Berlin).

Aufnahme. Transport. Ausscheidung.

Sekrete. Verdauung.

Payne, W. W. and E. P. Poulton: Pressure and stretching as independent factors in the production of oesophageal pain. (Druck und Dehnung als unabhängige Faktoren bei der Erzeugung von Oesophagusschmerzen.) Journ. of physiol. Bd. 56, Nr. 6, S. LIII—LIV. 1922.

Verff. führten im Selbstversuch eine entsprechende Aufnahmevorrichtung in den Oesophagus ein und registrierten nun dessen Bewegungen unter verschiedenen Bedingungen. Schmerz wurde bei Einwirkung von Druck nur während der Zusammenziehungen der Speiseröhre empfunden, bei Dehnung nur während der Erschlaffung der Organe.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Groebbels, Franz: Neue Untersuchungen zur histologischen Physiologie der Magendrüsen. (*Physiol. Inst., Univ. Hamburg, allg. Krankenhaus, Hamburg-Eppendorf*) Münch. med. Wochenschr. Jg. 69, Nr. 47, S. 1622—1623. 1922.

Systematische Untersuchung der Fundusschleimhaut von Hund und Katze (zusammen 26 Tiere) und des Drüsenmagens einiger Vogelarten. In Plasma desselben Tieres untersucht, erscheinen bei Hund und Katze die HZ mit tropfigen Gebilde erfüllt, die BZ mattglasähnlich und mattgranulär. Ausgehend von der Feststellung P. G. Unnas, daß die HZ des Rattenmagens nur einen unspezifischen Eiweißkörper

on Unna Granoplasma oder Cytose genannt, enthält, und keine „Granula“ im Sinne der früheren Autoren, stellt Verf. die Übereinstimmung zwischen den Reagentienversuchen Unnas am alcifixierten Rattenmagen und dem Effekt der Einwirkung derselben Reagentien am Gefrierschnitt fest. Die Reagentien, welche im „Chromolyseversuch“ Unna's das Granoplasma der HZ auflösen, verändern am Gefrierschnitt die Tropfen der HZ nicht, während die Reagentien, welche im Unnaschen Versuch das Granoplasma nicht verändern, am Gefrierschnitt die Tropfen in Gestalt amorphbröcklicher Massen im Netzwerk der Zelle niederschlagen. Es handelt sich um die interkolloidale Lösungs- bzw. Fällungsform ein und derselben Substanz. Aus der Färbung der Gefrierschnitte mit Wasserblau eosin und Neutralviolet extra und Vergleich mit dem Modellversuch ergibt sich der basische Charakter der BZ, der saure der HZ. Modellversuche am Fibrinflocken, welche mit HCl bzw. NaOH vorbehandelt werden, zeigen, daß sich bezüglich der Giemsa- und May-Grünwaldfärbung die Säureflocke wie die BZ des alcifixierten Präparates, die Basenflocke wie die HZ verhält. Möglichkeit einer basischen Aufladung des BZ-Protoplasmas durch eine ionisierte Säure. Mit den Methoden Giemsa, May-Grünwald, Unna-Pappenheim läßt sich in den HZ Spongionoplasma und Granoplasma darstellen. Das Granoplasma schwindet bei der Verdauungstätigkeit des Magens und sammelt sich in der Ruhe und im Hungerzustand vom Rande der Zelle her in den HZ wieder an. Die HZ eines 1 Tag alten Hündchens erweisen sich als granoplasmafrei, bei einem 6 Tage alten Hündchen sieht man das Granoplasma von der Peripherie her in die HZ eindringen. Um die Rolle der BZ bei der HCl-Bildung zu klären, wendet Verf. auf Hunde- und Katzenmägen die von ihm bereits früher beschriebene Chloridmethode an. (Fällung der Chloride als AgCl durch neutrale bzw. schwach angesäuerte 2proz. AgNO₃-Lösung, reduziert Ag₂Cl.) Die Ergebnisse sind eindeutig. Man findet die Körnchenniederschläge nie in den HZ, stets in den BZ bei Tieren, die nicht länger gehungert haben. Hier liegen die Körnchen zentral vom Kern oder mehr um diesen zerstreut. In den Freßmägen sind die Gänge der BZ zum Hauptlumen und diese selber mit Körnchen und einer bräunlichen Gerinnungsmasse erfüllt, in den Ruhemägen nicht (Übereinstimmung mit der Golgimethode, bei der nach Verf. die Chloride irgendwie beteiligt sein müssen.) Bei 3 Katzen, die 7 bzw. 11 Tage gehungert hatten, erwiesen sich die BZ körnchenfrei. Nach Durchspülung der toten Tiere mit Ringerlösung bzw. 2proz. NaCl blieben die BZ körnchenfrei, was bezüglich des Auftretens der Körnchen in dieser Zellart auf einen vitalen Vorgang schließen läßt. Es wird angenommen, daß dem Chloridäquivalentbild NaCl zugrunde liegt. Der Drüsenmagen der Vögel zeigt ein pericelluläres Chloridäquivalentbild und im alcifixierten Präparat jede Epithelzelle aus zwei Abschnitten zusammengesetzt, einem basalen mit Spongionoplasma und Granoplasma, den HZ des Säugerfundus entsprechend, und einem lumenseitigen, mit sauren Farben färbbaren, der den Charakter der BZ des Säugerfundus trägt. Die Untersuchungen werden an anderer Stelle ausführlich beschrieben und fortgesetzt.

Groebbel (Hamburg).

Dorlencourt, H. et H. Lemaire: *Lésions glandulaires gastriques dans l'intoxication expérimentale par la pilocarpine et l'atropine-pilocarpine.* (Schädigungen der Magendrüsen bei der experimentellen Vergiftung mit Pilocarpin und Atropin-Pilocarpin.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 37, S. 1186 bis 1188. 1922.

Es werden die histologischen Veränderungen der Magendrüsen in der Gegend der großen Krümmung und am Pylorus bei Kaninchen nach intravenöser Einspritzung von 0,02 g Pilocarpinnitrat pro 1 kg Gewicht verfolgt. Dabei wird die Färbung von Kopsch (Mitochondrien und Fett), die Mucicarminfärbung von Masson und die Heidenhain'sche Eisenhämatoxylinfärbung angewandt. Es finden sich an der großen Krümmung rapid einsetzende, ausgedehnte Zellveränderungen, nämlich weitgehende fettige Degeneration der Belegzellen mit Verschwinden der Mitochondrien, Plasmolyse der Hauptzellen, der eine anfängliche Hyperplasie vorangeht und Abstoßung des schleimprodu-

zierenden Deckepithels. Der Pylorus zeigt außer geringer Volumabnahme der Zellen keine Veränderungen. Um zwischen der direkten Giftwirkung des Pilocarpins und den infolge der durch das Alkaloid bewirkten Hypersekretion entstandenen Veränderungen der Magenschleimhaut unterscheiden zu können, wird die Hypersekretion durch vorhergehende Gabe von 0,004 g Atropinsulfat pro 1 kg Gewicht unterdrückt. Es zeigt sich, daß jetzt nur die exzessive Hyperplasie der Hauptzellen das Bild beherrscht. Dadurch lassen sich die vorher beobachteten anderen Erscheinungen als toxische Pilocarpinwirkung ansprechen. Durch die antagonistische Atropinwirkung geht außer dem hervor, daß das Pilocarpin keine direkte Zellschädigung verursacht, sondern von der Zwischensubstanz zwischen Nervenendigung und Zelle aus wirkt. *R. Schoen.*

Vos, H.: Die Bestimmung des wirklichen Säuregrades und der Gesamtsäure im Mageninhalt. (*Laborat. v. physiol. chem., rijksuniv., Utrecht.*) Nederlandsche tijdschr. geneesk. Jg. 66, 2. Hälfte, Nr. 22, S. 2364—2369. 1922. (Holländisch.)

In einer größeren Zahl mit HCl versetzter Eiweiß-Albumosen- oder Peptonlösungen wurde mittels der Gaselektrode der wirkliche Säuregrad festgestellt, nebenbei durch Titration mit Günzburger Reagens als Indikator; zu gleicher Zeit wurde der gesamte Säuregehalt mit Rosolsäure als Indikator bestimmt. Phenolphthalein ist weniger brauchbar, in dem bei einigermaßen alkalischer Reaktion der Umschlag stattfindet, so daß das Alkalibindungsvermögen der amphoteren eiweißartigen Substanz zutage tritt; beim Umschlagpunkt des Phenolphthalein ist schon eine deutliche Menge des zugesetzten Alkali durch dieselbe gebunden, so daß die Zahl für den Säuregehalt zu groß werden. Günzburger Reagens wurde nach Steensma verwendet ein Tropfen des Reagens wurde im Porzellanschälchen bis zur Trockne eingengt, ein kleine Tropfen der zu prüfenden Lösung zugesetzt, aufs neue eingedunstet, der Ausschlag ist in diese Weise möglichst scharf. Bei der Rosolsäuretitration wurde die Farbe der Lösung mit einer analogen HCl-freien Lösung verglichen; es ergab sich, daß der Rosolsäurezusatz zur HCl-haltige Lösung erst nach Neutralisation des größeren Teils der Säure erfolgen soll, da sonst die Farbe nicht mit derjenigen der Kontrollösung verglichen werden kann. Der Gehalt an freier HCl diente zur Berechnung der Konzentration der H-Ionen (C_H); auch der negative Logarithmus letzterer wurde mit Hilfe des Dissoziationsgrades des HCl in den Tabellen aufgenommen (p_H). Diese p_H wurde linear für Eiweißgehalt von 1%, für Peptongehalte von 1, 2, und 4% eingezeichnet und mit den H-Elektrodenzahlen verglichen. Bei höheren Säuregraden (0,1—0,12 Gesamtsäure) waren die Abweichungen am geringsten; bei niederen Säuregraden relativ hoch. Der unfiltrierte Mageninhalt kann nach obiger Methode mit genügend Genauigkeit titrimetrisch auf seinen freien HCl-Gehalt geprüft werden, falls der Säuregrad nicht unterhalb $p_H = 2,1$ liegt. Titration mit Dimethylaminoazobenzol führt zu keinen brauchbaren Resultaten. *Zeehuizen (Utrecht).*

Jarno, Leo: Über das Antipepsin des Magensaftes. (*Hyg.-bakteriol. Inst., Budapest.*) Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 30, H. 3/4, S. 191—202. 1922.

Es wird die Hypothese aufgestellt, daß das Antipepsin des Magensaftes mit der Galle identisch ist. Galle hemmt die Fermentwirkung. Die gallensauren Salze hemmen stark, Cholsäure nur mäßig, ebenso die Lipide. Glykokoll, Leucin, Tyrosin, Alanin, Asparaginsäure und Cystin hemmen mehr oder weniger stark, die Natronsalze stärker als die freien Aminosäuren. Nur diejenigen Magensäfte wirken antipeptisch, welche Gallensäuren enthalten. Die gallensauren Salze und die Aminosäuren wirken nicht in dem Sinne antipeptisch, daß sie das Pepsin vernichten. Sie schützen das Eiweiß nur in festem Zustande, also bei der Metteschen Methode. Taurocholsaures Natrium wird zur Behandlung des Ulcus ventriculi empfohlen. *Martin Jacoby (Berlin).*

Daniélopou, D. et A. Carniol: Action de l'adrénaline sur l'estomac de l'homme. Voie intraveineuse et voie gastrique. (Der Einfluß des auf dem intravenösen oder stomachalen Wege eingeführten Adrenalins auf den menschlichen Magen.) (*II. cl. méd. de l'univ., hôp. Filantropia, Bucarest.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 27, S. 716—718. 1922.

Sehr geringe Dosen von Adrenalin (1 ccm einer Lösung von 1:500 000) führen beim Menschen auf dem Wege der Blutbahn eine erhebliche Steigerung der Magenzusammenziehungen herbei. Stärkere Dosen (5—10 mal der vorhin genannten) rufen eine Behinderung der Kontraktionen hervor, die allerdings nicht lange vor und manchmal von einer Steigerung der Hubhöhen gefolgt ist. Direkt in den Magen

ngeführtes Adrenalin (1 mg) erzeugt stets eine bemerkenswerte Steigerung der Muskel-
tätigkeit des Magens. Diese Erfahrungen lehren, daß man im Gegensatz zu dem bis-
erigen Vorgang mit der Darreichung von Adrenalin bei Magengeschwüren sehr vor-
chtig sein muß. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

**Daniélopolu, D. et A. Carniol: Action de l'atropine sur l'estomac de l'homme.
voie intraveineuse.** (Der Einfluß des auf dem intravenösen Wege eingeführten Atro-
pins auf den menschlichen Magen.) (*II. clin. méd. de l'univ., hôp. Filantropia, Bucu-
rest.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 27, S. 719—720. 1922.

Geringe Dosen von Atropin ($\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{4}$ eines Milligramms von Atropinsulfat) stei-
ern die Kontraktionsstärke der Magenmuskulatur in ganz erheblicher Weise. Große
Dosen führen eine Hemmung der Tätigkeit herbei. Im Anschluß an diese Beobach-
tungen hat sich herausgestellt, daß durch intravenöse Einführung von 0,00005 g
Atropin der Puls verlangsamt, durch mehr als 0,5 mg beschleunigt wird. Diese
Tatsache erklärt, warum geringe Dosen dieses Giftes den Magen erregen, größere
schwächen. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

**Daniélopolu, D. et A. Carniol: Action du calcium sur l'estomac de l'homme.
voie intraveineuse et voie gastrique.** (Der Einfluß des auf dem intravenösen und
stomachalen Wege eingeführten Calciums auf den menschlichen Magen.) (*II. clin.
méd. de l'univ., hôp. Filantropia, Bucarest.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.
Bd. 87, Nr. 27, S. 721—722. 1922.

Geringe auf intravenösem Wege eingeführte Dosen von CaCl_2 (im Mittel 0,01 g
steigern die Tätigkeit der Magenmuskulatur; größere (0,015—0,020 g) setzen sie ganz
erheblich herab. Das gleiche gilt bei stomachaler Einführung, nur muß man in diesem
Fall größere Dosen anwenden (0,02 bzw. bis 1 g). Diese Wirkung wird von den Verff.
erklärt, daß das Ca auf beide Anteile des vegetativen Systems einwirkt, vorwiegend
aber auf den Sympathicus. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. Br.).

**Daniélopolu, D. et A. Carniol: Action de l'ésérine sur la motilité de l'esto-
mac chez l'homme.** (Der Einfluß des Eserins auf die Tätigkeit des menschlichen
Magens.) (*II. clin. méd. de l'univ., hôp. Filantropia, Bucarest.*) Cpt. rend. des séances
de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 27, S. 722—724. 1922.

Das Eserin wirkt gleichzeitig auf den Sympathicus und Vagus. Daher kann man
zwei Phasen in seiner Wirksamkeit auf den Magen unterscheiden. Eine erste mit vor-
wiegender Sympathicuswirkung, bei der die Zusammenziehungen des Magens sich
vermindern und nahezu verschwinden, und eine zweite mit vorwiegender Vaguswirkung,
während welcher eine Steigerung der Magentätigkeit zu verzeichnen ist. *v. Skramlik*.

**Daniélopolu, D. et A. Carniol: L'élément psychique dans la motilité de l'esto-
mac chez l'homme.** (Das psychische Moment bei der Tätigkeit des menschlichen
Magens.) (*II. clin. méd. de l'univ., hôp. Filantropia, Bucarest.*) Cpt. rend. des
séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 27, S. 724—727. 1922.

Verff. zeigen, daß man auch auf psychischem Wege, z. B. durch Gerüche und Anblick
von Speisen, Kontraktionen des untätigen oder eine Verstärkung der Zusammenziehungen
des arbeitenden menschlichen Magens erzielen kann. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

**Wilson, T. Stacey: A physiological explanation of pain due to functional
disturbance of the muscles of the colon.** (Eine physiologische Erklärung des
Schmerzes, der auf eine funktionelle Störung der Muskeltätigkeit des Darmes zurück-
zuführen ist.) Brit. med. journ. Nr. 3207, S. 944—946. 1922.

Zahlreiche Fälle von Darmerkrankung haben den Autor dieser Abhandlung belehrt,
daß die Ringmuskelfasern des Darmes sich in gedehntem Zustand intensiv zusammenziehen
können, so daß das Kolon als ein Rohr mit starren Wänden imponiert. Diese abnorme Darm-
tätigkeit muß auf sympathischer Bahn mächtige Impulse zum Gehirn aussenden, die nun je
nach den Wegen, auf denen sie sich zersplittern, Anlaß zu schweren seelischen Verstimmungen

ohne Schmerzen oder zu heftigen Schmerzen bei ungetrübter Stimmung Anlaß geben, ein wechselnder Zustand, der häufig an Kranken beobachtet wird. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

Torraca, Luigi: Ricerche sperimentali sul valore delle singole arterie gastriche per la nutrizione dello stomaco. (Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der einzelnen Magenarterien für die Ernährung des Magens.) (*I. clin. chirurg., univ. Napoli.*) Ann. ital. di chirurg. Jg. 1, H. 2/3, S. 224 bis 245. 1922.

Die Experimente, die an Hunden ausgeführt wurden, haben vor allem zu dem Ergebnis geführt, daß die Aufhebung der gesamten äußeren Blutversorgung des Magens, auch wenn sie nicht gleichzeitig durch Unterbindung sämtlicher Gefäße, sondern allmählich in gewissen zeitlichen Zwischenräumen vorgenommen wird, mit der Fortdauer des Lebens nicht vereinbarlich ist. Dagegen ist jede von den Arterien, die vor der linken Seite aus dem Truncus gastrolienalis an den Magen herantreten, für sich allein instande, die Ernährung der Magenwände zu übernehmen. Dies gilt nicht in gleichen Maße für die von rechts kommenden Arterien, besonders nicht für die Arteria coronaria gastrica. Die Unterbindung des größten Teiles der Magenarterien führt falls der Tod der Tiere nicht eintritt, zu mehr oder weniger schweren und tiefgreifenden Veränderungen in der Schleimhaut; zumeist treten Hämorrhagien und Nekrosen in den oberflächlichen Schichten auf. Oft aber kommt es auch zu richtiger Geschwürsbildung, die sehr um sich greifen kann. Die schwersten Veränderungen sind mit Vorliebe längs der großen Krümmung oder in deren unmittelbarer Nähe verteilt und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auf den Pylorusanteil. Diese Erscheinung weist auf eine besondere Verzweigung der Gefäße innerhalb der Wand dieser Magengegend hin.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Brüning, F. und E. Gohrbandt: Ein Beitrag zur Pathogenese der Schmerze bei der Darmkolik und zur Sensibilität der Darmwand. (*Chirurg. Univ.-Klin., Charité, Berlin.*) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 29, H. 5/6, S. 367—387. 1922.

Die Verf. haben sich vor allem die Frage gestellt, welche Reize von der Darmschleimhaut aus Schmerzen auslösen. Von der Darmschleimhaut aus werden im Tierexperiment (Hund, Katze, Kaninchen) nur dann Schmerzen erzeugt, wenn es durch den angewandten Reiz zu heftigen Muskelkontraktionen kommt. Mechanische Reize der Schleimhaut (Reiben, Kratzen, Quetschen, Stechen und Schneiden) erwiesen sich wirkungslos. Da selbst bei den heftigsten Kontraktionen auch ausgedehnter Darmabschnitte in der Regel nicht die geringste Spannung oder Zerrung von Mesenterium entsteht, trotzdem aber sehr ausgesprochene Schmerzáußerungen von den Versuchstieren gezeigt wurden, ist der Schluß durchaus gerechtfertigt, daß die Kontraktion der Darmwand das schmerzauslösende Moment ist. Durch Erzeugung eines lokalen hyperämischen Hofes mittels Aufbringen von Senföl auf die Darmschleimhaut haben sich Verf. überzeugt, daß die Darmschleimhaut im Gegensatz zur Außenfläche der Darmwand Sensibilität besitzt.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Sammartino, Ubaldo: Beitrag zur Chemie der Leber. (*Ludwig Spiegler-Stift., Wien.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 132, N. 4/6, S. 343—351. 1922.

Verf. findet in der Leber bei der Untersuchung auf die verschiedenen Lipoidfraktionen auch ohne vorhergehende Verseifung große Mengen von freien Fettsäuren recht beträchtlichen Mengen, darunter vor allem Myristin- und Buttersäure, daneben aber auch Palmitin-, Stearin- und Ölsäure. Es spricht dafür, daß entweder die Leber-Neutralfett spaltet und die entstehenden Fettsäuren abbaut (Buttersäure) oder die freien Fettsäuren, die nach der Resorption der Synthese in der Darmwand entgangen sind, nicht auf dem Lymphwege, sondern durch das Pfortaderblut weitergeführt werden. Die Fraktionierung der Leberlipide wird ausführlich geschildert, kann jedoch im Einzelnen nicht wiedergegeben werden.

Schmitz (Breslau)

espiration. Blutgase.

Macklin, Charles C.: A note on the elastic membrane of the bronchial tree of mammals, with an interpretation of its functional significance. (Notiz über die elastische Membran des Bronchialbaums der Säugetiere mit einer Deutung seiner funktionellen Wichtigkeit.) (*Dep. of anat. of Western, univ. med. school, London, Canada.*) nat. record Bd. 24, Nr. 3, S. 119—135. 1922.

Das auffallende Netzwerk von elastischen länglichen Fasern, welche in der Tunica propria des gesamten Bronchialbaumes der Säugetiere eine Membran bildet, und die der Autor als elastische Membran des Bronchialbaumes bezeichnet hat, läßt sich aus der ischischen Trachea und den größeren Bronchien als Ganzes isolieren und so in Präparaten abheben. Die so für sich dargestellte Membran gibt ein Bild des gesamten Bronchialbaumes, und ihre Dichte entspricht ungefähr der Größe des Tubus, in dessen Wand sie gefunden wird. Sie wird also gegen das Ende der Bronchiolen sehr verdünnt und ist mit dem elastischen Gewebe der Lunge sonst verbunden. Es handelt sich um ein verzweigtes System verzweigter elastischer Röhren, die sich vom Kehlkopf bis zu den äußersten Grenzen der Luftröhrenverzweigungen ausbreiten. Jedes dieser Röhre stellt eine Achse für die Ausdehnung und Zusammenziehung der Lungensubstanz dar, und folgen diese beiden Bewegungen diesen axialen Linien. Die Zusammenziehung der Lunge also im ganzen ist so, eine Summation der Zusammenziehungen der einzelnen Röhren, so daß diese strukturelle Einheit die funktionelle Einheit erkennen läßt. Es ist ohne weiteres klar, daß der Bronchialbaum sich bei der Inspiration ausdehnt und bei der Expiration zusammenzieht, wobei die tatsächlichen Bewegungen mit der Tiefe der Inspiration zunehmen und vom oberen Ende der Trachea gegen die äußersten Verzweigungen des Bronchialbaumes immer größer werden. Die Füllung eines Abschnittes des Lungengewebes mit Luft ist verbunden mit einer Streckung dieser luftführenden Kanäle, die es versorgen. Mit einem steifen Bronchialbaum wäre diese Versorgung unmöglich. Die elastische Membran ist weitaus die dichteste Ansammlung der elastischen Fasern im ganzen Bronchialbaum, woraus hervorgeht und aus der übrigen Anordnung, daß ohne sie die Zusammenziehung der Lunge nicht mehr vollkommen möglich wäre, und sie den wichtigsten Teil dieses Mechanismus darstellt, demgegenüber das übrige elastische Gewebe der Lunge geringe Rolle spielt. Diese Annahme solcher Bewegungen des Bronchialbaumes setzt die Wichtigkeit der Idee einer (fächer-)rippentartigen Beweglichkeit des Bronchialbaums herab. Die Ausdehnung des oberen Lappens ist in Abhängigkeit von dem Hinabtreten der gesamten Lunge, woraus hervorgeht, daß die Bewegungsfreiheit der Lungenwurzel für die Beweglichkeit der Lunge, besonders an den Spitzen, von großer Wichtigkeit ist. Pathologische Vorgänge, die Drüsentuberkulose und dergleichen Adhäsionen verkrüppeln die Bewegung der Oberlappen und begünstigen so die spezielle Ausbreitung des tuberkulösen Prozesses in dieser Region. Alles, was den Bronchialbaum versteift begünstigt somit pathologische Prozesse in den von der verteilten Region abhängigen Partien.

Kolmer (Wien).

Spatz, Rudolf: Prüfung des Atemschützers „Lix“ auf seine praktische Brauchbarkeit. (*Hyg. Inst., Univ. Würzburg.*) Arch. f. Hyg. Bd. 91, H. 6, S. 277—282. 1922.

Der Atemschützer „Lix“ wird von den chemischen Werken vorm. Auer-Gesellschaft Berlin als Staubschutzmaske für gewerbliche Zwecke in den Handel gebracht. Sein wesentlicher Teil ist ein ringförmiges Filtergehäuse aus Aluminium, das in seinem Innern auswechselbare Filter aus Watte oder Flanell trägt. Die Abdichtung geschieht durch einen Lederrahmen, der sich um Nasenrücken, Wangen und Kinnbacken herumlegt. 2 Ventile sorgen dafür, daß die Ausatemluft unmittelbar ins Freie austritt, während die einströmende Luft durch das Filter streichen muß. Das Gewicht des Atemschützers ist sehr gering (56 g). Beim Tragen sind weder eine Erschwerung der Atmung noch andere erhebliche Beschwerden zu bemerken. Die Größe des Absorptionseffektes wurde durch einen mit Mennigstaub beladenen Luftstrom gemessen, wobei die zurückgehaltenen Mennigmengen maßanalytisch bestimmt wurden. Bei geeigneter Versuchsanordnung wurden 94% zurückgehalten. Der Atemschützer wird deshalb als ein praktisch gut brauchbarer Respirator bezeichnet, der geraume Zeit ohne Belästigung getragen werden kann.

Flury (Würzburg).

Goeckel, Henry J.: A mask for the alveolar air testing outfit. (Eine Maske für die Untersuchung der Alveolarluft.) *Journ. of laborat. a. clin. med.* Bd. 8, Nr. 2 S. 124. 1922.

Zur raschen klinischen Bestimmung der Alveolargasspannung mit der Marriott'schen Apparatur wird eine luftdicht um Mund und Nase abschließende Maske angegeben, welche aus einem ringförmigen Luftkissen, etwas darübergespanntem Gummistoff und einem dieselbe durchsetzenden Glasrohr improvisiert ist. Diese Maske läßt sich jeder Gesichtsförmigkeit anpassen und bedarf keiner weiteren Bedienung. R. Schoen (Königsberg).

Edwards, D. J. and May G. Wilson: An analysis of some of the factors of variability in the vital capacity measurements of children. (Eine Untersuchung über einige Faktoren, welche Schwankungen der Vitalkapazitätsmessungen bei Kindern bedingen.) (*Dep. of physiol. a. pediatr., Cornell univ. med. coll., New York.*) *Arch. of internal med.* Bd. 30, Nr. 5, S. 638—647. 1922.

Die für die Vitalkapazität erhaltenen Werte werden zu niedrig und schwanken mehr, wenn das benutzte Spirometer der ausgeatmeten Luft einen zu großen Widerstand bietet. Die Vitalkapazität steht in engerer Beziehung zur Körperlänge als zur Körperoberfläche und zum Körpergewicht. Die Schwankungen der für die Vitalkapazität erhaltenen Werte sind bei jüngeren Kindern erheblicher als bei älteren im ganzen aber nicht größer als für andere physiologische Größen. An Körpergröße kleine Kinder haben auf die Körperoberflächeneinheit bezogen, eine geringere Vitalkapazität als groß gebaute Kinder. Aron (Breslau).

Ichok: La valeur diagnostique des injections intra-trachéales du bleu de méthylène. (Die diagnostische Bedeutung der intratrachealen Einspritzungen des Methylenblaus.) (*Laborat. du prof. Besredka, inst. Pasteur, Paris.*) *Bull. méd.* Jg. 3 Nr. 12, S. 226—228. 1922.

Bei der Einspritzung des Methylenblaus in die Trachea hängt die Dauer bis zum Erscheinen des Farbstoffs im Harn von der Funktion der Lungen ab. Ausgehend von dieser Vermutung versuchte Ichok bei Kaninchen festzustellen, ob bei einer einseitigen Kompression der Lunge eine Veränderung im Zeitabschnitt zwischen der Zufuhr des Farbstoffs in die Trachea und deren Erscheinen im Harn zur Beobachtung gelangen wird.

Damit der Zeitpunkt genau bestimmt werden kann, ist es notwendig, dem auf dem Operationstische immobilisierten Kaninchen einen Dauerkatheter einzuführen. — Unter normalen Verhältnissen sieht man die grünliche Verfärbung des herausfließenden Urins nach etwa 15—25 Minuten. Die Kaninchen aber, bei denen ein künstlicher Pneumothorax angelegt wurde, zeigten eine bedeutende Verspätung der Farbstoffausscheidung, die bis zu 150 Minuten erreichen konnte. Die Lungenkompression war stets eine rechtsseitige, um der anatomischen Tatsache Rechnung zu tragen, daß der rechte Hauptbronchus weiter als der linke ist. Bei der Neigung des Operationstisches nach der rechten Seite hin und bei langsamer Einspritzung des Farbstoffs (Methylenblau 1%, — 5,0) hatte man die Sicherheit, daß die Gesamtmenge der rechten Seite zugeführt wurde.

Der Ausgang der Versuche gestattet die Annahme, daß die Beeinträchtigung der Auswirkung der Elastizität des Lungengewebes mit den anderen gestörten Faktoren der Lungenfunktion im Spiele ist, um die Beziehungen zwischen dem Blutkreislauf und der Eliminationsfähigkeit der in die Trachea eingeführten Substanzen zu modifizieren. Bei gewissen Lungenerkrankungen, besonders in Fällen mit diffusen Veränderungen des Gewebes, dauernder oder vorübergehender Natur, wäre es vielleicht möglich, durch die Beobachtung des Zeitabschnittes zwischen intratrachealer Einspritzung und Harnausscheidung Aufschluß über den Grad der herabgesetzten Funktionstüchtigkeit zu bekommen. Da die experimentelle Arbeit nur durch Nachprüfung am Menschen zur Geltung gelangen kann, gibt der Verf. eine Übersicht der verschiedenen Methoden der intratrachealen Einspritzungen. Eine genaue Bibliographie gestattet einerseits die pathologisch-anatomische und physiologische Grundlage des vorgeschlagenen diagnostischen Mittels kennenzulernen und andererseits ausführliche Angaben über das technische Vorgehen zu erfahren. Ichok (Paris).

Iut. Herz. Gefäße.

McLean, Stafford and Howard R. Craig: Congenital absence of the spleen. (Kongeltaler Mangel der Milz.) *Americ. journ. of the med. sciences* Bd. 164, Nr. 5, S. 703-712. 1922.

Bereicherung der Literatur um einen neuen Fall von angeborenem Milzdefekt; genaue Berücksichtigung der bisherigen Literatur. Er betrifft ein neugeborenes Kind, das auch sonst einfach angeborene Defekte darbot.

Eppinger (Wien).

Rautmann, Hermann: Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Milz. (*Med. Univ.-Klin., Freiburg i. Br.*) *Dtsch. med. Wochenschr.* Jg. 48, Nr. 45, 1504—1505. 1922.

Bei Kaninchen ließ sich feststellen, daß das Milzvenenblut bedeutend weniger Erythrocyten führt als das arterielle Blut; bei Hunden ließ sich ein um so größerer Unterschied erkennen, je länger die Äthernarkose auf das Tier eingewirkt hatte; nach längerer Narkose betrug die Differenz bis über 1 Million. Nach Steigerung der Erythrocytenresistenz (z. B. Phenylhydrazin) ließ sich ein solcher Unterschied nicht mehr erkennen. Das Milzvenenblut ist in der Regel lymphocytenreicher; nach intravenöser Adrenalininjektion wurde im Blute der Milzvene die Gesamtleukocytenzahl gegenüber derjenigen im Blute der Ohrvene bedeutend größer, bei gleichzeitiger, sehr erheblicher prozentueller Zunahme der Lymphocyten; ähnliches zeigte sich nach Pilocarpininjektion. Bei mit Typhusbacillen bzw. Erythrocyten vorbehandelten Tieren wies sich am 2. bzw. 3. Tage nach der Injektion das Milzvenenblut sehr viel reicher an Antikörpern als das gleichzeitig untersuchte Ohrvenenblut. Durch Adrenalininjektion ließ sich der Antikörpergehalt noch weiter in die Höhe treiben, während er bei länger dauernder Äthernarkose sehr erheblich niedriger wurde. Auf Grund dieser Experimente wird geschlossen, daß die bei Infektionskrankheiten fast konstant vorhandene Volumzunahme und strotzende Blutfülle der Milz als Ausdruck einer Hyperfunktion im Sinne einer sehr intensiven Antikörperbildung zu deuten wäre.

Eppinger (Wien).

Beccadelli, Giuseppe: Über eine neue Reaktion des Blutes. (*Inst. f. gerichtl. Med., Univ. Palermo.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 134, H. 1/4, S. 180—182. 1922.

In ein Reagensglas gibt man die zu prüfenden Blutkörperchen oder Sera (0,5 ccm); dazu kommen nacheinander 0,5 ccm 40 proz. Formaldehyd, 0,5 ccm 0,75 proz. Silbernitrat und 0,5 ccm 925 proz. NH_3 . Schütteln. Nach 3—4 Monaten ist die Reaktion eingetreten: menschliches Serum und Blut gibt eine Bernsteinfarbe, tierisches Blut Abweichungen des Gelbs. Syphilitisches menschliches Serum zeigt eine charakteristische Entfärbung. Das Wesen der Reaktion, die bei normalem Serum die Hemmung einer Entfärbung des Silberspiegels darstellt, ist dunkel.

Seligmann (Berlin).

Hammerschlag, R.: Über den Kernbau der Übergangsformen. *Folia haematol.* Bd. 28, H. 1, S. 51—86. 1922.

Hammerschlag beschreibt über 60 verschiedene Kernformen der Übergangsformen, die er durch Abbildungen illustriert; er unterscheidet 3 Gruppen: Sphärische, Polymorphe und Polynucleäre. Die Kernformen folgen im allgemeinen denselben Gesetzen der Polymorphie wie die neutrophilen und eosinophilen Leukocyten.

Groll (München).

Krumbhaar, Edward B.: Reticulosis — increased percentage of reticulated erythrocytes in the peripheral blood. (Reticulosis — vermehrte Prozentzahl retikulierter Erythrocyten im peripheren Blut.) (*Laborat. of clin. pathol., Philadelphia gen. hosp., Philadelphia.*) *Journ. of laborat. a. clin. med.* Bd. 8, Nr. 1, S. 11—18. 1922.

Krumbhaar empfiehlt zur Aufsuchung „retikulierter“ Erythrocyten Vitalfärbung mit Brilliant-Kresyl-Blau; das Reticulum ist wahrscheinlich protoplasmatischer Herkunft; das Vorhandensein retikulierter Erythrocyten bietet ein besseres Kriterium für die funktionelle Aktivität des Knochenmarks als der Nachweis von Polychromatophylie und kernhaltiger Erythrocyten. Bei Hunden kann durch Erzeugung einer Plethora (wiederholte Bluttransfusionen) ein vollständiges Verschwinden, durch Erzeugung einer hämolytischen Anämie eine Vermehrung der retikulierten Erythrocyten hervorgerufen werden. K. gibt die Mittelwerte der Anzahl retikulierter Erythrocyten bei verschiedenen Tieren sowie beim Menschen an und bespricht kurz die Befunde beim Säugling und bei verschiedenen Krankheiten.

Groll (München).

Bostrom, Ernest F.: Conditions causing an unequal distribution of erythrocytes in the bloodstream. (Bedingungen für eine ungleiche Verteilung der Erythrocyten im Blutstrom.) (*Dep. of physiol., univ. a. Bellevue hosp. med. coll., New York.*) *Americ. journ. of physiol.* Bd. 58, Nr. 1, S. 195—209. 1921.

Adrenalin, intrakardial injiziert, Asphyxie mit Leuchtgas und abdomineller Druck durch Massage, Gewichte oder Einpumpen von O_2 oder Luft in die Peritonealhöhle bewirken bei Katzen eine Vermehrung der Erythrocyten in den peripheren Gefäßen von durchschnittlich 6,6—7,2 auf 7,7—8,5 Millionen. Die Vermehrung ist jedoch nicht wie bisher angenommen, eine allgemeine; im Blut des linken Ventrikels nimmt die Zahl der roten Blutkörperchen vielmehr ab. Zur Erklärung der Erscheinung wird angenommen, daß durch eine Herabsetzung der Temperatur der Körperoberfläche (Vasoconstriction) oder durch eine Verminderung der O_2 -Versorgung der periphere Gewebe eine Zunahme der H-Ionenkonzentration in den peripheren Gefäßen zustande kommt. Durch die Zunahme der H-Ionenkonzentration verlieren die roten Blutkörperchen zum Teil wenigstens ihre negative Oberflächenladung, wonach die Zellen aneinander und an den Gefäßwänden haftenbleiben. Nach Abkühlung eines Fußes in Eiswasser nimmt die Zahl der Erythrocyten in dem betreffenden peripheren Gebiete beträchtlich zu, ebenfalls nach subcutaner Injektion einer verdünnten Lösung von saurem Natriumphosphat. Als Modellversuch wird gezeigt, daß in einer H-förmigen Röhre eine Blutkörperchensuspension in einer Mischung von $\frac{1}{10}$ -normal $NaHCO_3$ und CO_2 in einer normalen (?) Salzlösung stabil bleibt. Wenn dagegen ein Schenkel der H-Röhre abgekühlt wird, sedimentieren die Erythrocyten in diesem Schenkel. *Wachholder.*

Robertson, Oswald H. and Peyton Rous: Lasting individual differences in the resistance of normal bloods to shaking. (Bleibende individuelle Unterschiede in der Widerstandsfähigkeit normalen Blutes gegen Schütteln.) (*Rockefeller inst., New York.*) *Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med.* Bd. 20, Nr. 1, S. 37—38. 1922.

Die Zerstörung der roten Blutkörperchen vollzieht sich zum Teil durch Fragmentation während des Kreislaufs. Das Verhalten von Blutkörperchenaufschwemmung in vitro gegen länger dauerndes Schütteln wird zum Maß der Widerstandsfähigkeit gegen diese Aufsplitterung genommen. Es zeigen sich sehr große Unterschiede im Verhalten der roten Blutzellen verschiedener Tierarten. Bei gleich langem Schütteln werden aus Rattenblutkörperchen 10—25% des Hämoglobins durch Zerstörung frei, aus dem von Kaninchen nur 4%, von Affen 1%, von Menschen nur eine Spur. Aber auch innerhalb der gleichen Spezies zeigen sich beträchtliche Unterschiede; z. B. schwankt die Abgabe von Hämoglobin im gleich zusammengesetzten Blut von 20 gesunden Kaninchen bei gleicher Vorbehandlung zwischen 1,2 und 5,4%. Alle Blutproben verhielten sich im Gegensatz dazu gegen spezifische Hämolsine völlig gleichartig. Auch die Resistenz gegen hypotonische Salzlösungen zeigte nur unbedeutende Verschiedenheiten. Die Widerstandsfähigkeit gegen Schütteln bleibt bei einer Beobachtungszeit von 43 Tagen unverändert; Alter, Gewicht, Geschlecht, geringe Schwankungen in Gehalt des Blutes an Erythrocyten und Hämoglobin sind ohne Einfluß. Die inneren Organe, besonders die Milz der Tiere mit verschiedener Resistenz, zeigten keine Unterschiede. Klinische Schlüsse lassen sich zunächst aus dem Verhalten der Blutkörperchen gegen Schütteln nicht ziehen.

R. Schoen (Königsberg)

Höber, Rudolf und Rudolf Mond: Physikalische Chemie der Blutkörperchen. I. Sedimentierung. (*Physiol. Inst., Univ. Kiel.*) *Klin. Wochenschr.* Jg. 1, Nr. 49, S. 12 bis 2414. 1922.

Die Sedimentierungsbeschleunigung ist, wie schon Fåhræus annahm, in einer Linie ein capillarelektisches Phänomen. Sie beruht auf einer Entladung bzw. Ladungsverminderung der roten Blutkörperchen. Die Aufhebung der normalen Stabilität der Blutkörperchensuspension in der Schwangerschaft und bei gewissen Krankheiten stellen sich Verff. in der Weise vor, daß in der Adsorptionshülle der Blutkörperchen Globuline mehr oder weniger an die Stelle von Albumin treten, und da der isoelektrische

unkt der Globuline, also die Reaktion, bei der ihre Flockungstendenz maximal ist, er neutralen Reaktion des Blutes näher liegt als der isoelektrische Punkt des Albumins, so wächst auch bei den Blutkörperchen, die mit mehr Globulin behaftet werden, die Tendenz zur Flockung oder Agglutination. Es kommen noch Unterschiede in der Löslichkeit der drei Serumweißfraktionen (Albumin, Globulin, Fibrinogen) hinzu, aus deren Maßstab wir zweckmäßig die innere Reibung ihrer Lösungen wählen können. Die hohe Viskosität der Globulin- und Fibrinogenfraktion erhöht die Klebrigkeit der roten Blutkörperchen und begünstigt ihr Zusammenballen. *György* (Heidelberg).

Vignes, H. et P. Hermet: *Sédimentation des globules rouges et gestation.* (Sedimentierung der roten Blutkörperchen und Schwangerschaft.) *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* Bd. 87, Nr. 30, S. 952—953. 1922.

Mitteilung von in der deutschen Literatur schon lange bekannten Tatsachen. Keine neuen Gesichtspunkte. *György* (Heidelberg).

Nassau, Erich und Elisabeth Schohl: *Blutbildveränderungen im Kindesalter. Differenzierung des neutrophilen Blutbildes nach der Methode von Schilling.)* *Städt. Waisenh. u. Kinderasyl, Berlin.)* Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. 24, H. 1, S. 51—59. 1922.

Verff. versuchten die Frage zu beantworten, wie weit die Linksverschiebung des Blutbildes im Kindesalter differentialdiagnostisch verwertbar wäre. Langdauernde, unspezifische und spezifische (tuberkulöse) Temperatursteigerungen ließen sich aus dem Blutbild nicht unterscheiden. Ebenso wenig konnten Dünndarmkatarrhe mit vermuteter Resorption von toxischen Substanzen und banale Dünndarmkatarrhe aus dem Blutbild mit Sicherheit auseinanderhalten werden, wenn auch die Linksverschiebung bei Dünndarmkatarrhen meist die Regel war, und bei Dickdarmkatarrhen oft (aber nur in etwa 70%) fehlte. Vagotonische Bauchschmerzen (rezidivierende Nabelkolik Moros) lassen eine Linksverschiebung vermissen. Der negative Befund, d. h. das Fehlen einer Verschiebung des Blutbildes und einer neutrophilen leukocytose läßt eine entzündliche akute Erkrankung ausschließen und ermöglicht die Differentialdiagnose zwischen rein nervösen und entzündlichen Störungen (Appendicitis). *György*.

Michels, N.-A.: *Sur l'origine des granulations éosinophiles.* (Die Entstehung der eosinophilen Granulationen.) (*Laborat. d'hématol., univ. de Minnesota, Minneapolis.*) *Cpt. rend. des séances de la soc. de biol.* Bd. 87, Nr. 28, S. 795—797. 1922.

Michels hat bei *Phrynosoma coronatum*, dessen Knochenmark weder amphophile Myelocyten noch Mastmyelocyten enthält, den Ursprung der eosinophilen Granulationen untersucht und eine progressive Differenzierung in drei Stadien feststellen können, als erste Stufe überwiegend basophile Granula in basophilem Protoplasma, dann basophile und oxyphile Granula in gleicher Zahl in neutrophilem Protoplasma und endlich oxyphile Granula in der Mehrzahl im leicht acidophilen Protoplasma. M. lehnt deshalb die Theorie von Weidenreich einer exogenen Entstehung der eosinophilen Granula ab. *Groll* (München).

Mayers, Laurence Hampson: *A study of the erythrocyte curve at various ages and its relationship to hemoglobin curve.* (Studie über die Erythrocytenkurve bei verschiedenem Alter und ihre Beziehung zur Hämoglobinkurve.) *Arch. of internal med.* Bd. 30, Nr. 4, S. 478—484. 1922.

Mayers fand bei Neugeborenen einen mittleren Erythrocytenwert von 7 630 000, bei Kindern von 1 und 2 Jahren etwas höhere Zahlen als bei Erwachsenen. Die Kurve der Erythrocytenzahl geht bei Kindern bis zu 10 Jahren nicht parallel mit der Kurve des Hämoglobingehaltes pro 100 cem Blut, es dürfen also zur Berechnung des Farbedex bei Kindern unter 10 Jahren nicht die bei Erwachsenen üblichen Normalzahlen zugrunde gelegt werden, sondern es muß der für das jeweilige Alter geltende Mittelwert der Erythrocytenzahl bzw. des Hämoglobingehaltes in Rechnung gezogen werden. *Groll*.

Campbell, J. M. H.: *The relative volume of corpuscles and plasma, and the relation of this to haemoglobin percentage and the number of red blood-corpuscles.* (Relatives Erythrocytenvolumen und Plasma, Beziehung zu Hämoglobinprozentgehalt und Erythrocytenzahl.) *Brit. journ. of exp. pathol.* Bd. 3, Nr. 5, S. 217—224. 1922.

Campbell bestimmte das Volumen der Erythrocyten normalerweise zu 40%

vom Volumen des Gesamtblutes. Das Erythrocytenvolumen ändert sich direkt mit dem Hämoglobinprozentgehalt. Bei perniziöser Anämie ist das mittlere Volumen der Erythrocyten um etwa 30% vermehrt, bei sekundärer Anämie und Chlorose um 30% vermindert, bei Polycythämie unverändert. Groll (München).

Pfleiffer, R. und Hoff: Blutplättchenkurve und Menstruation. I. Mitt (*Krankenh. Wieden [Wien].*) *Zentralbl. f. Gynäkol.* Jg. 46, Nr. 44, S. 1765—1769. 1922

Untersuchungen an 18 an inneren und Nervenkrankheiten leidenden, normal und regulär menstruierenden Frauen mit normalem Blutbild. Im intermenstruellen Stadium 2tägig, zur Zeit der Blutung täglich, oft auch mehrfach täglich Bestimmungen nach der Methode von Fonio. Im allgemeinen fand sich ein Absturz der Thrombocyten mit dem Eintritt der menstruellen Blutung, so daß am 1., 2. und 3. Tag ihr Zahl $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$ der unmittelbar vorher ermittelten betrug, danach wieder Anstieg in individuell wechselnder Schnelligkeit. Ein typisches Verhalten zeigt auch das Zahlenverhältnis der großen und kleinen Thrombocyten, das sich nach Eintritt der Blutung zugunsten der ersteren verschiebt (1 : 32—34 vor 1 : 2 $\frac{1}{2}$ während der Blutung. Der Rückgang zu den gewöhnlichen Verhältnissen beginnt aber hier später als der Wiederanstieg der absoluten Thrombocytenzahl. Als Ursache dieser Schwankungen die mehr individuell gesetzmäßig als von allgemeiner Gültigkeit ist — so ist z. B. auch der Ausgangswert der Thrombocyten ein individuell wechselnder —, kommt nicht der Blutverlust in Betracht, wie Versuche mit kleinen Blutentziehungen an Männern (50 g pro die) lehrten. Vielmehr ist die Schwankung der Thrombocyten eine Teilerscheinung der im Gesamtorganismus durch den als Menstruation bezeichneten Vorgang bewirkten Veränderungen aufzufassen. Seitz (Gießen).^{oo}

Fenn, Wallace O.: The adhesiveness of leucocytes to solid surfaces. (I. Klebrigkeit von Leukocyten an festen Oberflächen.) (*Laborat. of applied physics Harvard med. school, Boston.*) *Journ. of gen. physiol.* Bd. 5, Nr. 2, S. 143—167. 19

Methode: Die Leukocyten wurden in früher geschilderter Weise durch Injektion von Aleuronat in die Bauchhöhle von Ratten gewonnen (vgl. diese Berichte 8 und 9). Auf glatten Objektträgern wurden zylindrische Gefäße mit 1—2 cm Durchmesser und von 2—4 cm Höhe fixiert. Dementsprechend war das Volumen der angewandten Zellsuspension, deren Höhe jeweils ca. 0,5 cm betrug, variiert. Auf einen Kubikzentimeter kamen gewöhnlich 1000 Zellen. Die Sedimentierung betrug 1,6 cm pro Stunde und war in 20 Minuten vollständig. Das Zylindergefäß war oben durch einen mit einer Glascapillare beschickten Gummistopfen geschlossen. Nach 1 Stunde wurde Gefäß und Inhalt ca. 15 mal um seine Horizontalachse geschüttelt. Dadurch wurde ein bestimmter Prozentsatz Leukocyten vom Boden aufgewirbelt, der in der überstehenden Flüssigkeit quantitativ ermittelt wurde.

Entsprechend den früheren Ergebnissen, wonach Kohleteilchen rascher als Quarz phagocytiert werden, ist die Adhäsion der Leukocyten an Kohle eine bessere als an Glas. Der Unterschied in der Raubigkeit der Oberflächen konnte jedoch hierfür nicht allein ausschlaggebend sein. Denn in sauren Lösungen vollzieht sich die Phagocytose von Quarz schneller im Gegensatz zur Kohle. Serum vermag zwar die Phagocytose an fester Teilchen zu steigern, setzt aber die Klebrigkeit an dem untersuchten Glas und Kohle, Glimmer und Paraffin herab. Das Temperaturoptimum der Phagocytose liegt bei 37°, aber die Klebrigkeit ist manchmal bei 20° größer als bei 37° C. Eine hypotonische Natriumchloridlösung verringert in Gegenwart von Serum zwar die Phagocytose (Hamburger), steigert aber die Klebrigkeit. Dagegen sind CaCl₂, Äthylalkohol und Jodoform, die nach Hamburger die Phagocytose anregen, ohne Einfluß auf die Klebrigkeit der Leukocyten, oder setzen doch diese in nur geringem Maße herab. Somit kann nach Verf. die Auffassung einer Parallelität zwischen Phagocytose und der Ausbreitung der Zellen auf glatten Oberflächen nicht ausreichen, um die gefundenen Tatsachen befriedigend zu erklären. Kürten (Halle).

Fenn, Wallace O.: Effect of the hydrogen ion concentration on the phagocytosis and adhesiveness of leucocytes. (Die Wirkung der H⁺-Konzentration auf Phagocytose

nd Klebrigkeit von Leukocyten.) (*Laborat. of applied physiol., Harvard med. school, Boston.*) Journ. of gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 169—179. 1922.

Als Fortsetzung vorstehender Untersuchungen ist hier der Einfluß der variierten π auf die Klebrigkeit und Phagocytose geprüft. — Danach haben die weißen Blutkörperchen ihre größte Klebrigkeit im Kontakt mit Glas bei p_H 8,0 bzw. $> 8,0$ und höchst die Zellagglutination mit zunehmender H^+ -Konzentration von 8,0—6,0. — Für die Phagocytose fester Teilchen beträgt das Optimum der p_H 7,0, das vermutlich durch die Hemmung der amöboiden Bewegungen begrenzt wird. Wie früher hervor-
gehoben, liegt das Optimum für die Phagocytose von Quarz um $p_H = 6,7$ und wächst mit der Acidität, während die Klebrigkeit der weißen Blutkörperchen für Glas mit der Alkalität zunimmt.

Kürten (Halle).

Macco, G. di: Ricerche sperimentali sulla fagocitosi. XIV. Influenza dell'alcool etilico sulla fagocitosi in vitro per azione sul siero e sui leucociti. (Experimentelle Untersuchungen über die Phagocytose. XIV. Einfluß des Äthylalkohols auf die Phagocytose in vitro durch Wirkung auf Serum und Leukocyten.) (*Istit. di patol. gen., univ., Palermo.*) Haematologica Bd. 3, H. 6, S. 546—564. 1922.

Die phagocytäre Kraft von Leukocyten Typhusbacillen gegenüber wird durch Äthylalkohol bis zu einer Konzentration von 1 : 7000 geschädigt, während der Gehalt des Serums an Opsonin nur durch stärkere Alkoholkonzentrationen (bis 1 : 1000) herabgesetzt, bei Konzentrationen von 1 : 20 000 sogar etwas vermehrt wird. (Vgl. diese Berichte 14, 275.)

Wachholder (Breslau).

Frehse, Carl: Beobachtungen über Monocyten. (*Med. Klin., Heidelberg.*) Folia haematol. Bd. 28, H. 1, S. 1—6. 1922.

Frehse untersuchte die Zahl der Monocyten bei verschiedenen Krankheiten und fand hohe und sehr hohe Werte besonders bei Krankheiten, die mit Veränderung der polynucleären eutrophilen Zellen im Blut einhergehen. Es bestehen vielleicht zwischen Monocyten und myeloischem System gewisse Beziehungen, mindestens insoweit, als durch den gleichen Reiz ein vermehrtes Auftreten beider Zellarten im Blut ausgelöst werden kann. Eine Gesetzmäßigkeit im Auftreten oder Ausbleiben der Monocytose bei verschiedenen Krankheitsprozessen ergab sich nicht.

Groll (München).

Alder, Albert: Zur Morphologie der Monocyten. (*Med. Univ.-Poliklin., Zürich.*) Folia haematol. Bd. 28, H. 1, S. 45—50. 1922.

Alder teilt die Monocyten nach Kernpolymorphie und Granulation in 6 Klassen ein und zeigt, daß die verschiedenen Arten des Kerns, der Protoplasmafarbe und Granulation der Entwicklung vom Myeloblasten zur reifen Zelle entsprechen.

Groll (München).

Loeper, M. et G. Marchal: La constance de la leucogénèse intragastrique après ingestion de bouillon. (Die Konstanz des intragastrischen Leukocytenzustroms nach Aufnahme von Fleischbrühe.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 34, S. 1081—1082. 1922.

Nach der Aufnahme von Fleischbrühe findet man bei Untersuchung des Magensaftes einen reichlichen Zustrom von weißen Blutkörperchen, der bis zu 90 Minuten nach der Nahrungsaufnahme bis zu einem Maximum von 1700—1800 Zellen pro Kubikmillimeter ansteigt, dann wieder abnimmt. Der Zustrom der Leukocyten erfolgt schneller als die Magensaftsekretion und findet sich in gleicher Weise bei normaler, hyperacider und hypacider Sekretion. Während bei normaler oder Hyperacidität 80—90% der Zellen die Polynucleären ausmachen, sind bei Hyperacidität die Lymphocyten zahlreicher und kommen den Polynucleären an Zahl gleich oder übertreffen sie sogar.

Groll (München).

Loeper, M. et G. Marchal: Le rôle de la leucogénèse intragastrique dans la digestion des albumines. (Die Rolle des intragastrischen Leukocytenzustroms bei der Eiweißverdauung.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 34, S. 1083—1084. 1922.

Bei Untersuchung im Reagensglas zeigt sich, daß die Leukocyten zwar eine geringere proteolytische Wirkung auf Eiereiweiß haben als Pepsin, aber die Wirkung einer Pepsin-Salzsäuremischung sehr fördern, auch das Pepsin in dieser Mischung ersetzen können. Nach 3 Stunden hört ihre verdauende Wirkung auf, da sie selbst dann ver-

daut werden. An Stelle von HCl kann auch Milchsäure und Essigsäure die verdauende Wirkung von Pepsin oder Leukocyten fördern, wenn auch in geringerem Grade als Salzsäure.

Groll (München).

Herrel, Hermann: Das Blut der Haustiere mit neueren Methoden untersucht. III. Differentialzählungen der Lymphocyten und Monocyten im Pferde-, Rind- und Hundeblood. (*Physiol. Inst., Univ. Gießen.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physic Bd. 196, H. 5/6, S. 560—570. 1922.

An Pferden, Rindern und Hunden bestimmte Verf. zunächst die absolute Zahl der 1 cem Blut enthaltenen Leukocyten nach der Methode von Bürker und an der Hand von Ausstrichpräparaten das prozentuale Verhältnis der einzelnen Leukocytenarten; mit Hilfe einer Spezialfärbung (Indophenolblausynthese) wurde an einem Kontrollpräparat des gleichen Blutes noch besonders das Verhältnis der Lymphocyten zu den übrigen Leukocyten festgestellt. Die vom Verf. gefundenen Durchschnittszahlen von je 10 untersuchten Tieren sind in der folgenden Tabelle angeführt.

Tierart	Leukocyten in 1 cmm Blut in Tausenden	Leukocyten in Prozenten nach						
		Pappenheim					Indophenolblausynthese	
		Lymphocyten	Monocyten	Neutrophile	Eosinophile	Basophile	Lymphocyten	Übrige Leukocyten
Pferd . . .	9,75	33	4	59	4	< 1	34	66
Rind . . .	8,14	50	9	34	7	< 1	52	48
Hund . . .	10,61	23	7	63	7	< 1	24	76

Aus den Zahlenwerten geht hervor, daß die mit den beiden Methoden gefundenen Werte für die Lymphocyten praktisch gleich sind, so daß die Indophenolblausynthese eine wertvolle Kontrollmethode darstellt. Die Granula, die diese veranlassen, liegen in den Pferde- und Rindleukocyten dichter wie in den Hundeleukocyten. Monocyten- und Neutrophilengranula unterscheiden sich bei derselben Tierart nicht; die Eosinophilengranula dagegen sind besonders beim Pferde sehr viel massiger. (II.: Fritsch, diese Berichte 3, 54.) Krzywanek (Berlin).

Leger, Marcel: Insolation mortelle chez le chimpanzé et altérations morphologiques de son sang. (Tödlicher Sonnenstich beim Schimpansen und morphologische Blutveränderungen.) (*Inst. de biol. de l'A. O. F., Marseille.*) Cpt. rend. des séances de soc. de biol. Bd. 87, Nr. 28, S. 874—876. 1922.

Drei aus Versuchen bei einer Temperatur von 40,6° in voller Sonne angebundene Schimpansen starben unter ähnlichen Symptomen, wie sie beim menschlichen Sonnenstich gefunden werden. Der Blutbefund ergab Fehlen der Eosinophilen, Vermehrung der Neutrophilen und Verminderung der Lymphocyten. Die Neutrophilen zeigten deutliche Chromatolyse und Protoplasmaverflüssigung. Die Autopsie ergab nur starke Hyperämie der inneren Organe, besonders der Lungen, starke Füllung der oberflächlichen Hirngefäße und venösen Sinus.

Groll (München).

Vanýsek, F. und J. Lacina: Fibrinogen im Blute. Proteinoklasie nach Adrenalin. Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 45/46, S. 1110—1113. 1922. (Tschechisch.)

Die Autoren haben nach Leendertz und Gromelski die Verhältnisse des Fibrinogens im Blute untersucht, aber in der Mehrzahl der Fälle haben sie das Blut zentrifugiert, um nicht zu lange die Sedimentation abwarten zu müssen; um die verschiedenen Krankheiten vergleichen zu können, wurde die zweite Ablesung der Refraktion noch 6—8 Stunden vom Beginn der Entstehung des Fibrins ausgeführt. Sie finden, daß die Fibrinogenmenge bei den Leberkrankheiten (insbesondere wo Ikterus vorkommt) auffällig niedrig ist, wogegen bei den Krankheiten mit Leukocytose hohe Werte auftreten, so daß die Fibrinogenuntersuchung diagnostischen Wert besitzen kann. — Die Änderungen der Menge des Fibrinogens und der übrigen Bluteiweißstoffe durch das Adrenalin sind keinesfalls prozentuell gleich. — Nachdem der Verf. von den Autoren (F. Vanýsek) nach der Adrenalininjektion Verminderung des Fibrinogengehaltes im Blute bei den Störungen des Kohlenhydratenstoffwechsels nachgewiesen hatte, wurden jetzt neue Versuche unternommen, und es wurde sichergestellt, daß Ähnliches (so auch der Abfall der übrigen Bluteiweißstoffe) bei den Kranken vorkommt, wo nach Darreichung von größerer Zuckermenge starke Verminderung der Leukocytenzahl vorhanden ist. Die Klärung dieser Tatsache ist schwierig; es wird insbesondere an die „indirekte Hämoklasie“ durch die Fermente gedacht (mit Widal u. a.).

E. Babák (Brünn).

Pickering, John William and James Arthur Hewitt: Studies of the coagulability of the blood. Pt. II. Thrombin and antithrombins. (Studien über Blutgerinnung.)

II. Thrombin und Antithrombine.) (*Physiol. dep., Kings coll., univ., London.*) Biochem. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 587—598. 1922.

Spritzt man Katzen nach Ausschaltung der Leberfunktion intravenös große Mengen Thrombin ein, kommt es zwar nicht zu Gerinnungen, aber es beschleunigt die Gerinnung des ausfließenden Blutes. Unter diesen Bedingungen wird eine Phase verlangsamer Gerinnbarkeit, die der Übergerinnbarkeit des ausfließenden Blutes vorangeht, nicht beobachtet. Diese Resultate lassen sich mit der Annahme der Bedeutung einer Antithrombinsekretion durch die Leber nicht vereinigen. Die Gerinnung besteht in physikalischen Änderungen, welche die Stabilität der kolloidalen Komplexe des Plasma zerstören. Thrombin beschleunigt die Gerinnung, aber leitet sie nicht ein. Fügt man Thrombin zum Blut, wenn es im Stadium eines reversiblen Gels sich befindet, so bewirkt das sofort Gerinnung. Wenn man sich auf den Boden von Gratiass Annahme stellt, daß Calciumchlorid die Blutplättchen zerstört, so können doch die geringen Mengen von Blutplättchentrümmern, welche im strömenden Blut vorkommen können, nur eine nebensächliche Rolle bei der Gerinnung spielen. Die gerinnungshemmenden Substanzen entstehen erst postmortal. Mit derselben Methode, mit der Doyon aus Leber Antithrombin erhalten hat, kann man aus Hefe Antithrombin darstellen. Gegenüber Ätherextraktion verhält sich die Substanz wie das Heparin von Howell und Holt. Auch die Hydrolyse von Edestin liefert eine gerinnungshemmende Substanz. Man muß diese Substanzen allgemein als hydrolytische Spaltungsprodukte der Eiweißkörper auffassen. (I vgl. diese Berichte 13, 99.) *Martin Jacoby* (Berlin).

Leendertz, G.: Ist Serum zu quantitativen Blutuntersuchungen brauchbar? Ein Beitrag zur Kenntnis der Blutgerinnung. (*Med. Klin., Königsberg i. Pr.*) Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 140, H. 5/6, S. 279—285. 1922.

Blutserum darf man nicht ohne weiteres als Blutplasma ohne Fibrinogen auffassen. Der relative Eiweißgehalt des aus dem Vollblut gewonnenen Serums ist niedriger als der von Serum, das aus reinem Plasma für sich allein entstanden ist. Die Verdünnung des Serums bei der Blutgewinnung geschieht auf Kosten des Wassergehaltes der Blutkörperchen. Die Blutkörperchen scheinen Harnstoff nicht durchzulassen. Dementsprechend ist der Stickstoffgehalt des Plasmas größer als der des Serums. Wahrscheinlich tritt bei der Gerinnung aus den Blutkörperchen eine isotonische Lösung von Blut-salzen heraus. In der Tat ist der Gehalt an Chloriden in beiden Formen von Blutserum derselbe. Im Serum aus Vollblut ist der Rest-N geringer als der im Plasmaserum, weil sich die Verdünnung geltend macht. Vollblutserum ist also für Untersuchungen über die Zusammensetzung der Blutflüssigkeit ungeeignet. Die Werte in der Literatur sind im allgemeinen etwas zu niedrig, für Fibrinogen meistens zu hoch, wenn nicht direkt das Fibrinogen bestimmt wurde. Für die Stoffe, welche in beiden Serumarten bei nachgewiesener Wasserdifferenz in gleichem Prozentsatz enthalten sind, wie z. B. die Chloride, müssen die Blutkörperchen durchlässig sein. Darauf läßt sich eine Methode der Permeabilitätsuntersuchung aufbauen. *Martin Jacoby* (Berlin).

Feissly, R.: Etude sur l'action des extraits d'hypophyse sur la coagulation sanguine. (Wirkung der Hypophysenextrakte auf die Blutgerinnung.) Presse méd. Jg. 30, Nr. 92, S. 997—998. 1922.

Die Wirkung der Hypophysenextrakte auf die Blutgerinnung ist nicht organ-spezifisch. *Martin Jacoby* (Berlin).

Emile-Weil, P., Bocage et Isch-Wall: Les variations du temps de saignement expérimental chez la femme enceinte. (Änderungen der experimentellen Blutungszeit bei der schwangeren Frau.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 29, S. 925—927. 1922.

Die Verf. fanden die Blutungszeit (nach Duke) bei schwangeren Frauen fast regelmäßig verlängert und variabel, vollständig unabhängig von der Zahl der Blutplättchen, deren Zahl immer vermindert war (etwa 240 000 im Mittel). *Groll* (München).

Flagg, P. J.: An oxyhaemoglobinometer for the clinical measurement of cyanosis. (Ein Oxyhämoglobinometer zur klinischen Messung der Cyanose.) (*Rockefeller inst., New York.*) Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. Bd. 20, Nr. 1, S. 1—5. 1922.

Als Maß der Cyanose wird das Sättigungsdefizit des Blutes an Sauerstoff betrachtet. Da die Blutfarbe bei normalem Hämoglobingehalt direkt von dem mit Sauerstoff verbundene Hämoglobinteil abhängt, kann sie zur Messung des Grades einer vorhandenen Cyanose herangezogen werden. Als Endpunkte einer Farbskala dienen die Farben eines zu 100% mit Sauerstoff gesättigten Blutes und eines völlig sauerstofffreien Blutes; dieses wurde durch langdauernde Durchströmung mit Wasserstoff gewonnen, da Blut innerhalb der Gefäßbahn selbst nach völliger Stauung durch Abschnürung stets sauerstoffhaltig gefunden wurde. Sämtliche Graden der Cyanose zwischen den ermittelten extremen Werten entspricht ein Punkt, der nach optischen Gesetzen hergestellten Farbskala. Der durch die Haut bedingten Veränderung der Blutfarbe wird Rechnung getragen; durch rotierende Scheiben mit verschiedenen Farbskalen läßt sich ein beliebiger Farbton leicht erzielen, welcher nach dem Munsellsche System genau bestimmt wird. Das Oxyhämoglobinometer (Hämoxometer) besteht in einer Skalenreihe, welche den Oxyhämoglobingehalt des durch Haut oder Schleimhaut gesehene Blutes darstellt. Man kann daraus neben dem Gehalt an Oxyhämoglobin auch Schlüsse betreffend der oberflächlichen Zirkulation, der Blutdruckschwankungen und des Blutvolumens ziehen.

R. Schoen (Königsberg).

Meier, Klothilde: Blutreaktion und Blutkörperchenvolumen. (*Med. Klin., Universität Greifswald.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 1/3, S. 67—74. 1922.

Die mitgeteilten Versuche sollen die Frage beantworten, ob die Wasserstoffzahl (h) welche die Unstetigkeit der CO_2 -Bindungskurve auslöst (Straub und Meier, Biochem. Zeitschr. 90, 305. 1918), auch die Volumkurve der Blutkörperchen beeinflusst. In in NaCl-Lösung suspendierten Blutkörperchen wurden mit HCl etwas angesäuert und nach Sättigung mit CO_2 bestimmter Spannung unter Paraffin in die Hämatokriten gegeben, deren Capillaren vorher ebenfalls mit Paraffin gefüllt waren; die h wurde mittels der Absorptionskoeffizienten der CO_2 nach Bohr berechnet. Die für das Volumen der Blutkörperchen bei verschiedener CO_2 -Spannung erhaltenen Kurven zeigen alle einen mehr oder weniger ausgeprägten Knick; während bei mehr alkalischer Reaktion das Volumen sich mit der Reaktion ändert, erfolgt bei p_H 6,45—6,55 eine Volumenzunahme der roten Blutkörperchen ohne Reaktionsänderung, die Volumkurve ist unstetig; gleichzeitig nimmt bei dieser h das CO_2 -Bindungsvermögen sehr stark zu. Es wird angenommen, daß im Verlaufe des Knicks das Auswandern von Alkali aus den Körperchen und der Einstrom von Wasser in dieselben unstetig erfolgt; daß die Viscosität des Blutes bei Säuerung zunächst allmählich und bei p_H 6,55 unstetig vermindert (Meier, vgl. diese Berichte 13, 444. 1922), so kommt die Quellungsdrift der Blutkörperchen in der Viscositätskurve nicht zum Ausdruck; der Einfluß der Dehydratisierung infolge von Entladung auf die Viscosität überwiegt den entgegengesetzten der vermehrten osmotischen Quellung.

E. Gabbe (Köln).

Atzler, Edgar und Gunther Lehmann: Untersuchungen über die Pufferungspotenz des Warmblütergewebes. (*Exp.-physiol. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol., Berlin.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 206—220. 1922.

Unter „Pufferungspotenz“ verstehen die Verf. die Fähigkeit eines Organismus, die Wasserstoffionenkonzentration der Durchströmungslösung der Blutreaktion zu nähern. Je weiter die Wasserstoffzahl der Perfusionslösung von der normalen Blutreaktion entfernt und je höher ihr Pufferungsgrad ist, umso mehr wird die Pufferungspotenz des Tieres in Anspruch genommen. Um das für eine mathematische Behandlung des Problems der Pufferungspotenz nötige Zahlenmaterial zu erhalten, wurden Durchströmungsversuche durch die hintere Körperhälfte von Kaninchen vorgenommen. Die Perfusionslösungen unterschieden sich sowohl durch ihre Wasserstoffzahl, wie auch durch ihren Pufferungsgrad. Die nach der Tierpassage erhaltene Wasserstoffzahl wurde für die einzelnen Versuchsetappen bestimmt. Es ergaben sich die gleichen Resultate, wie sie die Verf. schon in einer früheren Arbeit für den Frosch beschrieben hatten. Sodann wurde soviel $\frac{N}{100}$ -NaOH bzw. HCl zu der ursprünglichen Lösung zugesetzt, als nötig war um die gleiche Änderung wie bei

Tierpassage zu erreichen. Die mathematische Behandlung ergab für die Inanspruchnahme der Pufferungspotenz folgende Formel: $M' = Be^{-\frac{\alpha}{Vt}}$. Hierin bedeutet M' die von der Gewichtseinheit des Tieres an die Volumeneinheit der Perfusionslösung abgegebene Menge Natronlauge bzw. Salzsäure; t ist die Zeit, α und B Konstanten. Es ergibt sich, daß die Formel den beschriebenen Vorgang sehr gut wiedergibt. Die Konstanten stehen in enger Beziehung zum Pufferungsgrad der Lösung und zur Pufferungspotenz des Tieres. — Der 2. Teil der Arbeit ist der experimentellen Bestimmung der Pufferungspotenz gewidmet. Die Versuche beruhen auf folgender Überlegung. — Mischt man zwei verschiedene Pufferlösungen von Ph_1 und Ph_2 mit den Pufferungsgraden Pg_1 und Pg_2 , so lehrt eine einfache Betrachtung, daß $Pg_2 = \frac{m \cdot s}{n(Ph_2 - Ph_1)}$ ist. Hierin bedeuten $\frac{m}{n}$ das Mischungsverhältnis der beiden Lösungen, Ph_3 die Wasserstoffzahl der Mischung, s die zugesetzte Säuremenge. Bringt man nun eine Lösung mit dem tierischen Gewebe in Kontakt, so verhält sich letzteres wie eine Pufferlösung vom Pufferungsgrad Pg_2 obiger Formel. Da Pg_2 nicht allein von der Konzentration der Puffersalze der Gewebsflüssigkeit, sondern auch von Einflüssen des amphoteren Eiweiß und von Adsorptionsvorgängen abhängt, so wurde für diese komplexe Größe der Ausdruck Pufferungspotenz geprägt. Zur experimentellen Inangriffnahme dieses Problems wurde die hintere Hälfte des Kaninchens mit einer abgemessenen Menge Lösung solange immer wieder durchspült, bis der Ph_3 -Wert konstant geworden war. Dann ergaben sich für die Pufferungspotenz des Tieres folgende Gesetzmäßigkeiten. Die Pufferungspotenz ist gegen Säuren etwa doppelt so groß wie gegen Laugen; das Tier besitzt also einen größeren Schutz gegen Säuerung als gegen Alkalisierung. Beim Kaltblüter ist die gleiche Gesetzmäßigkeit vorhanden, nur daß hier die Pufferungspotenz wesentlich niedriger ist. Dieser Unterschied wird darauf bezogen, daß das Säugetier mit seinem lebhaften Stoffwechsel eines vollkommeneren Apparates zur Erhaltung seiner normalen Wasserstoffionenkonzentration bedarf, also einer höheren Pufferungspotenz, als ein Tier mit trägem Stoffwechsel. Atzler (Berlin).

Atzler, Edgar und Gunther Lehmann: Untersuchungen über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Blutgefäße von Säugetieren. (*Exp.-physiol. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol., Berlin.*) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 197, H. 1/2, S. 221—234. 1922.

Es wird zunächst eine Apparatur beschrieben, welche es ermöglicht, die in der Zeiteinheit in das Blutgefäßsystem des Warmblüters eintretende Flüssigkeitsmenge zu registrieren. Die Methode beruht im Prinzip auf eine Schreibung des Seitendrucks dicht oberhalb des Eintritts der Ernährungsflüssigkeit in das Tier. Die Durchströmungsversuche wurden an urethanisierten Kaninchen vorgenommen. Sämtliche Gefäßkommunikationen zwischen Vorder- und Hintertier wurden unwegsam gemacht. Die Kanüle wurde in die Bauchorta eingebunden, und die Salzlösung konnte aus der eröffneten Vena cava inf. entweichen. Um die Ph der Durchströmungslösung zu variieren, wurden Chlorammonium-Ammoniak bzw. Acetatpuffer der Tyrodeschen Lösung, die weder Natriumbicarbonat noch Natriumphosphat enthielt, zugesetzt. Im einzelnen wurde folgendes festgestellt: Die Gefäße befinden sich in einem von der [H.] der sie durchströmenden Flüssigkeit bedingten Kontraktionszustand (physiologische Laugencontractur). Verminderung der H bedingt Gefäßkontraktion, Erhöhung Gefäßerweiterung. Steigt die H über ein gewisses Maß, so tritt eine weitere Dilatation nicht mehr ein, dagegen erfolgt bei $Ph < 4,5$ oft eine Verengung. Die kleinste Ph -Differenz, bei der eine Gefäßreaktion beobachtet wurde, war 0,21. Sind die Perfusionslösungen stark gepuffert, so sind die Gefäße gegen Ph -Änderungen empfindlicher als bei schwacher Pufferung. Chlorammonium in hoher Konzentration bewirkt unabhängig von der [H.] eine Verengung der Strombahn. Alle genannten Erscheinungen sind auch an Tieren, deren Zentralnervensystem entfernt ist, zu beobachten. Atzler.

Greenwald, Isidor: The supposed relation between alkalosis and tetany. (Die angenommene Beziehung zwischen Alkalosis und Tetanie.) (*Harriman research laboratory Roosevelt hosp., New York.*) Journ. of biol. chem. Bd. 54, Nr. 2, S. 285—304. 1922

Die Alkalosis als auslösender Faktor der tetanischen Nervenübererregbarkeit spielt in der neueren Literatur eine größere Rolle. Die erste diesbezügliche Angabe stammt von Wilson, Stearns und Thurlow (1915), die die parathyreoprive Tetanie bei Hunden durch Säurezufuhr symptomatisch bekämpfen konnten. Dieser therapeutischen Maßnahme schreibt Verf. keine eindeutige Beweiskraft zu, da die Bekämpfung tetanischer Symptome ausser Säurezufuhr, auch durch Kalk, Strontium, Magnesium sogar durch NaCl und KCl erreicht werden kann. Die Urinalkaleszenz, die die erwähnten Autoren als Stütze ihrer These anführen, beruht nach Verf. auf einer Phosphatstauung im Blut. Sie ist nicht nur kein Zeichen einer Alkalose, im Gegenteil, ihr Auftreten läßt auf eine Acidose schließen. Die sauren Phosphate werden im Blut zurückgehalten, daher die verminderte Säureausscheidung im Urin. Auch die Änderungen in der prozentualen O-Sättigung des Blutes beruhen vermutlich auf dieser Phosphatretention im Blut und nicht auf einer erhöhten Alkaleszenz, wie sie von Wilson und seinen Mitarbeitern vermutet wird. Genannte Autoren haben nämlich nach der Formel Barcrofts gearbeitet $\frac{y}{100} = \frac{Kx^n}{1 - Kx^n}$, wo y die prozentuale O-Sättigung, x die O-Spannung in mm Hg und n eine Konstante ist, für die Barcroft den Wert 2,5 für Menschenblut angegeben hat. Auch für Hundeblut arbeiteten Wilson und seine Mitarbeiter mit der gleichen Konstante (n). Die Konstante n ist aber eine unter den verschiedenen Bedingungen äußerst stark wechselnde Größe, sie hängt nach Barcroft in erster Linie vom Salzgehalt des Milieus ab. Für die alkalischen Werte der erwähnten Autoren braucht dementsprechend nicht unbedingt die Reaktion des Blutes verantwortlich zu sein, sondern sie könnten auch mit der Phosphatvermehrung zusammenhängen. Verf. untersuchte nun die Wirkung intravenöser NaHCO_3 - und Na_2CO_3 -Injektion auf die Blutreaktion. Bei rascher Injektion starben die Hunde an Apnoe ohne Krämpfe. Die Gesamtkohlensäure stieg im Plasma enorm (Werte von 190 Volumproz. CO_2). Der p_{H} wies nur eine geringe Erhöhung von höchstens 0,23 auf. Die Blutalkalose mußte eine Zeitlang bestehen, bevor Tremor, Zuckungen beobachtet werden konnten. Mit zunehmenden Zuckungen sank der p_{H} im Plasma, und bis zum Exitus erhielt Verf. sogar saure Werte. Dabei spielte nachweisbar die Zunahme des Milchsäuregehalts im Blut eine bedeutende Rolle. Die titrierbare Alkaleszenz des Plasmas nahm in den Versuchen zuerst stark zu, dann nach Auftreten der Zuckungen stark ab. Dabei ist dem Verf. auf, daß die Titrationswerte mit Methylrot und Phenolrot weit weniger abgenommen haben als die mit Thymolphthalein als Indicator. Eine Erklärung kann Verf. für dieses merkwürdige Verhalten der Titrationsalkaleszenz nicht geben. Es werden vom Verf. sehr hohe Mengen an NaHCO_3 und Na_2CO_3 injiziert. In den mitgeteilten Versuchen (an Hunden) wurden ca. 0,7 g Na pro Kilogramm Körpergewicht einer 5proz. Lösung verabreicht. (Wenn nun Verf. seine Versuchsergebnisse auf die menschliche Pathologie anzuwenden glaubt, so muß demgegenüber betont werden, daß die Umrechnung seiner Daten auf einen Menschen mit einem Körpergewicht von 50 kg eine Dosis von 150 g NaHCO_3 — gelöst zu 3 Liter — ergibt, also innerhalb einer Stunde intravenös zu verabreichen wäre! Ref.) Der Na-Gehalt des Blutes nahm sehr stark zu, von 305 bis auf 550 (!) mg-%. Die Reaktion des entleerten Urins war stark alkalisch. Verf. vergleicht nun die Wirkung der verschiedenen Salze. Die für die Erzeugung von Krämpfen nötige Menge ist für das Bicarbonat, Chlorid, Phosphat und Sulfat des Natriums nahezu die gleiche. Nicht die „Alkalose“, sondern das Na-Ion ist der auslösende Faktor der tetanischen Krampfauslösung nach Verabreichung von Na-Salzen. Das Gefährliche liegt in der Störung des Ionenungleichgewichts. Das Natrium dringt in die Zellen ein und vergiftet sie, oder, wenn es nicht eindringt, so ändert es die Potentialdifferenz im Zellverbände.

Reaktionsänderung spielt dabei eine sekundäre Rolle. — Nach Besprechung der medikamentösen NaHCO_3 - (oder Na_2CO_3 -) Tetanie werden die Verhältnisse bei der Magen- und Atmungstetanie näher beleuchtet. Bei Magentetanie verliert der Organismus viel Säure (HCl), das CO_2 -Bindungsvermögen des Plasmas ist stark erhöht, die Blutreaktion schlägt aber nach Hastings, Murray und Murray jr. nur unerheblich gegen die alkalische Seite aus. Die Ursache der Tetanie liegt in diesem Fall im großen Cl -Verlust des Gesamtorganismus. Durch die Magensalzsäure wird viel Cl dem Organismus entzogen. Die verschiedenen Tetanieformen können nicht auf die gleiche Ursache zurückgeführt werden, eine Vielheit von Störungen im Ionengleichgewicht kann eine tetanische Übererregbarkeit des neuromuskulären Apparates bedingen. Bei der Atmungstetanie ist tatsächlich eine, wenn auch nicht starke Erhöhung des p_{H} im Blute nachweisbar. Die Tetanie entsteht aber nicht infolge der Alkalosis als solcher, sondern infolge der „paradoxen Anämie“ (Haldane). Man versteht darunter die erhöhte Stabilität des Oxyhämoglobins im alkalischen Medium. Der CO_2 - O_2 -Austausch zwischen Blut und Gewebe ist erschwert, die Nervenirregbarkeit nimmt zu. Experimentelle Beweise für diese These werden nicht angeführt. György (Heidelberg).

Lecomte du Nöty, P.: Surface tension of serum. IV. Action of temperature. (Oberflächenspannung von Serum. IV. Einfluß der Temperatur.) (*Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.*) Journ. of exp. med. Bd. 36, Nr. 5, S. 547—558. 1922.

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen über die Oberflächenspannung des Serums (Vgl. diese Berichte 14, 131, 15, 6, 7.) wurde in vorliegender Arbeit der Einfluß der Temperatur untersucht. Bei reinem Serum nimmt die Oberflächenspannung bei gleichmäßiger Erhitzung bei 55° stetig ab bis zum Eintritt der Koagulation. Die Veränderungen, die das Serum zwischen der 1. bis 24. Stunde und der 24. bis 48. Stunde erleidet, sind ganz ähnliche. Folglich macht sich die Zerstörung des Komplements, welche in den ersten 2 Stunden vor sich geht, durch keine wichtige Veränderung der Oberflächenspannung bemerkbar. Da aber die Veränderungen, die durch die Zerstörung des Komplements verursacht werden, von einer solchen Größenordnung sein könnten, daß die Anwesenheit hochkonzentrierter Kolloide ihren Einfluß auf die Oberflächenspannung verhindern könnte, so wurden Versuche mit Serumverdünnungen angestellt. Es wurden Verdünnungen von 10^{-1} bis 10^{-6} hergestellt; von jeder wurde je eine Probe bei Zimmertemperatur gelassen, eine 2 Stunden bei 55° , eine 1 Stunde bei 70° und eine 5 Minuten bei 100° erhitzt. Die erste Messung wurde 3 Stunden nach Beginn des Versuches, die zweite 2 Stunden darauf, gemacht. Die bedeutendsten Veränderungen spielten sich bei 55° und 70° ab; die Kurven der Verdünnungen 10^{-1} und 10^{-2} zeigen im allgemeinen parallelen Verlauf, während die Kurven der Verdünnungen 10^{-3} , 10^{-4} und 10^{-5} scharfe, entgegengesetzte Zacken aufweisen. Die Kurven der Verdünnungen 10^{-3} und 10^{-4} zeigen gewöhnlich umgekehrten Verlauf. Es wurde der Anfangswert der Oberflächenspannung bei den Verdünnungen 10^{-1} bis 10^{-6} durch die Erhitzung praktisch nicht beeinflusst. Der Abfall, der in Abhängigkeit von der Zeit steht („time-drop“), zeigt bei Erhitzung auf 55° im allgemeinen eine Zunahme bei den Verdünnungen 10^{-1} , 10^{-2} , 10^{-3} und 10^{-4} , eine Abnahme bei 10^{-5} ; bei Erhitzung auf 100° eine Abnahme des Abfalles bei den Verdünnungen 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} und eine Zunahme bei 10m^1 . Die Ergebnisse waren schwer zu deuten. Verf. folgert, daß das Oberflächengleichgewicht bei einer Verdünnung von 10^{-4} eine Art maximaler Instabilität erreicht. Diese Erscheinung wird herangezogen zur Stützung der in früheren Arbeiten vorgebrachten Hypothese, wonach bei einer Konzentration um 10^{-4} herum eine monomolekulare Oberflächenschicht vorhanden ist, die geometrisch so angeordnet ist, daß die Summe aller einzelnen molekularen Anziehungen in dieser Schicht etwa ein Minimum darstellt. Sollten gewisse physiologische Modifikationen des Serums einen Einfluß auf die Oberflächenspannung oder ihrer Veränderung in Abhängigkeit vom Zeitfaktor ausüben, so müßte die Möglichkeit, sie zu beobachten, mithin am

größten bei einer Verdünnung von 1 : 10 000 sein. Das mikroskopische Bild eines auskristallisierten Tropfens der vorher erhitzten Verdünnungen von 1 : 10 zeigt deutliche, von der Temperatur abhängige, Veränderungen. *L. Farmer Loeb* (Berlin).

● **Bang, Ivar: Mikromethoden zur Blutuntersuchung. 4. u. 5. unveränd. Aufl.** München u. Wiesbaden: J. F. Bergmann 1922. X, 48 S.

Die neuen Auflagen der Mikromethoden zur Blutuntersuchung sind der dritte in überraschend kurzer Zeit gefolgt. Darin liegt der beste Beweis für die erfreuliche Tatsache, daß sich diese für den Physiologen und Kliniker so überaus wichtigen und für Grunde einfach zu handhabenden Verfahren immer weiteren Eingang in die Laboratorien verschaffen. Für weitere Auflagen wäre die Berücksichtigung einiger neuer Erfahrungen, z. B. derjenigen von Condorelli über die Fettbestimmung erwünscht.

Schmütz (Breslau).

Greenwald, Isidor and Joseph Gross: Some sources of error in the determination of chlorides in blood and similar material. (Einige Fehlerquellen bei der Bestimmung der Chloride in Blut und ähnlichem Material.) (*Harriman research laborat., Roosevelt hosp., New York.*) *Journ. of biolog. chem.* Bd. 54, Nr. 3, S. 589—594. 1922.

Verff. haben bei der Enteiweißung von Blut zwecks Chlorbestimmung Salpetersäure und Pikrinsäure besonders zweckmäßig gefunden. Bei Benutzung von Pikrinsäure war indessen der Chlorsilberniederschlag immer größer und gelb gefärbt. Die Farbe konnte ihm nur durch konzentrierte Salpetersäure genommen werden. Er enthält eine Beimengung, die, wie sich in näherer Untersuchung zeigte, aus einem Gemenge von Hypoxanthin- und Adeninpikrat besteht. Zum Teil beruht der Unterschied der Resultate indessen auch darauf, daß Salpetersäure Chloride unvollständig aus Blutkoagulaten extrahiert. Das Blut enthält außer Chloriden noch andere Stoffe, die durch Silber in salpetersaurer Lösung gefällt werden. Metaphosphorsäure liefert ganz ungleichmäßige Ergebnisse. In Trichloressigsäurefiltraten ist der Chlorsilberniederschlag nicht filtrabel zu erhalten. Im Filtrat der Eiweißfällung nach Richter-Quittner mit Methylalkohol und Magnesiumsulfat ist das Chlor nicht bestimmbar, da der Silberniederschlag viel fremdes Material mitreißt. In Wolframsäurefiltraten erhält man richtige Werte, das überschüssige Silber, der Chlorsilberniederschlag reißt indessen Wolframsäure mit. In den meisten Eiweißfällungen scheinen Eiweiß-Säureverbindungen zu sein, in welchen bei den Fällungsmitteln, die zu geringe Ergebnisse liefern, nicht alle Chlorwasserstoffsäure durch Fällungsmittel vertreten ist.

Schmütz (Breslau).

Goto, Kiko: On the chlorine, sulphur and phosphorus content of the blood and issues of starved animals. (Über den Chlor-, Schwefel- und Phosphorgehalt des Blutes und der Gewebe von Hungertieren.) (*Inst. of med. chem., imp. univ., Sendai.*) *Tohoku journ. of exp. med.* Bd. 3, Nr. 3/4, S. 195—205. 1922.

Das spezifische Gewicht des Blutes im Hungerzustand ist höher als normal. Der Chlorgehalt des Blutes fängt mit dem Beginn der Hungerperiode zu steigen an und erreicht sein Maximum in der Regel in 10 Tagen, daraufhin sinkt der Gehalt wieder oder bleibt auf der Höhe bis zum Ende. Diese Chlorkonzentrationszunahme kann nicht allein mit einer Konzentrierung des Blutes erklärt werden, da sonst gleichzeitig Na und Mg ansteigen müßten, was, wie früher gezeigt wurde, nicht der Fall ist. Ursache für die Chlorzunahme muß anderweitig gesucht werden (hier Hinweis auf die Mitteilung von Hülse, nach der bei dem Hungerödem das NaCl eine bedeutende Rolle spielt). Der Gesamtschwefelgehalt wurde durch Hunger wenig verändert. Der sog. „extrahierbare Schwefel“ (s. unten), den Verf. mit dem Schwefel in organischer Bindung identifizieren möchte, weist Schwankungen auf, die aber keine gesetzmäßigen Beziehungen zum Hungerzustand (Dauer, Stärke usw.) besitzen. Der Gesamtphosphorgehalt fällt langsam nach einem kurzen Anstieg, während der extrahierbare Phosphor sich gerade umgekehrt verhält. Bezüglich des Salzgehaltes der einzelnen Organe im Hungerzustand ergibt sich aus den beigegegebenen ausführlichen Tabellen, daß mehrfach recht beträchtliche Schwankungen gegenüber der Norm statthaben, gesetzmäßige Beziehungen lassen sich jedoch auch hier noch nicht erkennen.

Die Analysen sind mit bekannten Methoden ausgeführt. Cl nach Rappleye (*Journ. of biol. chem.* 33, 509. 1918), S als BaSO_4 , P als $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ nach vorangegangener Versäuerung. Ein abgewogener Teil des Blutes und der Gewebe wurde — bei gelegentlichem Umrühren — längere Zeit über verdünnter Ammoniumacetatlösung bei schwach essigsaurer Reaktion stehen ge-

assen. Langsames Erwärmen bis zum Siedepunkt des Gemisches, dann filtriert. Mehrmalige Wiederholung des Prozesses, Vereinigung der Filtrate, Einengung, Spuren von Eiweiß, die auftreten, durch Tierkohle entfernt und in den so bereiteten Auszügen der „extrahierbare“ S, P und auch Cl bestimmt.
E. Oppenheimer (Köln).

Kramer, Benjamin and Frederick F. Tisdall: The distribution of sodium, potassium, calcium and magnesium between the corpuscles and serum of human blood. (Verteilung von Na, K, Ca und Mg zwischen Erythrocyten und Serum im menschlichen Blut.) (*Dep. of pediatr., Johns Hopkins univ., Baltimore.*) *Journ. of Biol. chem.* Bd. 53, Nr. 2, S. 241—252. 1922.

Verff. untersuchten die Verteilung der Kationen zwischen Serum und Erythrocyten im menschlichen Blut mittels der von ihnen ausgearbeiteten Mikromethoden (siehe diese Berichte 8, 552). Nachdem das prozentuale Volumen der roten Blutkörperchen mittels Hämatokrit bestimmt war, wurde das Gesamtblut und das Serum auf Ca, Mg, Na und K analysiert und aus diesen Daten der Gehalt der Erythrocyten in den genannten Kationen ermittelt. Im Serum von Kindern findet sich stets konstant 335 mg Na, 19,5 mg K, 9,5—10 mg Ca und 2,3—4,0 mg Mg in 100 cem. In den Erythrocyten finden Verff. kein Na, kein Ca, nur Spuren von Mg, dagegen 410—444 mg K in 100 cem Körperchen. Die Befunde anderer Autoren werden eingehend besprochen, besonders die den Ca-Gehalt der Erythrocyten betreffenden. Berechnet man die Gesamtmenge der Kationen und der Anionen in Grammäquivalenten für Serum und Blutkörperchen, so ergibt sich ein Basenüberschuß im Serum gleich 250 cem $\frac{n}{10}$ -Base, in den Erythrocyten gleich 197 cem $\frac{n}{10}$ -Base. Dieser Überschuß, etwa 15%, dürfte durch Proteine gebunden sein.
Petow (Berlin).

Toni, Giovanni de: Metodi di dosaggio del calcio nel sangue. Controllo sperimentale del metodo di Jansen e di quello di Marriott e Howland. (Calciumbestimmung im Blute; Nachprüfung der Methoden von Jansen und Marriott-Howland.) (*Laborat. d. clin. pediatr., Padova.*) *Arch. di farmacol. sperim. e scienze aff.* Bd. 34, I. 8, S. 124—128, H. 9, S. 129—130 u. H. 10, S. 145—149. 1922.

Verf. prüfte an Calciumsalzlösungen, wie an Blutserum ohne und mit Zusatz von Extrakt die im Titel genannten Methoden. Nach Jansen fand er größte Fehler von — 6,7% in 5 cem Rinderserum mit 11,9 mg-% CaO. Dagegen konnte er nach Marriott und Howland (Colorimetrie der Entfärbung von Eisenrhodanid durch Oxalsäure) zu keinen brauchbaren Ergebnissen kommen; die Ablesung am Colorimeter blieb stets ziemlich willkürlich, so daß der größte Fehler schon bei Verwendung reiner Calciumchloridlösung 12%, bei Serum noch mehr betrug.
W. Heubner (Göttingen).

Rosenthal, Alma: Zur Methode der chemischen Blutuntersuchungen. V. Die Bestimmung des Zuckers im Blute. (*Chem. Laborat., Kaiserin Elisabeth-Spit., Wien.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 133, H. 4/6, S. 469—475. 1922.

Von den Verfahren der Zuckerbestimmung kommen für das Blut ausschließlich die Reduktionsmethoden in Betracht, die nicht nur den Traubenzucker, sondern die Gesamtheit der reduzierenden Stoffe erfassen. Außerdem haften ihnen in der Labilität des Kupferoxyduls und der Notwendigkeit des Erhitzens schwer zu beseitigende Nachteile an. Verf. hat die in diesen Berichten 4, 245 flüchtig erwähnte, sonst in Deutschland nicht bekanntgewordene Methode von Hagedorn mit einigen Abänderungen benutzt.

Bei dieser wird Kaliumferrieyanid zu Ferrieyanid reduziert und der Überschuß des Ferrisalzes jodometrisch zurücktitriert. Lösungen: 1. 1,64 g Ferrieyankali und 10,6 g Natriumcarbonat pro Liter. 2. 5 g KJ, 10 g Zinksulfat, 50 g Kochsalz in 200 cem Wasser. 3. Eisessig, 1% lösliche Stärke, $\frac{n}{200}$ -Natriumthiosulfat. Ausführung: 1 cem Blut, Plasma oder Serum wird mit Wolframsäure oder Metaphosphorsäure enteiweißt und der Niederschlag ausgewaschen, bis das Filtrat 100 cem beträgt. Man fügt 5 cem Lösung 1 hinzu und erhitzt durch Einleiten von Wasserdampf 3 Minuten lang auf 75—85°. Man läßt erkalten, setzt nach Lösung 2 zu, säuert mit Eisessig an und titriert mit der Thiosulfatlösung das ausgeschiedene Jod zurück. Aus der Differenz der im Leer- und Hauptversuch verbrauchten Thiosulfatmengen findet man das reduzierte Ferrieyankali und daraus den Zucker mit Hilfe folgender Tabelle:

Kallum-ferrioyand	Zucker	Kallum-ferrioyand	Zucker	Kallum-ferrioyand	Zucker	Kallum-ferrioyand	Zucker
0,10	0,017	0,60	0,106	1,10	0,195	1,60	0,290
0,20	0,035	0,70	0,124	1,20	0,214	1,70	0,310
0,30	0,053	0,80	0,141	1,30	0,232	1,80	0,331
0,40	0,070	0,90	0,159	1,40	0,251	1,90	0,335
0,50	0,088	1,00	0,177	1,50	0,270	2,00	0,384

Verf. hält die Glykolyse nicht für eine Fermentwirkung, sondern für die Folge einer Oxydation durch Luftsauerstoff. Sie empfiehlt deshalb, die Zuckerbestimmung sofort nach der Blutentnahme vorzunehmen, eine Praxis, die man auch dann befolgen wird, wenn man in der Glykolyse einen Übergang des Zuckers in Milchsäure sieht.

Schmitz (Breslau)

Olow, John: *Recherches sur la réduction du sang pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches.* (Untersuchungen über die Reduktion des Blutes während der Schwangerschaft, der Entbindung und dem Wochenbett.) *Acta gynecol. scandinav.* Bd. 1, H. 2, S. 169—190. 1922.

Während der letzten Zeit der Schwangerschaft findet man die Blutreduktion ungefähr ebenso hoch wie bei den Nichtgraviden. Man findet aber bei den Schwangeren eine gewisse Labilität der Reduktionsverhältnisse. Die täglichen Schwankungen sind weit ausgesprochener, besonders bei den Schwangerschaftstoxikosen. Während der Arbeit war in einigen Fällen keine Abweichung von der Norm zu finden, in der Mehrzahl der Fälle aber war die Reduktion des Blutes erhöht. Im allgemeinen fiel der beobachtete Höchstwert ungefähr mit dem Ende der Arbeit zusammen. Während des Wochenbettes sind die Schwankungen des Reduktionsvermögens des Blutes sehr beträchtliche, sowohl die täglichen wie stündlichen. Die Reduktion des Nabelvenenblutes ist fast regelmäßig geringer als die des mütterlichen Blutes zur selben Zeit. Die Steigerung des Reduktionsvermögens ist entweder auf psychische Faktoren oder auf die Abkühlung der Frau während der Geburt oder auf die Muskelarbeit zurückzuführen. Verf. bezieht sich auf die Feststellung des Referenten über die primäre Arbeitshyperglykämie, die bei der labilen Blutzuckerregulation der Graviden besonders leicht in die Erscheinung tritt.

Bürger (Kiel)

Gottschalk, A. und J. Strecker: *Zur Pathogenese und praktischen Verwertbarkeit der Schwangerschaftsglykosurie nach Kohlenhydratbelastung.* (*Med. Univ.-Franklin., Frankfurt a. M.*) *Klin. Wochenschr.* Jg. 1, Nr. 50, S. 2467—2468. 1922.

In Fortsetzung früherer Untersuchungen von Gottschalk (vgl. diese Ber. 2, 375. 1922) stellten Verff. weitere Beobachtungen über das Verhalten von Leber und Niere nach Kohlenhydratbelastung an Schwangeren innerhalb der ersten drei Monate der Gravidität an. Methodik: Morgens nüchtern 100 g Lävulos in 250 ccm Wasser. In Abständen von 20 Minuten 2 Stunden lang Blutentnahme zur Blutzuckeruntersuchung nach Bang. Urin vorher und 1, 2 und 4 Stunden nach der Lävulosegabe auf Eiweiß, Zucker und Urobilin untersucht. Auch die Schwangeren dieser Frühperiode reagierten ähnlich wie die der Spätzeit verschieden auf die Kohlenhydratbelastung: einzelne zeigten völlig normales Verhalten der zuckerverarbeitenden und zuckerretinierenden Organe, andere boten das Bild vornehmlich in der Leber lokalisierter Assimilationsinsuffizienz für zugeführte Lävulose mit nachfolgender Glykosurie; die Mehrzahl wies jedoch eine vermehrte Durchlässigkeit der Niere für diesen Zucker auf (renale Glykosurie). Mithin kann der positive Ausfall der Lävuloseprobe bei der Frühdiagnose der Schwangerschaft mitverwertet werden. Gottschalk

Fish, Pierre A.: *The comparative fat content of the portal vein as determined by the presence of fat particles with the darkfield microscope.* (Der relative Fettgehalt des Pfortaderblutes, wie er sich aus der Gegenwart von Fettpartikelchen bei der Untersuchung mit Dunkelfeldbeleuchtung ergibt.) (*Cornell univ., Ithaca.*) *Proc. of the Soc. f. exp. biol. a. med.* Bd. 20, Nr. 1, S. 62—64. 1922.

Im Chylus kann niemals die gesamte Menge des resorbierten Fettes nachgewiesen werden. Verf. untersucht mit dem Dunkelfeldmikroskop vergleichend das Blut der

Aorta, Jugularvene und Pfortader auf seinen Gehalt an kleinsten Fetttropfchen in verschiedenen Stadien der Verdauung, wobei er sich des Zählverfahrens von Gage bedient. In der Mehrzahl der Fälle ergab sich unerwarteterweise ein Mindergehalt in Pfortaderblut gegenüber dem der Aorta und Jugularis. Bei saugenden Kätzchen war die Zahl in allen drei Gefäßen ungefähr gleich; hier nahm auch im Gegensatz zu älteren Tieren die Leber eine rosa Farbe an, wenn mit Sudan III gefärbte Butter verabreicht wurde. Augenscheinlich kommt bei älteren Tieren die Leber als Fettspeicher weniger in Betracht als bei ganz jungen. Den Fehlschlag seines Versuches, Fetttropfchen in größerer Zahl in der Pfortader nachzuweisen, erklärt Verf. durch die Möglichkeit einer ultramikroskopischen Verteilung mit Hilfe der gallensauren Salze oder durch eine Wiederausscheidung von Fett in das Darmlumen. *Schmitz (Breslau).*

Newton, Eleanor B. and Alice Rohde Davis: The distribution of the combined uric acid in the corpuscles of beef blood. (Die Verteilung der gepaarten Harnsäure auf die zelligen Elemente des Rinderblutes.) (*Laborat., psychopath. hosp., a. dep. of biol. chem., Harvard med. school, Boston.*) Journ. of biol. chem. Bd. 54, Nr. 3, S. 601 bis 602. 1922.

Frisches Rinderblut wurde $\frac{1}{2}$ Stunde lang zentrifugiert und nach Abheben des Serums die Leukocytschicht isoliert. Serum und Erythrocyten wurden behandelt, wie in der vorstehend referierten Arbeit angegeben, die Leukocyten gewaschen und mit Sand und Wasser zerrieben und dann ebenfalls in gleicher Weise verarbeitet. Es wurden dann die freie und die gepaarte Harnsäure bestimmt. Es ergab sich, daß das Vorkommen der gepaarten Harnsäure auf die Erythrocyten beschränkt ist.

Schmitz (Breslau).

Newton, Eleanor B. and Alice Rohde Davis: Combined uric acid in human, horse, sheep, pig, dog and chicken blood. (Gepaarte Harnsäure im Blute von Mensch, Pferd, Schaf, Schwein, Hund und Iuhn.) (*Laborat., psychopath. hosp. a. dep. of biol. chem., Harvard med. school, Boston.*) Journ. of biol. chem. Bd. 54, Nr. 3, S. 603 bis 605. 1922.

Das Verfahren von Davis Newton und Benedict zur Isolierung des Harnsäureribolids wird auf die im Titel genannten Blutarten angewandt. Es wurden in allen Fällen positive Harnsäure- und Riboseproben erhalten, aber in den meisten Fällen keine krystallinischen Endprodukte. Das Rinderblut hat bei weitem den stärksten Gehalt an dem Ribosid, am nächsten scheint ihm das Menschenblut zu stehen. Bei den übrigen Arten finden sich nur Spuren des Körpers. *Schmitz (Breslau).*

Underhill, Frank P. and S. Clement Roth: The influence of water deprivation, pilocarpin, and histamine upon changes in blood concentration in the rabbit. (Der Einfluß von Wasserentziehung, Pilocarpin und Histamin auf die Blutkonzentration beim Kaninchen.) (*Dep. of pharmacol. a. toxicol., Yale univ., New Haven.*) Journ. of biol. chem. Bd. 54, Nr. 3, S. 607—616. 1922.

Viele klinische Symptome und Toxinwirkungen beruhen auf einer negativen Wasserbilanz des Organismus. Weil das Kaninchen manchen Faktoren weniger zugänglich ist als der Hund, wurden die Versuche am ersten Tier angestellt. Die Blutkonzentration wurde aus Hämoglobinbestimmungen nach Cohen und Smith erschlossen. Im Hungerversuch ist Entziehung von Wasser in den ersten 4—5 Tagen ohne wesentlichen Einfluß auf die Blutkonzentration. Dann erfolgt steiler Anstieg. Der Tod erfolgt oft am 10. Tage trotz vorheriger Wassergabe. Die Kurve des Gewichtsverlusts ist bei der völligen Karenz von Anfang an eine lineare. Pilocarpin ruft besonders nach einer Durstperiode eine erhebliche Steigerung der Blutkonzentration hervor (vgl. diese Berichte 9, 317). Indessen ist die Wirkung auch vom Wassergehalt der Gewebe abhängig, der durch die Fütterung früher beeinflußt wird als die Blutkonzentration. Histamin bewirkt im Gegensatz zu den Befunden am Hund keine oder nur eine geringe Änderung der Blutkonzentration (Verdünnung).

K. Fromherz (Höchst a. M.).

Adler, A. und Else Meyer: Über die bei der Bilirubinbestimmung im Serum nach Hijmans van den Bergh auftretenden Fehlerquellen und deren Beseitigung. Zugleich Angabe einer colorimetrischen Bestimmungs-Methodik ohne Vergleich-

lösung. (*Med. Univ.-Klin., Leipzig.*) *Klin. Wochenschr.* Jg. 1, Nr. 50, S. 2468 bis 2470, 1922.

Bericht über die Beseitigung von Fehlerquellen, die bei der H. v. d. Berghsche quantitativen Bilirubinreaktion im Serum — nach der Thannhauserschen Modifikation — entstehen:

Da die Bilirubinlöslichkeit in Alkohol eine sehr schlechte ist, wird vorgeschlagen, zu Herstellung der Vergleichsflüssigkeit nicht wie bisher das Chloroform zu verdampfen und den Rückstand in Alkohol aufzunehmen, da hierbei erhebliche Verluste entstehen, sondern die 2 cem Chloroformbilirubinlösung (bei geringeren Anfangsmengen auf 2 cem mit Chloroform auffüllen!) mit 9 cem Alkohol zu verdünnen und dann die Kuppelung mit 4 cem Diazoniumlösung und 5 cem konz. HCl auszuführen. Ferner wird, um die Adsorption des Bilirubin an Eiweiß bei der Alkoholfüllung auf ein Minimum herabzusetzen, in der Weise vorgegangen, daß nicht immer 2 cem Serum zur Verwendung gelangen, sondern bei starkem Bilirubingehalt geringere Ausgangsmengen $\frac{1}{2}$ oder gar $\frac{1}{4}$ cem Serum, was auch mit Nutzen für die indirekte Reaktion Anwendung finden kann.

Da reines Bilirubin im Handel nicht zu haben ist, die künstlichen Vergleichslösungen aber alle mehr oder weniger schlechte Resultate geben (vgl. Holzer und Mehner, diese Berichte 12, 498), so wird das von Adler (vgl. diese Berichte 16, 16) angegebene Colorimeter ohne Vergleichsflüssigkeit zweckmäßig für die Bilirubinbestimmung benutzt, das gerade aus obengenannten Gründen für die Zwecke der Bilirubinbestimmung ausgebaut wurde, aber natürlich auch für jede andere colorimetrische Bestimmung benutzt werden kann. Es werden zwei Eichtabellen mitgeteilt. Mit Hilfe dieser Eichtabellen ist es möglich, ohne Vergleichsflüssigkeit zu haben, mit einer dem Colorimeter beigegebenen Grauleiter und Farbfiler, Bilirubinbestimmungen auszuführen. Schließlich wird noch darauf hingewiesen, daß die Färbtönung bei dem bei der Reaktion entstehenden Azofarbstoff wohl nicht nur abhängig von der H-Ionenreaktion ist, sondern auch bestimmt wird durch den Dispersitätsgrad in verschiedenen Medien wie Chloroform und Alkohol verschieden ist. *Adler.*

Asher, Leon: Beiträge zur Physiologie der Drüsen. LIV. Mitt. Schneide Carlo: Ein Beitrag zum Nachweis von Adrenalin im arteriellen Blut der Tier (*Physiol. Inst., Univ. Bern.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 133, H. 4/6, S. 373—390, 1922.

Mit dem Nachweis von Adrenalin im arteriellen Blute beschäftigten sich schon mehrere Autoren. Asher hat die Abhängigkeit der Adrenalinabsonderung vom Nervensystem nachgewiesen und das Auftreten von Adrenalin bei der Splanchnicusreizung mit Hilfe des sog. verkürzten arteriellen Kreislaufes studiert. In jüngster Zeit wird behauptet, daß sich Adrenalin nur im Blute der Nebennierenvenen nachweisen läßt. Im arteriellen System soll kein Adrenalin vorhanden sein, da es beim Übertritt aus den Ven. suprarenales in den allgemeinen Kreislauf sehr rasch zerstört wird. Es wurde nun in vorliegender Arbeit versucht, unter möglichst physiologischen Bedingungen die Frage des Vorkommens von Adrenalin im arteriellen Blute wieder zu prüfen. Das Verfahren, welches dazu benutzt wurde, baut sich auf einigen neuen Beobachtungen von Stewart und von Meltzer auf. Stewart hat nachgewiesen, daß das Strychnin eine Ausschüttung von Adrenalin hervorruft, und zwar durch Reizung der Zentren der Nervi splanchnici. Meltzer fand, daß nach Exstirpation des Ganglion cervicale sup. die Empfindlichkeit der Pupille für Adrenalin gesteigert wird. Die Arbeitsweise war nun folgende: Das Ganglion cervicale sup. wurde beim Kaninchen auf der einen Seite entfernt. Wurde nun Strychnin injiziert, so trat Pupillenerweiterung auf der operierten Seite auf. Diese Erweiterung wird als Antwort auf die durch das Strychnin hervorgerufene Adrenalinausschüttung angesehen. Nach Durchschneidung der beiden Nervi splanchnici hatte die Strychnininjektion keine Erweiterung der Pupille auf der operierten Seite zur Folge, wohl aus dem Grunde, weil infolge Durchschneidung der Splanchnicusnerven der durch das Strychnin ausgelöste Reiz zur Nebenniere nicht gelangen konnte. — Aus dem Ergebnis dieser Versuche schließt Verf., daß sich Adrenalin im unverkürzten arteriellen Kreislauf mit Hilfe der Pupillenreaktion nachweisen läßt (LIII. vgl. diese Berichte 13, 430).

J. Abelin (Bern).

Nitzescu, I.-I.: Le passage de l'adrénalin du liquide céphalorachidien dans la circulation générale. (Der Übertritt von Adrenalin aus dem Liquor cerebrospinalis in den allgemeinen Kreislauf.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 28, S. 818—820. 1922.

Zur Beantwortung der Frage, ob Adrenalin in den allgemeinen Kreislauf überreten kann, wenn es in die Cerebrospinalflüssigkeit eingebracht wird, hat Verf. beim Hunde fortlaufend den Gehalt des Blutes an Traubenzucker und die Änderung im Bilde der Leukocyten untersucht. Das auf diese Weise dem Organismus einverleibte Adrenalin ($\frac{1}{2}$ mg pro Kilogramm Tier) erzeugt im Verlauf von $\frac{1}{2}$ Stunde schon eine Zunahme des Blutzuckergehaltes, die in den nächsten 4—6 Stunden nach der Injektion ein Maximum erreicht. In zwei Fällen war diese Hyperglykämie von Glykosurie gefolgt, die 5—7 Tage angehalten hat. Gleichzeitig mit der Steigerung des Blutzuckergehaltes geht auch eine Vermehrung der Leukocyten einher, die ihr Maximum 5 bis 7 Stunden nach der Injektion erreicht und erst nach mehr als 12 Stunden schwindet. Aus diesen Erscheinungen kann der Schluß gezogen werden, daß das in die Cerebrospinalflüssigkeit eingebrachte Adrenalin in den allgemeinen Kreislauf übertritt, aber so langsam, daß sich keine Wirkung auf den Blutdruck geltend macht. *v. Skramlik.*

Zunz, Edgard et Paul Govaerts: Effets de la transfusion de sang carotidien recueilli pendant l'excitation du splanchnique. (Die Wirkungen einer Transfusion mit Carotisblut während einer Splanchnicusreizung.) (*Inst. de thérapeut., univ., Bruxelles.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 28, S. 881—882. 1922.

Bekanntlich hat Gley stets behauptet, daß das Adrenalin auf dem Wege von der Nebennierenvene zum rechten Herzen entweder zerstört oder derartig verdünnt wird, daß es nicht mehr wirksam sein kann. Zur weiteren Stützung dieser Ansicht haben die Verf. zwei Hunde auf dem Wege der Blutbahn miteinander vereinigt, Carotis mit Femoralis. Bei dem einen wird der Blutdruck fortlaufend registriert; durch Reizung des Splanchnicus bei dem anderen Tier wird die Höhe des Blutdruckes in keiner Weise beeinflusst. Gleys Ansicht ist also offenbar richtig. *Emil v. Skramlik.*

Prasík, Bohumil K.: Adrenalin und sein Einfluß auf den Kreislauf. Časopis lékařův českých Jg. 61, Nr. 45/46, S. 1079—1110. 1922. (Tschechisch.)

Die Untersuchungen wurden an 12 (bzw. 16) Kranken ausgeführt. Sie bestanden in subcutaner Injektion von 0,6—1 ccm 1 prom. Lösung Adrenalini hydrochlorici Heisler, worauf wiederholt der Blutdruck gemessen wurde (in Intervallen von 1 bis 2 Min.); weiter wurde der Puls sowie elektrokardiographische Erscheinungen in je 3—5 Min. kontrolliert (dabei wurden die sämtlichen Methoden der Ableitung ausgeführt); außerdem hat der Autor auch die allgemeinen und die lokalen Symptome berücksichtigt. Er findet in 2 Fällen keine typische Reaktion (insbesondere Druckerhöhung, Pulsbeschleunigung), in 4 Fällen kleine Reaktion, in 3 Fällen ausgesprochene typische Reaktion, in einem Fall sehr starke Reaktion; endlich wurden 3 Fälle von Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus untersucht (und zwar ein Fall der „extrasystolischen“ Arrhythmie und 2 Fälle von „auricular fibrillation“). Auf Grund der Ergebnisse kommt der Autor zum Schlusse, daß Adrenalin beim Menschen zuweilen die Vorhofskontraktionen verstärkt, regelmäßig die Kammersystolen erhöht (durch unmittelbare Einwirkung auf den Herzmuskel bzw. auf Nervenendigungen daselbst); durch die Beeinflussung der Sympathicusendigungen wird die Pulsfrequenz vermehrt, in den Gefäßen der Extremitäten aktive Vasodilatation verursacht (sowie ihre Contractilität erhöht, was zuweilen die einzige Wirkung des Adrenalins sein kann); die Hautcapillaren werden verengt und so der Widerstand erhöht. Der Blutdruck steigt primär durch verstärkte Herztätigkeit. Der minimale Druck sinkt infolge der Erweiterung der großen Gefäße in den Extremitäten, schon zur Zeit der starken Kontraktion der Capillaren (diese Einwirkung des Adrenalins hat der Autor mittels der Lombard-Weißschen Methode verfolgt und nachgewiesen, in Übereinstimmung mit Parissius, Weiß u. a.). *E. Babák.*

Fredericq, Léon: Un liquide de perfusion pour le cœur des poissons osseux marins. (Eine Nährflüssigkeit für das Herz der marinen Knochenfische.) *Arch. internat. de physiol.* Bd. 20, H. 1, S. 111—112. 1922.

Vorschlag, als Nährflüssigkeit für das isolierte Herz der Meeresfische Meerwasser zu verdünnen oder unverdünnt zu benutzen. Beigabe eines Versuchsprotokolls. 1 Teil Meerwasser auf 2 Teile Aq. dest., spez. Gew. der Verdünnung 1009, Herz schlägt 19 Stunden.

E. Oppenheimer (Köln)

Johnstone, Paul N. and Frank H. Wakefield: On the character of the Purkinje fibers in various regions of the atrioventricular bundle. (Über den Charakter der Purkinjeschen Fasern in verschiedenen Gegenden des Atrioventrikulärbündels.) *Arch. laborat., univ. of Missouri, Columbia.* Anat. record Bd. 24, Nr. 4, S. 223—231. 1921.

Die Untersuchungen wurden an Rekonstruktionen gemacht. Die Purkinjeschen Fasern des Stammes des Bündels und des rechten und linken Schenkels ähneln sich sehr und haben auf Querschnitten eine zylindrische Gestalt. Sie sind breiter als die Fasern des Atrioventrikulärknotens, aber schmaler als die Fasern der Endausbreitungen, auch verzweigen sie sich weniger als die ersteren, aber mehr als die letzteren. An den Fasern der Endausbreitungen kann man zwei Typen unterscheiden, stabförmige und flächenhafte, die letzteren sind in den hinteren Papillarmuskeln des linken Ventrikels gefestigt.

W. Brandt (Würzburg)

Rijderik, G. van: Sur l'excitation mécanique du cœur de mammifère. (Über die mechanische Reizung des Säugetierherzens.) *(Laborat. de physiol., univ., Amsterdam.) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim.* Bd. 7, S. 76—87. 1922.

Eine mechanische Reizung des im Zustande der Chloroform-Äthernarkose gelegten Hundeherzens vermittels eines Schlages oder Stiches führt entweder zu einer einmaligen Zusammenziehung des stillstehenden Herzens (Vagusreizung) oder zu einer Extrasystole. Für den Erfolg ist es gleichgültig, ob der mechanische Reiz die Außen- oder Innenseite einer Herzabteilung trifft. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine direkte Muskelreizung.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.)

Bohnenkamp, Helmuth: Über die Wirkungsweise der Herznerven. (*Physiol. Inst., Freiburg i. Br.*) *Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol.* Bd. 196, H. 3/4, S. 275—310. 1922.

Zahlreiche Erfahrungen über das Verhalten des Skelettmuskels, besonders aus neuerer Zeit, lehren, daß die Zuckung aus einer Anzahl von Teilvorgängen zusammengesetzt ist. Der Vorgang der Erschlaffung erweist sich gegenüber dem der Zusammenziehung als etwas durchaus eigenartiges, wobei man nicht von einer Selbständigkeit reden kann, denn beide hängen innig miteinander zusammen, und zwar so, daß der Zuckungsgipfel durch denjenigen Zeitpunkt bestimmt ist, an dem sich beide Prozesse das Gleichgewicht halten. Für das Herz gelten diese Betrachtungen in noch höherem Maße, da hier als eigener Faktor die automatische Reizerzeugung hinzukommt. Aufgabe einer Theorie der Herznervatur wird es sein, bei allen Formen nervöser Beeinflussung auszusagen, welche Teilvorgänge jeweils Angriffspunkt sind und in welcher Weise sie beeinflußt werden. Verf. hat es unternommen, aus den vielen durch diese strenge Betrachtungsweise aufgerollten Problemen das der Beeinflussung der Kontraktionsform des Herzens durch Vagus- und Sympathicusreizung in möglichst umfassender Weise einer Lösung entgegenzuführen. Es wurde an Froschherzen in situ experimentiert, bei denen der Vagusstamm zur Darstellung der rein hemmenden und fördernden Fasern nach dem von mir beschriebenen Vorgang aufgefäsert wurde. Die Kontraktionen von Vorhof und Kammer wurden graphisch verzeichnet. Das Verhalten der Kontraktionsform unter Vagusseinfluß lehrt, daß die Erschlaffungsvorgänge begünstigt werden. Dies geht vor allem aus der Beobachtung hervor, daß sich bei schwacher, eben am Kontraktionsablauf bemerkbare Vaguswirkung immer so darstellen, daß zwar noch keine Verringerung der Gipfelhöhe, aber eine deutliche Verfrüherung des diastolischen Abstiegs auftritt. Und auch bei Verminderung der Hubhöhen tritt die Erschlaffung um so früher ein, je stärker die negativ inotrope Wirkung zur Geltung kommt. Die diastolische Erschlaffung beginnt so früh, daß man von einer Verkürzung der Systolendauer sprechen kann. Der Begünstigung der erschlaffenden Vorgänge

st eine Verminderung der kontrahierenden entgegenzusetzen, die in einer Verminderung der Steilheit zum Ausdruck kommt, mit der die vom Herzen gezeichnete Kurve ansteigt. Diese Wirkung bezeichnet Verf. als klinotrope, wobei in Analogie mit Engelmanns Bezeichnungen die Vermehrung bzw. Verminderung der Anstiegssteilheit als positiv oder negativ klinotrope Wirkung zu benennen ist. Zur zahlenmäßigen Darstellung der gefundenen Verhältnisse wurde die Bestimmung der Steilheit der Kurve durch Ausmessung des Winkels vorgenommen, den die an steilster Stelle in die Kurve gelegte Tangente mit der Grundlinie bildet. Zweckmäßig wird dabei die Steilheit in Prozenten der Steigung dargestellt, wenn die systolische Steigung vor der Reizung gleich 100% gesetzt wird. Es stellte sich heraus, daß nach einer erfolgreichen Vagusreizung die erste Kontraktion oft eine Steilheit von nur 8—10% besitzt. Die sympathische Wirkung auf die Kontraktionsform äußert sich in erster Linie in einer vermehrten Steilheit des Anstiegs, die bis 125% betragen kann. Ebenso zeigt die durch den Accelerans beeinflusste Kontraktionskurve gegenüber der Norm auch einen beträchtlich steileren Abstieg. Die Erschlaffung greift in der Regel um so schneller Platz, je höher der Kontraktionsgrad ist. In vielen Fällen erfährt unter sympathischem Einfluß die Kontraktion eine zeitliche Verlängerung. Im allgemeinen kann man sagen, daß der Sympathicus auf die kontrahierenden Vorgänge einwirkt. Damit steht nicht im Widerspruche, daß auch die Steilheit des Abstiegs eine Erhöhung erfährt, denn es kann die Erschlaffung indirekt dadurch verstärkt werden, daß ein höherer Grad von Zusammenziehung erreicht wurde. — Eine kurvenmäßige Darstellung des zeitlichen Verlaufes der verschiedenen Wirkungen (chrono- und inotropen) lehrt, daß die beiden Hemmungen oder Förderungen ungleich verlaufen. In beiden Fällen, also sowohl bei der Wirkung des Vagus- wie Accelerans, schwindet der chronotrope Erfolg früher als der inotrope. Durch Erregung der sympathischen Nerven kann der Zustand des Herzens auch in tiefergehender und dauernder Weise geändert werden; es gelingt nämlich, erschöpfte, sich kaum mehr zusammenziehende Herzteile zu deutlichen und guten Zusammenziehungen zu veranlassen. In einigen Fällen wurde das nicht mehr arbeitende Herz wieder zum Schlagen gebracht. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

Bramwell, J. Crighton: An abnormal relationship of the electrical to the mechanical response in the ventricles. (Eine ungewöhnliche Beziehung zwischen elektrischer und mechanischer Tätigkeit der Kammern.) (*Roy. infirm., Manchester.*) *Proc. of the roy. soc. Ser. B*, Bd. 94, Nr. B 657, S. 98—102. 1922.

Bei einem Patienten, der an Herzblock litt, wurde festgestellt, daß das Intervall zwischen dem Kammeranteil des Elektrogramms und dem Eintreffen der Pulsweite in der Carotis und Radialis wesentlich verzögert war. Verf. deutet diese Erscheinung so, daß es sich dabei entweder um eine Verlängerung der Latenzzeit oder eine Verspätung der Zusammenziehung im mechanischen Sinne gehandelt hat. *v. Skramlik*.

Haberlandt, L.: Ein direkter Nachweis der muskulären Erregungsleitung im Wirbeltierherzen. (Nach Untersuchungen an der abgeklemmten Froschherzspitze.) (*Physiol. Inst., Univ. Innsbruck.*) *Zeitschr. f. Biol.* Bd. 76, II. 1/3, S. 49—82. 1922.

Das Hauptergebnis der hier mitgeteilten Untersuchungen ist der streng geführte histologische Nachweis, daß an der abgeklemmten Froschherzspitze trotz der erhaltenen Erregungsleitung schon nach rund einem Monat die Endfasern des intramuskulären Nervenplexus vollkommen degeneriert sind. An solchen Herzspitzen lassen sich weder durch elektrische noch durch chemische Reizung (mittels Muscarin) intrakardiale Vagus-Sympathicuseffekte auslösen. Trotzdem sind bei diesem Herzteil alle physiologischen Eigenschaften, die ihm auch in der Norm zukommen, völlig erhalten, nämlich Erregbarkeit, die refraktäre Phase und die Erregungsleitung. Es ist also der Schluß durchaus berechtigt, daß diese Eigenschaften rein muskuläre Erscheinungen darstellen. Damit ist wohl ein Beweis für die muskuläre Erregungsleitung im Wirbeltierherzen erbracht.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Wyss, W. H. v. und N. Messerli: Reflexe vom Mesenterium auf das Herz (Physiol. Inst., Univ. Zürich.) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 196, H. 2, S. 2 bis 236. 1922.

Bei dezerebrierten Meerschweinchen wurden nach Eröffnung von Brust- und Bauchhöhle mechanische Reize in Form von Zug am Mesenterium appliziert und dabei die Herztätigkeit registriert. Es wird durch beigefügte Kurven die Tatsache belegt, daß von dieser Reizstelle aus die Herztätigkeit in sehr prägnanter Weise beeinflusst werden kann. Es kommt dabei sowohl zu experimentell erzeugten Tachykardien als auch zur Erregung und Lösung von Herzblock. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte betreffend Genese analoger Herzsymptome in der menschlichen Pathologie. Besonders ist hier an plötzliche Herzlähmungen im Verlaufe von Bauchoperationen zu denken, die als reflektorische Inhibition des Herzens zu deuten sind.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.)

Meek, Walter J. and J. A. Eyster: The effect of plethora and variations in venous pressure on diastolic size and output of the heart. (Der Einfluß von Plethora und der Variationen des venösen Drucks auf die Größe der diastolischen Füllung und des Schlagvolums des Herzens.) (Physiol. laborat., univ. of Wisconsin, Madison.) Americ. Journ. of Physiol. Bd. 61, Nr. 1, S. 186—202. 1922.

Verff. experimentierten an Hunden im Zustande einer Äthernarkose; die Größe der diastolischen Füllung des Herzens wurde durch Röntgenphotographie ermittelt. Das Herzvolum wurde nach einer empirischen Formel berechnet. Intravenöse Injektionen verschiedener Salzlösungen oder von Blut in Mengen, die zwischen 25—103% der gesamten Blutmenge schwanken, führen zu keiner konstanten Steigerung der diastolischen Herzfüllung. Bestimmungen des Hämoglobins haben erwiesen, daß der größere Teil der injizierten Flüssigkeit im Gefäßsystem verbleibt. Auf Mikrophotographien des Ohres erkennt man, daß die Capillaren und kleineren Venen prall gefüllt sind. Sie dienen so als Flüssigkeitsbehälter und verhüten eine Herzdehnung oder eine Steigerung des Schlagvolumens. Plethorische Tiere verhalten sich bei Blutungen genau so wie normale. Blutverluste von 1—2% des Körpergewichts führen eine Verminderung der diastolischen Füllung herbei. Der unmittelbare Erfolg einer intravenösen Injektion war eine Steigerung des venösen Drucks und dieser war stets mit einer Vergrößerung der diastolischen Füllung verbunden. Hand in Hand damit ging auch eine Erhöhung des Herzschlagvolumens und des Blutdrucks. Dabei blieb die Erregung des Herzens die gleiche.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.)

Bergman, A.: Les modifications de la pression artérielle, le pouls et la formule leucocytaire pendant l'exercice musculaire chez les sujets normaux ou cardiaques. (Die Änderungen des arteriellen Druckes des Pulses und der Leukocytenzahl während der Muskelarbeit bei normalen und bei herzkranken Personen.) Compt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 33, S. 1046—1047. 1922.

Nüchterne Leute mußten im Bett abwechselnd beide Beine 2 und 4 Minuten lang 45 mal pro Minute etwa 30 cm heben. Bei Gesunden wurde folgendes beobachtet: Der Maximaldruck nahm zuerst ab, dann zu. Der Minimaldruck stieg während der Arbeit und sank während der Ruhe. Die Pulsfrequenz war etwas erhöht, aber nicht mehr als um etwa 10 Pulsschläge pro Minute. Während der Arbeit war die Zahl der Leukocyten wenig verändert; in der Ruhe war eine Hyperleukocytose nachweisbar. Bei Kranken mit schwerem Herzfehler nahm der Maximaldruck zu, um während der Ruhe wieder abzusinken; auch der Minimaldruck fiel in der Ruhe ab. Die Pulsfrequenz stieg stark an. Nach der Arbeit beobachtete man nie die übliche Hyperleukocytose, wohl aber meist eine beträchtliche Verminderung der Leukocyten. Statten die Kranken unter Digitalis, so wurden qualitativ die gleichen Veränderungen gefunden, aber nicht in so ausgesprochener Form.

Atzler (Berlin)

Baráth, Eugen: Untersuchungen über die klinische Wirkung des Strychnins auf den Blutdruck und die Atmung. (*III. med. Klin., Univ. Budapest.*) Med. Klinik Jg. 18, Nr. 47, S. 1492—1493. 1922.

Da die Angaben über die Wirkung des Strychnins auf Kreislauf und Atmung beim Menschen widersprechend sind, werden neue Versuche unternommen. In Zeitabständen von 7—8 Tagen werden den Kranken steigende Gaben von Strychnin. nitr. subcutan und intravenös als 1—2 proz. Lösungen injiziert. 1—5 mg haben keine meßbaren Wirkungen, auch intravenös sind Gaben bis 1,5 mg nicht wirksam. Bei Mengen von 2—3 mg dagegen zeigte sich eine deutliche Blutdrucksteigerung um 18—35 mm Hg, eine deutliche Verlangsamung des Pulses um 15—25 Schläge sowie Vermehrung und Vertiefung der Atmung. Einige Kranke erwiesen sich auch durch Gaben von 4 mg als nicht beeinflufßbar. Die Wirkung des Strychnins beginnt schon 1 Minute nach der intravenösen Injektion und hält 1—2 Stunden an. Schwächliche Menschen scheinen schlechter auf Strychnin zu reagieren als kräftige. Bei einem Kranken mit starken Ödemen wirkte das Strychnin erst, nachdem eine 7tägige Thyreoideafütterung vorausgegangen war.

Kochmann (Halle).

Urechia, C.-I. et A. Goldner: Le complexe colorant thionine-nigrosine, en injections chez l'homme. (Der Farbkomplex Thionin-Nigrosin bei Injektion am Menschen.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 28, S. 814—815. 1922.

Die Verf. wiederholen Gantrelts Tierversuche am Menschen, injizieren Thionin in 1—5 proz. Lösung und finden als Erfolg einer Dosis von 1 mg eine nach etwa 5 Minuten eintretende, allmählich fortschreitende Senkung des Blutdrucks um durchschnittlich 14 mm Hg. Nigrosininjektion hat für sich allein keine Wirkung auf den Blutdruck; folgt sie aber auf eine Thionininjektion, deren Wirkung schon im Abklingen begriffen ist, so kommt eine starke, langdauernde (über 1 Stunde) Blutdrucksenkung zustande.

Ebbecke (Göttingen).

Kajikawa, Jinichi: Untersuchungen über die Permeabilität der Zellen. X. Mitt. Der Einfluß der Gefäßnerven auf die Permeabilität der Gefäße, insbesondere derjenigen der vorderen Kammer des Auges. (*Physiol. Inst., Univ. Bern.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4/6, S. 391—404. 1922.

Die Frage, ob es spezielle trophische Nerven gibt, d. h. Nerven, deren wesentliche Leistung in der Unterhaltung eines gewissen Ernährungszustandes der Zellen besteht, ist noch nicht ganz geklärt. Die Versuche von Goltz und Ewald am Hund mit verkürztem Rückenmark haben gezeigt, daß selbst bei vollständigem Fehlen der Rückenmarksinervation die Gewebe bis auf einige sehr geringfügige Symptome vollständig von in Betracht fallenden trophischen Störungen geschützt bleiben. Dies würde also gegen das Vorhandensein spezieller trophischer Nerven sprechen. Klinische Erfahrungen machen dagegen die Annahme einer trophischen Nervenversorgung wahrscheinlich. Aus dem ganzen Fragenkomplex, welcher mit der Existenz oder Nichtexistenz von spezifischen trophischen Nerven im Zusammenhang steht, wurde ein Problem herausgegriffen und in vorliegender Arbeit untersucht. Es handelt sich um die Frage, ob die Permeabilität der Capillaren vom Nerven aus beeinflufßbar ist. Die Versuchsanordnung war folgende: Einem Kaninchen wurde auf der einen Seite das Ganglion cervicale sup. entfernt und am Auge der operierten und der nichtoperierten Seite 1. die entzündungshemmende Wirkung des Calciumions (Chiari und Januschke), 2. der Farbstoffübertritt in die vordere Kammer und 3. der Eiweißgehalt des Kammerwassers untersucht. Es konnte festgestellt werden, daß auf derjenigen Seite, wo das Gangl. cervic. sup. fehlte, die Entzündungserscheinung nach Senföleinträufelung deutlich schwächer war als auf der normalen Seite. Auch die Hemmung der Ex- und Transudation durch Ca war auf der operierten Seite schwächer. Der Übertritt des in die Peritonealhöhle injizierten Fluoresceins in die vordere Augenkammer war auf der operierten Seite verzögert. Das Kammerwasser war auf der operierten Seite eiweißärmer als auf der unversehrten Seite. Auf Grund all dieser Versuche kommt Verf. zum Schluß, daß die sympathische Innervation einen Einfluß auf die Permeabilität der Gefäße besitzt, und zwar im Sinne einer Erhöhung derselben, da eben beim

Fehlen der sympathischen Nerven die Permeabilität deutlich herabgesetzt ist (vgl. diese Berichte 13, 204). (J. Abelin (Bern).)

Carrier, E. B.: Studies on the physiology of capillaries. V. The reaction of the human skin capillaries to drugs and other stimuli. (Untersuchungen über die Capillarphysiologie. V. Die Reaktion der menschlichen Hautcapillaren auf Drogen und andere Reize.) (*Laborat. of zoophysiol., univ. Copenhagen.*) *Amer. Journ. of physiol.* Bd. 61, Nr. 3, S. 528—547. 1922.

III. vgl. diese Berichte 14, 531.

Carrier beobachtet mikroskopisch das Verhalten der menschlichen Hautcapillare am Nagelwall und Handrücken unter dem Einfluß thermischer, mechanischer und chemischer Reize. Zur Beleuchtung benutzt die Verf. eine Bogenlampe, deren Licht zur Absorption der Wärmestrahlen und violetten Strahlen durch eine Lösung von Kupfersulfat und Pikrinsäure filtriert und mit einer Linse konzentriert wird. Es gelingt ihr, an besonders zarter Haut außer den Capillaren auch große Teile des subpapillären Venenplexus und kleine Abschnitte der zuführenden Arteriolen zu sehen. Für das Vorkommen einer Capillarperistaltik findet sie keine Anhaltspunkte. Am Handrücken sieht sie, entsprechend dem Kommen und Gehen makroskopisch sichtbar weißen Fleckchen, einen fortwährenden Wechsel von Zahl und Lage der durchbluteten Capillaren, da sich die vorhandenen Capillaren abwechselnd öffnen und schließen und für gewöhnlich nur ein kleiner Teil von ihnen durchblutet ist, während am Nagelwall nicht alle vorhandenen Capillaren offen sind. In der Kälte kontrahieren sich Arteriolen, Capillaren und Venchen, der Blutstrom wird langsam und körnig; wird die Kälte noch größer, so erschlaffen die Capillaren und füllen sich mit venösem Blut. Auf leichtes Bestreichen pflegt der Capillar- und Venchenverengung, die zu Nachblassen führt, eine mehrere Sekunden dauernde Erweiterung vorherzugehen. Stärkeres Streichen eröffnet alle Capillaren des gereizten Gebiets. Die Capillarreaktionen kommen auch an Hautbezirken zustande, die durch 2proz. Novocainlösung lokal anästhesiert sind. Zur chemischen Reizung führt Verf. eine mit der Lösung gefüllte ganz fein ausgezogene, kurze Spitze einer Glascapillare in die Haut ein und läßt unter einem bestimmten, manometrisch gemessenen Druck ein Tröpfchen aus der Spitze austreten. Zur Kontrolle dienen mit Kochsalzlösung gefüllte Capillarspitzen. Adrenalin 1:1000 macht, örtlich appliziert, sowohl an einer Arteriole als an einer Capillare Verengung, die einige Minuten lang Verschuß und Blutstillstand bewirkt; noch nach 45 Minuten hat die Capillare nicht ganz ihre ursprüngliche Weite erreicht. Lösungen von 1:2000 und schwächer gaben an den Nagelwallcapillaren keine Wirkung, während die Handrückencapillaren noch auf Lösungen von 1:100 000 nach einer Latenzzeit von 5 Minuten mit Verengung reagieren. Histamin 1:1000 macht am Nagelwall Capillarerweiterung mit Strömungsbeschleunigung, am Handrücken eine Quaddel, die um 1—5 Minuten dauerndem, scharfen schmerzhaftem Jucken entsteht. Ähnlich wirkt in die Haut gestoßene Stacheln der Laporteaapflanze. Pituitrin 1:20 bis 1:100 vereit nach einer Latenz von einigen Minuten die Capillaren, aber nicht so stark wie Adrenalin, und scheint nicht auf die Arteriolen zu wirken. Von den gefäßerweiternden Mitteln wirkte Acetylcholin nur auf die Arteriolen, nicht direkt auf die Capillaren, Amylin auch etwas auf die Capillaren, Uräthan sowohl auf Capillaren als auf Arteriolen. Ebbecke.

Vimtrup, Bj.: Beiträge zur Anatomie der Capillaren. I. Über contractile Elemente in der Gefäßwand der Bluteapillaren. (*Zoophysiol. Laborat., Univ. Copenhagen.*) *Zeitschr. f. d. ges. Anat., I. Abt., Zeitschr. f. Anat. u. Entwicklungsgeogr.* Bd. 65, H. 1/3, S. 150—184. 1922.

Um die Frage zu entscheiden, ob die selbständigen Änderungen der Capillarweite auf einer allgemeinen Contractilität der Endothelzellen beruhen oder durch das Vspringen anschwellender Zellkerne ins Lumen zustandekommen oder schließlich, insbesondere, dem Endothelrohr aufgelagerten contractilen Elementen zuzuschreiben sind, untersucht Verf. die Capillaren an Frosch und Salamander sowohl an fixierten

gefärbten Schnittpräparaten als an lebenden Tieren und bestätigt und ergänzt die Befunde von Rouget. Zur Schnittfärbung (ca. 15 μ dicke Schnitte) empfiehlt er am meisten die Safranin-Indigocarmin-Pikrinsäurefärbung. Er unterscheidet schon bei schwächerer Vergrößerung (70—300fach) außer den in der Capillarkontur gelegenen Endothelkernen aufgelagerte massivere, im Querschnitt meist kreisrunde Kerne, die mit ihrer Längsachse in der Gefäßrichtung oder schräg dazu gestellt sind. Sowohl von diesen wie von den Endothelzellen sind die Kerne an verengten Capillaren dick und springen, nach außen oder nach innen, vor, an erweiterten Capillaren erscheinen sie abgeflacht. Bei starker Vergrößerung sieht er die aufgelagerten Kerne von Protoplasma umgeben, das sich nach der Peripherie zu verdünnt, eine Längsausdehnung bis zu 200 μ haben kann und zahlreiche spitze, quer zur Capillarrichtung laufende und die Capillare von beiden Seiten her umgreifende feinste Fortsätze oder Fasern ausstreckt, die nur mit Immersion zu sehen sind. Dies sind die typischen „Rougetzellen“. Die Muskelhaut der kleinen Arterien und Venen, die aus dicht nebeneinanderliegenden, quer zur Gefäßrichtung gestellten, spindelförmigen Muskelzellen besteht, löst sich beim Übergang zu den Capillaren in vereinzelte, aufgelagerte Spindeln auf, die, weit voneinander rückend, sich mehr und mehr verästelnd und aus der queren in die schräge Lage übergehend, schließlich zu typischen Rougetzellen werden, was der Schilderung von S. Mayer entspricht. Dieselben Zellen lassen sich durch supravitale Methylenblaufärbung nachweisen. In manchen Fällen gelingt es wahrzunehmen, daß die Protoplasmafortsätze aus feinen Fibrillen bestehen. An Frosch- oder Tritonlarven, die lebend, ohne Narkose in ein Plastizinkammerchen eingelagert und mit Wasser überspült werden, kann Vimtrup diese contractilen Zellen in Funktion sehen. Die Kontraktion beginnt damit, daß die Zellen stärker lichtbrechend werden und an der Stelle, wo der Kern liegt, eine leichte Einsenkung und gegenüber mehrere ganz kleine Einziehungen erscheinen. Von dort schreitet die Kontraktion fort, die Fortsätze werden kürzer und dicker und das Protoplasma konzentriert sich mehr um den Kern herum. Wenn der Blutstrom stockt, wird das Präparat trüb, um sich bei Wiederkehr der Durchblutung wieder zu klären. Die Endothelzellen stark erregter Capillaren sind schmaler und etwas kürzer und grenzen mit fein gezackten Rändern aneinander, während die mit Silber sichtbar gemachten Grenzlinien an den erweiterten Capillaren nahezu geradlinig verlaufen.

Ebbecke (Göttingen).

Moog, O. und P. Kaufmann: Zur Prüfung der Gefäßfunktion nach E. Weiss. (*Med. Klin., Marburg a. L.*) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 29, H. 1/2, S. 114 bis 138. 1922.

Wird nach Weiss durch plötzliches Abschnüren des Oberarmes Blutzufuhr und -abfuhr gesperrt, so geht die Strömung in den mikroskopisch beobachteten Finger-capillaren noch einige Sekunden lang weiter, erst dann tritt Stillstand und unter Umständen Rückströmung ein. Die Verf. finden die „Strömungszeit“ nach Kälteeinwirkung regelmäßig, bei Hypertonie meist verkürzt. Rückströmung kommt auch bei normalen Individuen vor. Wärmeeinwirkung verlängert die Strömungszeit. Wie die Verf. betonen, darf man hierbei nicht von Gefäßtonus im allgemeinen sprechen, da größere Arterien, Arteriolen, Capillaren, intracutane Venen und subcutane Venen Gefäßabschnitte von selbständigem, nicht immer übereinstimmendem Verhalten darstellen. So werden bei Akrocyanose durch Wärmeeinwirkung die Capillarschlingen weiter, die intracutanen Venen aber enger, während wahrscheinlich die vorher spastisch kontrahierten subcutanen Venen weiter werden. Weil so viele Faktoren mitsprechen, wird die Deutung und Verwertung der Befunde bei dieser Methode unsicher. Dagegen empfehlen sie die Mikrocapillarbeobachtung nach Eisapplikation als Ergänzung zu der Romberg-Müllerschen plethysmographisch gemessenen Eisreaktion. Die Reaktion fehlt an anästhetischen Bezirken, da der zentripetale Teil des Reflexbogens ausgeschaltet ist, und bei fortgeschrittener Arteriosklerose. Bei den Vasoneurosen fällt auch mit dieser Methode das stark schwankende, ungleichmäßige Verhalten der Gefäße auf. *Ebbecke*.

Niekau, Bruno: Ergebnisse der Capillarbeobachtung an der Körperoberfläche des Menschen. Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 22, S. 479—554. 1922.

Niekau gibt, nach einer historischen Einleitung, eine Zusammenstellung der Mikrocapillarbeobachtungen am Menschen, insbesondere der in der Tübinger Klinik erzielten Befunde, die durch 44, teilweise farbige Abbildungen veranschaulicht sind. Zum Beweis für die Contractilität der Capillarwand werden die ringförmigen, unregelmäßigen Einschnürungen und Beobachtungen angeführt, die unter Umständen den Hautcapillaren zu sehen sind. Für die Färbung der Haut spielt außer den Capillaren das Verhalten der subpapillären Venenplexus eine wichtige Rolle. Die vasoneurotische Diathese mit ihrem Mangel des Innervationsgleichgewichts spiegelt sich im „spastisch-atonischen Komplex“ der Capillaren wieder. Als ihre stärksten Formen erscheinen Akrocyanose, Erythromelalgie und Raynaudsche Krankheit. Weit ausgedehnte Abschnitte der Arbeit beschäftigen sich mit dem Einfluß von Kreislaufstörung, von Nephritis und Eklampsie, von Infektionskrankheiten und schließlich mit den Einwirkungen von Medikamenten (Adrenalin, Coffein, Morphin), von Lichtstrahlung und Röntgenstrahlen auf das Capillarbild. Als Teststelle wählt Verf. die Infrascapulargegend der linken Brustseite.

Elbecke (Göttingen).

Roncato, A. e L. Oselladore: Contributo alla fisiologia dei vasi ed alla fisiologia del tessuto muscolare liscio. Nota IV. Azione dei gas respiratori sui movimenti ritmici vasali. (Beitrag zur Physiologie der Gefäße und der glatten Muskulatur. IV. Die Wirkungsweise der Atmungsgase auf die rhythmischen Gefäßkontraktionen.) (*Istit. di fisiol. umana, univ., Padova.*) Arch. di fisiol. Bd. 20, H. 1, S. 17—32. 1922.

Für eine rhythmische Tätigkeit isolierter, überlebender Gefäße ist die Anwesenheit von Sauerstoff unbedingt erforderlich. Nur in Gegenwart dieses Gases dauern die Bewegungen längere Zeit — etwa 3—4 Stunden — an. Der Tonus wird verstärkt und die Hubhöhe vergrößert. Bei Mangel an Sauerstoff tritt das Gegenteil ein, ebenso bei Darbietung von Kohlensäure, nur ist im letzteren Fall die Senkung des Tonus weniger auffallend. Geringe Dosen von CO_2 wirken dagegen auf die Tätigkeit der Gefäße sogar im günstigen Sinne ein. Bei der günstigen Wirkung der Kohlensäure handelt es sich um einen Effekt des Anions, denn die Wasserstoffionen (geprüft in Salz- und Milchsäure) wirken auch in geringeren Dosen sehr ungünstig auf die Gefäße ein.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Roncato, Achille: Contributo alla fisiologia dei vasi ed alla fisiologia del tessuto muscolare liscio. Nota V. Azione delle trazioni improvvise e delle trazioni continue sui movimenti ritmici vasali. (Beitrag zur Physiologie der Gefäße und der glatten Muskulatur. V. Der Einfluß plötzlicher und dauernder Dehnungen auf die rhythmischen Zusammenziehungen der Gefäße.) (*Istit. di fisiol., univ., Padova.*) Arch. di fisiol. Bd. 20, H. 2, S. 147—158. 1922.

Isolierte Gefäße und Gefäßstreifen antworten auf plötzliche und heftige Dehnungen mit rhythmischen Zusammenziehungen. Arbeitet das Präparat spontan, so wird durch Zug der Kontraktionsumfang vergrößert. Der beste Erfolg wird erzielt, wenn die rhythmischen Zusammenziehungen zeitlich mit dem Dehnungsreiz zusammenfallen. Für das Auftreten der spontanen Rhythmik ist ein Dehnungszustand von gewisser Höhe nur von Vorteil. Man kann dabei ein gewisses Dehnungsoptimum feststellen; wird dieses überschritten, so können die Gefäße trotzdem noch eine Zeit lang spontan arbeiten, auch wenn es sich um dehnende Gewichte handelt, die die Masse des Gefäßstückes um ein Beträchtliches überschreiten. Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Roncato, Achille: Contributo alla fisiologia dei vasi ed alla fisiologia del tessuto muscolare liscio. Nota VI. Le contrazioni ritmiche e spontanee della vena porta. (Beitrag zur Physiologie der Gefäße und der glatten Muskulatur. VI. Die rhythmischen und spontanen Kontraktionen der Vena portae.) (*Istit. di fisiol. umana, univ., Padova.*) Arch. di fisiol. Bd. 20, H. 2, S. 159—164. 1922.

Man beobachtet an der überlebenden Vene zweierlei Arten von Zusammenziehungen:

tonische und rhythmische. Die tonischen sind von entsprechender Kraft, erfolgen aber ganz irregulär, wie man dies auch an Arterien beobachten kann. Die rhythmischen lassen sich unterscheiden in solche, bei denen sich die Longitudinal- und solche, bei denen sich die Zirkulärfasern kontrahieren; die ersteren sind weitaus kräftiger. Die rhythmischen Zusammenziehungen erfolgen oft mit einer Frequenz von 15—20 in der Minute und können bis 6 Stunden anhalten.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Spek, L. A. M. van der: Klinische Untersuchung über den Zustand und die Funktion der Hautcapillaren. (*Geneesk. klin., Univ. Leiden.*) *Geneesk. bladen* Jg. 23, Nr. 6, S. 173—206. 1922. (Holländisch.)

Methodisches: Eine 2 cm breite Fingermanschette (analog derjenigen des Gärtnerischen Tonometers) wird ringsum des 2. Phalanx appliziert, so daß dieselbe gerade diesen Fingerteil ohne Druck oder Hautreizung sanft umfaßt. Mit einem den Finger fest umschneidenden elastischen Ring wird das Blut durch allmähliche Schiebung des Ringes von der Fingerkuppe zur Manschette aus der 3. Phalanx herausgepreßt. Der Endphalanx erblaßt und hebt sich scharf von der Hautfarbe der übrigen Finger ab. Mit Einschaltung eines Manometers wird nun der Druck in der Manschette derartig über den Maximalblutdruck hinaufgeführt, daß der sehnürnde schmale Ring weggenommen werden kann, ohne daß das Blut in den erblaßten Finger zurückströmt, indem Arterien und Venen beide durch die Manschette abgeschlossen sind. Das Müllersche Hautmikroskop wird jetzt auf die Limbuscapillaren des Fingers eingestellt, allmählich Luft aus der Fingermanschette ausgelassen, bis der Blutdruck in den Fingerarterien größer ist als die schließende Kraft der Manschette. In diesem Augenblick werden plötzlich sämtliche Capillaren schnell mit Blut gefüllt, indem die Fingerarterien wieder in offene Verbindung mit dem blutzuführenden Finger geraten sind. Sofort wird die weitere Druckabnahme gehemmt, der in der Manschette herrschende (Anfangsstromdruck) notiert. Bei jeder Pulselle entweicht durch die Fingerarterien eine Blutmenge unter der jetzt ungleich weniger sehnürnden Manschette, dennoch genügt diese Schnürkraft noch vollständig zur Schließung der abführenden Venen des Endphalanx, so daß kein Blut aus letzterem in die Hand abfließen kann, die Capillaren mit Blut überfüllt werden und der Capillarstrom allmählich abklingt, zuletzt sehr langsam wird, in einigen Capillaren zeitweilig einen Augenblick sistiert. Diese Blutüberfüllung des Endphalanx kann makroskopisch leicht durch die dunkelblaue Färbung erkannt werden. Manchmal geht die Fortbewegung des Blutes mit dem Pulsschlag synchronischen Zuckungen vor sich. Bei fortwährender Druckabnahme in der Fingermanschette wird die Capillarströmung immer schneller, bis der schubartige Charakter desselben beim Nähern des Nullpunktes allmählich in regelmäßiger Weise vor sich geht und die Füllung mehr und mehr derjenigen normaler Capillaren ähnlich wird. Bei pathologisch funktionierenden Capillaren sind diese Erscheinungen abweichend, indem durch Resistenz- und Contractilitätsveränderung der Blutstrom nach der plötzlichen Füllung der blutleeren Capillaren innerhalb weniger Augenblicke vollständig sistiert. Hier ist die kompensatorische Capillarkraft, diejenige der Arterienäste, außerstande zur dauernden Blutversorgung der Gewebe des Limbus. Zur Innehaltung der Blutversorgung soll der in der Fingermanschette herrschende kompensatorische Druck herabgesetzt werden, und zwar um so mehr, je weniger die Capillaren zur Überwindung der Widerstände der drückenden Manschette imstande sind. Sobald nun der Blutstrom in der Mehrzahl der Capillaren wieder anfängt und dauernd wird, wird der in der Manschette herrschende Druck („dauernder Stromdruck“) abgelesen. Auch hier ist dieser Strom anfänglich zuckend, mit dem Puls isorhythmisch, geht indessen ebenfalls bald in eine gleichmäßige Bewegung über. Die Differenz nun zwischen dem Druck, bei welchem das Blut in die leeren Capillaren hineinschießt, und dem Druck, bei welchem der zum Stillstand gelangte Capillarstrom wieder einsetzt, ist ein Zahlenmaß, mittels welchem ein Eindruck über den durch das strömende Blut erlittenen Widerstand gewonnen wird, ebenso wie über das Anpassungsvermögen und über die Kraft der Capillaren, mit anderen Worten, über die Funktion dieser kleinsten Gefäße. Die bei dieser Funktionsprobe festgestellten Differenzen des anfänglichen und des bleibenden Stromdrucks sind in zahlreichen Tabellen zusammengetragen. Diese Probe ermöglicht also die Abschätzung des durch die Capillaren ausgelösten Bruchteils der Fortschaffung des Blutes durch die Gewebe des gesunden und erkrankten Menschen. Bei der Hypertension werden sehr große Insuffizienzabweichungen festgestellt, ebenso bei akuter Nephritis.

Zeehuysen (Utrecht).

Nierensystem. Harn.

Barrington, F. I. F.: The nervous control of the urinary bladder in amphibians. (Die nervöse Kontrolle der Harnblase bei Amphibien.) *Brain* Bd. 45, Pt. 1, S. 126—132. 1922.

Die in dieser Abhandlung beschriebenen Experimente wurden unternommen zur Feststellung, ob die normale Entleerung der Harnblase bei Amphibien von der Un-

versehrtheit eines Teiles des Vorder- oder Hinterhirns abhängt. In Äthernäthes wurde das Gehirn an verschiedenen Stellen durchschnitten; der Sitz des Schnitts wurde später nach Tötung des Tieres und Härtung in Formalin mit freiem Auge bestimmt. Man konnte so zwei Arten des Zustandes der Harnblase feststellen; sie war entweder prall gefüllt oder zum großen Teil entleert. Das erstere war der Fall bei allen denjenigen Tieren, bei denen das Gehirn hinter dem Kleinhirn durchschnitten war. Rückenmarksdurchschneidung in verschiedenen Höhen und Anteilen lehrte, daß die Impulse zur Entleerung der Harnblase von der hinteren Hälfte des Mittelhirns in die vorderen Anteile des Rückenmarks absteigen. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

Berntrop jr., J. C.: Sur les mouvements automatiques de la vessie des mammifères. (Über die automatischen Bewegungen der Säugetierharnblase.) (*Laborat. physiol., univ., Amsterdam.*) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. S. 55—59. 1922.

Verf. unterscheidet zwei Typen von Kontraktionsformen, die einen, die ganz regelmäßig auftreten und zwar kurz nach Einführung einer entsprechenden Annahmeverrichtung in die Harnblase, die anderen, die im Anschluß daran zur Beobachtung gelangen und sich durch große Regelmäßigkeit bei langsamer Frequenz auszeichnen. In diesem zweiten Stadium führen Reize zu einer eigenen Zusammenziehung, die von einer Pause gefolgt ist. Als Temperaturoptimum für die spontanen Zusammenziehungen wurden 39—40° C gefunden. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

Dodds, E. C.: Variations in the diastatic power of the urine in relation to its reaction, with a suggested method for the estimation of the diastase content. (Schwankungen in der diastatischen Wirksamkeit des Urins in Beziehung zu seiner Reaktion. Empfehlung einer neuen Methode zur Bestimmung des Diastasegehalts.) (*Bland-Sutton inst. of pathol., Middlesex hosp., London.*) Brit. journ. of exp. pathol. Bd. 3, Nr. 3, S. 133—137. 1922.

Die bisherige Methodik zur Bestimmung der diastatischen Wirkung des Urins ist nicht einwandfrei, weil sie auf die Reaktion keine Rücksicht nimmt. Das Optimum der Urindias ist bei Phosphatpufferung bei $p_{\text{H}} = 6,1$ wie bei der Speicheldiastase. Man mischt 1,5 ccm Urin mit 6 ccm Pufferlösung (Gemisch von Soerensen's Na_2HPO_4 15 ccm mit 85 ccm Soerensen's KH_2PO_4). Bei ammoniakalischer Harnsäure gibt die alte Methode, welche die Reaktion vernachlässigt, falsche Werte, die neuere höhere, die richtiger sind. Da Ferment von Sedimenten niedergedrungen werden kann, muß der Urin vor der Bestimmung geschüttelt werden. *Martin Jacoby* (Berlin).

Weiss, M.: Die Farbstoffanalyse des Harns. III. Das Urochrom. (*Allg. Krankh. Wien.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, II. 4/6, S. 331—349. 1922.

Versuche des Verf. haben im Gegensatz zu älteren Auffassungen ergeben, daß das sog. „Urochrom“ nicht der eigentliche Träger der Harnfarbe ist. An dem Zustandekommen der Harnfarbe beteiligen sich vielmehr verschiedene Farbstoffe und Chromogene, die sich in einzelne Fraktionen zerlegen lassen. Man erhält dabei eine Fraktion der roten Farbstoffe („Urobilinfraktion“), die eine starke Absorption des Spektrums mit umschriebenen Bändern an verschiedenen Stellen aufweist. Der Anteil dieser roten Farbstoffe an der Harnfarbe des normalen Harns wird auf etwa $\frac{3}{4}$ der Gesamtfarbe geschätzt, während nur $\frac{1}{4}$ auf die Fraktion der gelben Farbstoffe („Urochromfraktion“) entfällt. Das Urochrom ist kein primärer Bestandteil des Harnes, sondern entsteht erst sekundär durch Oxydation des Urochromogens. Urochromogen enthält organisch gebundenen Schwefel und ist seiner chemischen Natur nach zur Gruppe der Oxypropionsäuren zu rechnen. Es stellt ein Stoffwechselprodukt dar und verursacht die Ehrlich'sche Diazoreaktion im Harn. Uromelanin ist ein höheres Oxydationsprodukt des Urochromogens und enthält ebenso wie dieses organisch gebundenen Schwefel. (Vgl. diese Berichte 1, 205.) *J. Abelin* (Bern).

Herzfeld, E.: Zur Methodik des Nachweises von Urobilinogen. (*Med.-chem. Inst., Univ.-Klin., Zürich.*) Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 40, S. 976—978. 1922.

Nach den Angaben der Literatur soll frischer Harn und ebensolche Faeces im weissenlichen Urobilinogen und erst nach Oxydation am Licht daneben größere Mengen

von Urobilin enthalten. Verf. untersucht diese Materialien in frisch entleertem Zustande mit Hilfe seiner Methode (vgl. diese Berichte 15, 265) und kommt zu dem Schluß, daß die Faeces kein Urobilinogen enthalten, daß vielmehr dessen Aldehydreaktion durch Pyrrol- und Indolkörper vorgetäuscht wird. In einem Harn mit einem Gehalt von 150 mg Urobilin nach Herzfeld läßt sich durch Ausschütteln mit Chloroform keine Abschwächung des Urobilingehalts erzielen. Verf. bezweifelt die Existenz des Urobilins als stets vorkommende Vorstufe des Urobilins und hält die Aldehydreaktion für ungeeignet zur Prüfung auf Urobilinausscheidung. Das Stärkerwerden der Urobilinreaktion nach einiger Zeit führt er darauf zurück, daß diese Reaktion nur allmählich eintritt. *Schmitz (Breslau).*

Grunke, Wilhelm: Über die Ausscheidung des Cholesterins im Harn. (*Krankenh. Moabit, Berlin.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 132, H. 4/6, S. 543—555. 1922.

Unter normalen Verhältnissen wird das Cholesterin vollständig mit der Galle ausgeschieden und die anderen Exkrete, besonders der Harn, sind in dieser Beziehung ohne Bedeutung. Bei Nierenkrankheiten gehen dagegen beträchtliche Cholesterinmengen in den Harn über. Es ist wahrscheinlich, daß dafür nicht nur Läsionen und Steigerungen der Durchlässigkeit der Niere maßgebend sind, sondern auch Veränderungen des Cholesterinstoffwechsels. Allerdings ist bis jetzt nur mit mikroskopischen, nicht mit den in diesem Falle allein maßgebenden chemischen Methoden gearbeitet worden. Verf. hat die Methode von Autenrieth und Funk zur Bestimmung des Cholesterins im Serum für den Harn adaptiert. 200—300 ccm Harn wurden auf dem Dampfbad auf 20—30 ccm eingengt und dann mit 40 ccm einer 25proz. Kalilauge verseift. Nach dem Auffüllen auf 500 ccm wurde mit 1—2 g Ca(OH)_2 verrührt und filtriert. Der Filterrückstand wurde getrocknet, sorgfältig in einen Scheidetrichter gebracht und mit mehreren Chloroformportionen ausgeschüttelt. Das Chloroform wurde auf 100 ccm aufgefüllt und nach Autenrieth weiter behandelt, jedoch wurde zur Colorimetrie der Apparat von Dubosq benutzt. Besser ist es, den Kalkniederschlag mit 25% Salzsäure zu zersetzen und dann mit Chloroform auszuschütteln. Man erhält so quantitativ die zugesetzten Cholesterinmengen zurück. Ist gleichzeitig Bilirubin vorhanden oder ist der Chloroformauszug durch andere Stoffe gefärbt oder getrübt, so klärt man ihn durch Schütteln mit etwas Calciumhydroxyd oder Kalilauge. Unter neun ikterischen Harnen enthielt nur einer 10,1 mg Cholesterin bei 1,182% im Blut, von 5 diabetischen Harnen einer 12,9 mg in der Tagesmenge bei einem Gehalt von 0,236 im Blut. Die Ausscheidung durch die Niere hängt nicht vom Cholesterinspiegel des Blutes ab. Eine Nierenläsion kommt als Ursache nicht in Betracht, da keine klinischen Anzeichen für eine solche vorlagen. Das Sediment des Harns war zu gering, um die Quelle des Cholesterins darstellen zu können. *Schmitz (Breslau).*

Regulierung der Funktionen.

Endokrine Drüsen.

Maranon: *Résumé de mon expérience sur la clinique et la thérapeutique des syndrômes hypophysaires.* (Zusammenfassung meiner Erfahrungen über Klinik und Therapie der hypophysären Symptome.) *Rev. neurol.* Jg. 19, Nr. 6, S. 691—694. 1922.

Den Gigantismus hält Maranon für ein Zeichen der reinen Hyperfunktion der Hypophyse. Die Fälle von übermäßigem, aber harmonischem Wachstum sind die ersten Glieder in der Reihe, welche mit dem pathologischen Gigantismus und mit der Akromegalie abschließt. Bei der Akromegalie P. Maries vereinigen sich die Hyperfunktion des Vorderlappens mit einem gewissen Grad qualitativer Sekretionsstörung (Dyshyperfunktion). In der Mehrzahl der Fälle von Nanismus finden sich Symptome, welche auf eine Veränderung der Hypophyse schließen lassen — Adipositas, Genitalhypoplasie, Diab. insipidus, Veränderungen der Sella turo. Dies, im Verein mit den experimentellen Ergebnissen, erlaubt die Hypothese, daß der Nanismus das Symptom der Hypofunktion des Hypophysenvorderlappens ist. Unter die Symptome, welche Be-

ziehungen mit einer Veränderung des Hinterlappens der Hypophyse haben können rechnet Verf. die Dystr. adip.-genit. und den Diab. insipidus. Die Dystr. adip.-genit. scheint sicher von einer Insuffizienz des Hinterlappens abzuhängen. Auch hier kann man den Einfluß nervöser Zentren nicht leugnen. Aber die Teilnahme der Hypophyse, so sehr sie heute von vielen bestritten wird, ist nach M. eine unbestreitbare Tatsache. Verf. gewinnt täglich mehr die Überzeugung, daß der Diab. insipidus zum mindesten in vielen Fällen auf eine Veränderung des Hinterlappens der Hypophyse (inkl. Mittellappen) zurückgeführt werden muß. Bis heute hat M. 51 Fälle von Diab. insipidus beobachtet. In fast allen diesen Fällen konnte er eine Hypophysenveränderung diagnostizieren, sei es aus der Koinzidenz mit anderen sicheren Hypophysensymptomen (Nanismus, Akromegalie, Adiposit. abdominalis, Hirsutismus, Veränderungen d. Türkensattels), sei es auf Grund der pathologisch-anatomischen Untersuchung. Nach seiner Ansicht ist die fast konstante, wenn auch vorübergehende Heilung der Polyurie durch Injektion von Hypophysenextrakt auch ein Argument für den Hypopituitarismus und nicht ein einfacher pharmakologischer Effekt. Diese Annahme schließt aber die Möglichkeit einer Wirksamkeit der nervösen polyurischen Zentren der Hirnbasis nicht aus.

v. Malaïst (München).

Collin, R.: Sur la fonte holocrine des cellules hypophysaires chez l'homme. (Über den holokrinen Einschmelzungsprozeß der Hypophysenzellen des Menschen.) (*Laborat. d'histol., fac. de med., Nancy.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 37, S. 1206—1208. 1922.

In der Drüsenpartie der Hypophyse des Menschen konnte die ganze Phase des Sekretionsprozesses bis zur Bildung des Kolloids verfolgt werden. Die hypercyanophilen Zellen machen eine Nekrobiose durch, die zur Bildung von Granula führt und schließlich im kolloidalen Zustand endet. Dieser Prozeß wird in kurzen Zügen histologisch beschrieben.

Hurms (Königsberg)

Coulaud, E.: Influence de l'irradiation du corps thyroïde sur les surrénales du lapin. (Die Wirkung der Bestrahlung der Schilddrüse auf die Nebennieren des Kaninchens.) (*Hôp. Laennec et laborat. du prof. Calmette, inst. Pasteur, Paris.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 34, S. 1072—1073. 1922.

Coulaud untersuchte bei Kaninchen, deren Thyreoidea mit Röntgenstrahlen behandelt worden war (vgl. diese Berichte 16, 403). Gewicht und Struktur der Nebennieren. Er stellte dabei fest, daß bei Dosen, die eine histologisch nachweisbare Veränderung der Thyreoidea hervorrufen, eine Rindenhyperplasie der Nebenniere mit Vermehrung des Volumens und des Gewichtes eintritt. Gleich starke Bestrahlung der Ovarien ruft dagegen keine Volumenvermehrung der Nebennieren hervor. Dagegen ruft die Bestrahlung der Ovarien eine stärkere Gewichtsvermehrung der Nebennieren hervor als die der Thyreoidea. Außerdem beobachtete C., daß das Gewicht der Nebennieren bei Kaninchen des gleichen Wurfs und Geschlechtes weitgehend übereinstimmt, während bei Tieren verschiedener Abstammung oft erhebliche Differenzen bestehen.

B. Romeis (München)

Hartman, Frank A.: The relation of the adrenals to muscular activity. (Die Beziehungen der Nebennieren zur Muskelaktivität.) (*Dep. of physiol., univ., Buffalo.*) Endocrinology Bd. 6, Nr. 4, S. 511—518. 1922.

Bei normalen Tieren — die Versuche wurden an Katzen angestellt — ist in der Regel eine Steigerung der Muskelaktivität von einer Vermehrung der Adrenalinsekretion begleitet. Diese Vermehrung ist um so größer, je anstrengender und je länger anhaltend die Arbeit ist. Sie überdauert zumeist eine Zeitlang den Abschluß der Muskelaktivität. Durch intramuskuläre Gaben von Adrenalin kann die Arbeitsfähigkeit von normalen Katzen gesteigert werden, aber auch solchen, die an einem Mangel an Adrenalin leiden. Ein Tier ist imstande, viel weiter zu laufen und rascher zu arbeiten, als

die Adrenalinsekretion gesteigert ist; Adrenalin bewirkt aber auch das Einsetzen von Konvulsionen im Gefolge von angestrengter Arbeit. *Emil v. Skramlik.*

Kyrle, J.: Über zwischenzellen-ähnliche Elemente im Nebenhoden. Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 70, H. 3, S. 520–524. 1922.

Bei Hunden wurden in Schnitten durch den Nebenhodenkopf in der Umgebung der Ductuli efferentes Zellkomplexe im Bindegewebe aufgefunden, die der Verf. für zwischenzellen-ähnliche Elemente hält. Sie kommen aber nur gelegentlich vor. Solche Zwischenzellenlaufen von vielfach geradezu tumorartigem Aussehen wurden auch im Nebenhoden des Menschen aufgefunden. *Harms (Königsberg).*

Stieve, H.: Untersuchungen über die Wechselbeziehungen zwischen Gesamtkörper und Keimdrüsen. I. Mastversuche an männlichen Gänsen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 52, H. 1/2, S. 313–364. 1922.

Während der Vorbrunst und Brunst verliert der Gänserl im Laufe weniger Wochen physiologischerweise etwa ein Viertel seines Körpergewichts. Zwischen Fettsatz und Keimdrüsen besteht bei diesem Tier ein Wechselverhältnis derart, daß der Körper unmittelbar vor wie während der Brunst erheblich mehr Nahrung benötigt als zur Zeit der Geschlechtsruhe. Die dabei dem Gesamtorganismus entzogenen Substanzen werden zum Aufbau der Keimzellen verwendet. Der Kubikinhalt der beiden Hoden beträgt nach Beendigung des Wachstums 55 cmm, in der Vorbrunst 200 cmm, auf dem Höhepunkt der Brunst 5000–12 000 cmm. Körpergewichtskurve und Hodengewichtskurve zeigen also entgegengesetztes Verhalten, so daß der höchste Gipfel der letzteren mit der tiefsten Senkung der ersteren zusammenfällt. Zur Ruhezeit finden sich in den Hodentubulis keine Fettröpfchen. Zwischenzellen und Kanälchen verhalten sich wie 1:3. Die Zwischenzellen entstehen aus den spindelförmigen Bindegewebszellen. Im Vorbrunsthoden treten in den Hodenkanälchen Fettröpfchen auf. Die Vermehrung der fettbeladenen Zwischenzellen erfolgt durch zahlreiche direkte Kernteilungen. Brunsthoden: Der generative Anteil hat sich etwa um das 70fache, das Zwischenewebe auf das 5fache vermehrt. Der Übertritt von Fettröpfchen aus den Zwischenzellen in die Samenbildungszellen ist nachweisbar. Ihre Menge in den Zwischenzellen nimmt ab. In der Nachbrunstzeit wird das Kanälchenepithel bis auf eine einfache Spermatogonien-schicht ausgestoßen. Auch die Zwischenzellen gehen zum großen Teil zugrunde. – Bei überreichlicher Ernährung zur Zeit der Geschlechtsruhe tritt starker Fettsatz ein, der eine Schädigung des Gesamtkörpers bedingt. Es kommt zu einer Vermehrung der Zwischenzellen, während die Keimzellen in der Entwicklung zurückbleiben. Infolgedessen sind gemästete Gänserl kürzere oder längere Zeit steril. Überreichliche Ernährung durch Stopfen nach Beginn der Vorbrunst, also nach dem Einsetzen der Spermiogenese, verhindert den Brunstgewichtsverlust, bedingt aber keine wesentliche Körpergewichtszunahme. Sie beschleunigt ferner den Ablauf der Samenbildung, wodurch es zu frühzeitigem Eintritt der Hochbrunst kommt. Das Hodenzwischenewebe ist auch bei der Gans dazu bestimmt Nährstoffe zu speichern und an die Samenbildungszellen abzugeben. Die Zwischenzellen sind eine besondere Form der Bindegewebszellen; sie sondern kein geschlechtseigenartiges Sekret ab.

B. Romeis (München).

Scaglione, Salvatore: Ricerche intorno all'azione degli estratti di organi endocrini sull'utero umano isolato. (Untersuchungen über die Wirkung von Extrakten endokriner Organe auf den isolierten menschlichen Uterus.) (*Clin. obstetr.-ginecol., istit. studi sup., Firenze.*) Riv. ital. di ginecol. Bd. 1, H. 1, S. 105–140. 1922.

Adrenalin in Konzentrationen von 1 : 200 000–500 000 erhöht den Tonus und vermehrt die Spontan- und Kontraktionen isolierter menschlicher Uterusstreifen, während es in schwächeren Konzentrationen hemmend wirkt (von 1 : 1 000 000 an). Hypophysenextrakte wirken wie Adrenalin. Extrakte aus funktionierenden Milchdrüsen wirken hemmend auf die automatischen Kontraktionen. Extrakte der Schilddrüse und der Placenta wirken inkonstant, während Thyroideen-, Corpus-luteum- und Zirbeldrüsenextrakte ohne Einfluß auf den Tonus und die automatischen Kontraktionen des Uterus sind.

Wacholder (Breslau).

Zentralnervensystem. Nervensystem.

Shimada, Kichisaburo: Beiträge zur Anatomie des Zentralnervensystems der Japaner. II. Fossa rhomboidea. (*Anat. Inst., Univ. Kioto.*) Acta scholae med. univ. imp., Kioto, Bd. 4, H. 2, S. 173—199. 1921.

Shimada hat an 30 Gehirnen erwachsener Japaner (15 Männer und 15 Weiber) die den Leichen nach Formol- oder Carbolalkoholinjektion entnommen und in 10proz. Formolwasser aufbewahrt wurden, die Rautengrube in allen ihren Einzelheiten gemessen und beschrieben. Er macht Mitteilungen über Größe und Gestalt der Fossa rhomboidea (die Länge beträgt im Mittel 34,7 mm, die größte Breite, wenn die Länge gleich 100 gesetzt wird, 59,9 bis 70 und darüber). Sh. beschreibt dann den Sulcus medianus rhombi mit seinen Segmentierungen, den Sulcus limitans mit der Fossa superior und inferior, den Locus caeruleus, die Area acustica, das medial vom Sulcus limitans gelegene Gebiet mit der Columna teres, deren kranialen Abschnitt die Eminencia teres sens. strict. bildet und deren caudalen Teil das Trigonum hypoglossi entspricht; ferner das hinterste Gebiet der Fossa rhomboidea (Area postrema foss. rhomb. Retzius und Funiculus separans), endlich die subependymal verlaufenden Faserstreifen der Fossa rhomboidea, unter denen die Striae medullares sive acusticae die Hauptrollen spielen. Sh. unterscheidet an ihnen sechs Verlaufsrichtungen und beschreibt eingehend ihre Stärke, ihre transversalen, schrägen und longitudinalen Komponenten nach ihrer relativen Häufigkeit und schließt dann mit der Schilderung der Striae in der Fossa superior und Pars inferior foss. rhomb. Vorzügliche Photogravüren verleihen der Arbeit einen ganz besonderen rassenanatomischen Wert. Wallenberg (Danzig).

Shimada, Kichisaburo: Beiträge zur Anatomie des Zentralnervensystems der Japaner. III. Medulla oblongata und Pons, nebst ihren aberrierenden Bündeln. (*Anat. Inst., Univ. Kioto.*) Acta scholae med., univ. imp., Kioto, Bd. 4, H. 3, S. 319—353. 1922.

An 50 Gehirnen erwachsener Japaner (34 Männer, 16 Frauen), zum Teil in Formol, zum Teil in Müller konserviert, hat Shimada die äußere Form und Größe der Medulla oblongata und des Pons genau beschrieben und ausgemessen. Er macht dann in einzelnen Angaben über die Fissura mediana anterior, die Pyramidenkreuzung, die Breite der Pyramiden, die Oliva inferior, die Fibræ arcuatae externae mit ihren mannigfachen Variationen, die Clava, das Tuberculum cuneatum und Tuberculum cuneatum auf der dorsalen Oblongatafläche, das „oberflächliche schleifenförmige Bündel“ an der Ventrolateralfläche (= „cerebro-bulbocerebellare Pyramidenbahn“ Hajos, = 4. Typus des Fasciculus arcuatus bulbi s. Fasc. ventrolateralis bulbi — der pontobulbäre Faserbündel Schaffers = ungewöhnlich verlaufender Faserstrang der Oblongata Faser). Am Pons stellt er vergleichende Längen- und Breitenmessungen an, schildert eingehend den Ponticulus Arnold = Fasciculus postpontinus Ziehen, den Fasciculus obliquus pontis (Schwalbe) = pontinen Teil des Corpus pontobulbare (Smith), beschreibt dann ein „aus den superfiziellen Brückenfasern abgespaltenes, kraniallateralwärts verlaufendes Bündel“, ein „oberflächliches, sagittales Bündel im lateralen Ponsgebiet“ (= „Fasciculus rectus pontis“ von Lenhossek). Auf Serienschnitten verfolgt er weiter ein sagittal und oberflächlich verlaufendes (aberrierendes) Bündel in der Nähe der Mittellinie des caudalen Ponsgebietes, das in vier Einzelbündel zerfällt, von denen das eine wie das Pickische Bündel nach rückwärts umbiegt. Diese Bündel zeigen ein vicariierendes Verhalten zu Obersteiners „Bündel von der Schleife zum Trübschenkelfuß“ (= mediale Haubenfußschleife von Monakow). Das „oberflächliche sagittale Bündel im lateralen Ponsgebiet“ wurde gleichfalls auf Schnittserien caudalwärts verfolgt, und zwar bis in das Areal der Helweg-Bechterewschen Dreikreuzbahn. Näheres über diese aberrierenden Faserzüge und ihre Identifikation mit bereits anderwärts beschriebenen Bündeln muß im Original eingesehen werden.

Wallenberg (Danzig).

Grzywo-Dabrowski, W.: Sur l'influence des rayons du radium sur le système nerveux central de la souris. (Über den Einfluß der Radiumstrahlen auf das Zentralnervensystem der Maus.) (*Laborat. de neurobiolog., soc. des sciences, Varsovie.*) Rev. neurol. Jg. 29, Nr. 8, S. 1126—1138. 1922.

Bei kurzen Bestrahlungen zeigten sich an den Ganglienzellen der Hirnrinde wie an denen des Thalamus Veränderungen im Sinne einer Sklerose. Längere Bestrahlungen führten zu schweren Veränderungen der Ganglienzellen, zu deren Atrophie und stellenweisem Ausfall, ferner zu ödematösen Auflockerungen des Grundgewebes sowohl in der Großhirnrinde als auch in den basalen Stammganglien und im Kleinhirn. Das Rückenmark ist weniger befallen. Die Gefäßwände bieten Atrophie der Zellen und Auflockerung ihrer Strukturen ohne entzündliche Erscheinungen. *A. Jakob* (Hamburg).

Weizsäcker, V. Frhr. v.: Neuere Forschungen und Anschauungen über Reflexe und ihre physiologische Bedeutung. Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 45, S. 2217 bis 2220. 1922.

Aufgabe der Forschung ist es, die Einordnung der Reflexe in den Aufbau der sensomotorischen Gesamtfunktionen klarzustellen. Dazu bieten sich zwei Wege. Den einen beschritt Sherrington, indem er versuchte, durch die Synthese einfacher Reflexe zu höheren Koordinationen aufzusteigen, den zweiten P. Hoffmann, der die Reflexe am intakten menschlichen Organismus studierte. Besprechung der kürzlich in monographischer Darstellung erschienenen Ergebnisse des letzteren. Den Eigenreflexen, für die derselbe Muskel zugleich Receptor und Effektor ist, stehen gegenüber die tetaniformen Reflexe (v. Weizsäcker), von Hoffmann Fremdre reflexe genannt. Möglicherweise besteht zwischen beiden ein Zusammenhang in dem Sinne, daß die tetaniformen Reflexe als eine Summe von Eigenreflexen aufgefaßt werden können. Bei der Erklärung komplizierterer Bewegungen ist neben der rein reflektorischen Entstehung auch die Möglichkeit einer sog. muskulären Koordination (Baeyer) zu berücksichtigen. Auf dem Boden der sensomotorischen Entstehung jeder Koordination kommt v. W. zu dem Satz: „Die eigentümliche (Prädilektions-) Form der zu beobachtenden Bewegungen beruht auf der eigentümlichen Form der receptorischen Erregbarkeit; der Prädilektionstypus der Bewegungen (bzw. Lähmungen) entspricht einem Prädilektionstypus der reflektorischen Erregbarkeit der Rückenmarkszentren.“ Es gelingt nicht, aus der Kenntnis einzelner Reflexmechanismen komplexe Bewegungen, wie den Gang, zu erklären, denn möglicherweise kommt den Reflexen nur eine regulatorische Funktion automatischer Zentren zu, da nach Graham Brown auch nach völliger Deafferentierung (Hinterwurzel durchschneidung) noch koordinierte Bewegungsfolgen möglich sind. Hier wäre dann zunächst das Wesen der Reflexregulation, d. h. der reflektorischen Anpassung an die jeweils verschiedenen äußeren Bedingungen aufzuhellen. Unter anderem ist zu ermitteln, warum der Muskel statt wie gewöhnlich auf Dehnung mit Kontraktion (kompensierender Reflex), unter Umständen mit Erschlaffung reagiert (adaptierender Reflex). Wie für Bewegungen, so gelten die Reflexgesetze auch für Haltungen, die als dynamische Gleichgewichte, nicht als Statik im Sinne der Physik aufzufassen sind. Und sie gelten sinngemäß auch für die sog. tonischen Reflexe, bei denen der eigentliche Bewegungsvorgang von einer Kontraktionsnachdauer gefolgt ist.

Harry Schäffer (Breslau).

Marinesco, G., A. Radovici et V. Răscanu: Contribution à la physiologie des réflexes d'automatisme médullaire chez l'homme. (Beitrag zur Physiologie der automatischen medullären Reflexe beim Menschen.) (*Inst. de physiol., fac. des sciences et clin., des maladies du système nerveux, Bucarest.*) Journ. de physiol et de pathol. gén. Bd. 20, Nr. 2, S. 226—240. 1922.

Bei verschiedenen Kranken mit Verletzung der Medulla oblongata, Hemiplegikern u. a. wurde der Ablauf der automatisch-medullären Reflexe einer Prüfung unterzogen, und zwar vornehmlich in bezug auf die Erscheinungen der Latenzzeit und der Summation der Reize. Dabei hat sich herausgestellt, daß die Latenzzeit im hohen Maße von

der Art des Reflexes abhängt; die extremen Werte sind 0,07—1,56 Sekunden. Für d Summationserscheinungen haben sich folgende Gesetzmäßigkeiten ergeben: Der Schwellenwert ist nur in einem bestimmten Bereich umgekehrt proportional der Reizfrequenz und ändert sich dann weiter nicht, wie groß auch die Wechselzahl genommen wird. Die Zahl der Reize, die bereits zu Summationserscheinungen führen, ist umgekehrt proportional zu ihrer Frequenz. Bei wiederholter Auslösung der Reflexe wächst die Latenzzeit und sie sind dann stets nur schwierig hervorzurufen. *Emil v. Skramlik.*

Magnus, R.: Wie sich die fallende Katze in der Luft umdreht. (*Pharmakol. Inst., Reichsuniv., Utrecht.*) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des animaux. Bd. 7, S. 218—222. 1922.

Wenn man Katzen, Hunde, Kaninchen oder Affen in Rückenlage frei in der Luft hält und dann fallen läßt, so drehen sie sich bekanntlich in der Luft und kommen mit den Beinen richtig auf den Boden. Da für das Zustandekommen dieses Reflexes sowohl die Labyrinth wie das Mittelhirn notwendig sind, lag der Schluß nahe, daß es sich um die Wirkung der Labyrinthstellreflexe auf den Kopf handelt. Daß dies der Fall ist, ergibt sich aus dem Studium von kinematographischen Aufnahmen. Durch den Labyrinthreflex des Kopfes wird derselbe gegen die Normalstellung gedreht. Hieran schließt sich der Halsreflex an, durch welchen der Körper dem Kopfe folgt, und zwar erst mit dem Thorax, dann mit dem Becken. Auf diese Weise kommt es zu einer außerordentlich schnell ablaufenden schraubenförmigen Bewegung des Tieres durch den Raum, welche vom Kopfe her eingeleitet wird. Die Drehung des Kopfes gegen den Körper muß nun außerdem tonische Halsreflexe auf die Extremitäten hervorrufen. Sodann führt die geradlinige Verschiebung des Kopfes im Raum bei freiem Fall zu einem Labyrinthreflex auf Progressivbewegung. Dieser führt am Ende der Bewegung dazu, daß die Extremitäten tonisch gesteckt und daher instandesetzt, das Gewicht des Körpers beim Auftreffen auf den Boden in zweckmäßiger Weise abzufangen. Man kann so die merkwürdige Fähigkeit der Tiere, beim freien Fall die Normalstellung auf den Boden zu kommen, auf das Zusammenarbeiten bekannter Reflexe zurückführen. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. B.).

Fröhlich, A. und H. H. Meyer: Zur Frage der visceralen Sensibilität. (*Pharmakol. Inst., Univ. Wien.*) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 29, H. 1/2, S. 107 bis 113. 1922.

Durch die vorliegende Untersuchung sollte festgestellt werden, ob beim Hunde die am Darm und der Blase wirksamen Schmerzreize dem Gehirn auf den Wegen der zentripetalen spinalen Bahnen, d. h. durch die hinteren Rückenmarkswurzeln zugeleitet werden oder durch besondere sympathische sensible auf dem Wege der vorderen Wurzel ziehende Fasern. Die Tiere wurden in Morphin-Äthernarkose operiert, und zwar so, daß das Rückenmark in bestimmter Höhe zumeist zwischen 9. und 11. Thorakalsegment quer durchtrennt wurde und darüber gelegene hintere Wurzeln beiderseits durchschnitten wurden. Die Prüfung der Sensibilität wurde einige Tage später vorgenommen und zwar an der Harnblase durch Anwendung starker faradischer Reize, am Darm durch Aufblasen eines eingeführten Gummiballons oder Hervorrufen einer Contractur mittels 5proz. Bariumchloridlösung, die entweder aufgepinselt oder in die Mesenterialarterie eingespritzt wurde. Der Einfluß der Zerrung und Dehnung des Mesenteriums kann dabei als ausgeschaltet betrachtet werden, denn es kann sowohl der frei bewegliche wie der am Mesenterium straffer befestigte Dickdarm Ausgangsstelle der experimentellen Kolik sein. Die Schmerzreize der untersuchten visceralen Organe (Dünndarm, Dickdarm, Harnblase, Arterien) werden nur auf dem Wege der Nerven des vegetativen Systems zum Rückenmark geleitet. Der Übertritt aus den sympathischen und parasympathischen Nervenstämmen in das Rückenmark erfolgt ausschließlich in den hinteren spinalen Wurzeln. Die vorderen Rückenmarkswurzeln sind an der Schmerzleitung nicht beteiligt. Die adäquaten schmerzauslösenden Reize für die visceralen Hohlorgane sind Dehnung und aktive krampfartige Contractur, nicht aber

Anämie. Die Schmerzimpulse verlaufen aus der Harnblase durch die Nervi pelvici in die hinteren Sakralwurzeln, jene des Darms durch die Nervi splanchnici majores und minores, sowie die Nervi hypogastrici in die hinteren Wurzeln vornehmlich des Thorakalmarkes. Sowohl vom Dünndarm als auch vom Dickdarm lassen sich durch Aufblähen bzw. Erzeugung spastischer Contractur Schmerzen auslösen. Periphere intraarterielle Injektion von Chlorbaryum verursacht heftigen Schmerz, Injektion von Adrenalin aber nicht.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Kuntz, Albert: On the occurrence of reflex arcs in the myenteric and submucous plexuses. (Über das Vorkommen von Reflexbögen im plexus myentericus und submucosus.) (St. Louis univ. school of med.) Anat. record Bd. 24, Nr. 4, S. 193 bis 210. 1922.

Im Plexus myentericus finden sich Neurone mit kurzen, sich häufig verästelnden Dendriten und solche mit weniger langen und selten sich verästelnden Dendriten, im Plexus submucosus kommen Neurone mit etwas längeren Dendriten vor. Mit Hilfe der vitalen Methylenblau-methode konnte Verf. feststellen, daß präganglionäre Fasern und solche vom Plexus submucosus in Synapse treten mit Neuronen im Plexus myentericus. Es kommen Synapsen vor zwischen Neuronen desselben Ganglion und solchen getrennter Ganglien; solche Synapsen zweier Neuronen im Darmplexus bedingen einen Reflexbogen. Eine Synapse wird in der Weise gebildet, daß der Achsenzylinder am Ende sich verästelt und um den Zellkörper des Neuronen, mit dem er sich verbindet, ein pericelluläres Netz bildet. Das sympathische Nervensystem ist vornehmlich ein efferentes System. Die visceral-efferente Kette besteht aus präganglionären Neuronen im Zentralnervensystem und postganglionären Neuronen im sympathischen Ganglion. Die afferenten viscerale Impulse, die durch visceral-afferenten Neuronen vermittelt werden, können auf die präganglionären visceral-efferenten Neuronen des Rückenmarks übertragen werden und viscerale Reflexe auslösen. Rein sympathische Reflexbögen werden allgemein nicht angenommen. Nach Erik Müller besteht der Plexus myentericus im Magen nur aus Vaguszellen, im Darm aus Vagus und Sympathieelementen, während der Plexus submucosus im Magen und Darm nur aus sympathischen Elementen besteht. Auch Verf. bestätigt, daß der Plexus entericus in erster Linie von Vaguszellen geliefert wird und nimmt dies Vorwiegen aber auch für den submukösen Plexus an. Fasern, die vorzüglich im Plexus submucosus entspringen, enden in der Muscularis mucosae, zwischen den Drüsen der Mucosa und zwischen Magen und Darmepithel. Für das Vorkommen von Reflexbögen bestehen somit die anatomischen Grundlagen der Synapsen, nur die rhythmischen Kontraktionen scheinen myogener Natur zu sein.

W. Brandt (Würzburg).

Minkowski, M.: Über frühzeitige Bewegungen, Reflexe und muskuläre Reaktionen beim menschlichen Foetus und ihre Beziehungen zum fötalen Nerven- und Muskelsystem. (Geburtshilf. Abt., Kantonspit. Winterthur u. hiranat. Inst., Univ. Zürich.) Schweiz. med. Wochenschr. Jg. 52, Nr. 29, S. 721—724 u. Nr. 30, S. 751 bis 755. 1922.

Bei Anlaß von Operationen zur frühzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft aus ärztlichen Indikationen durch Kaiserschnitt unter Lokalanästhesie wurde bei der Ablösung der Eiblaste beobachtet, daß auch die jüngsten dabei zum Vorschein kommenden menschlichen Föten, und zwar solche im Alter von 2—3 Monaten, sich innerhalb der Eihüllen lebhaft bewegen. Eine Eröffnung des Amnions ist für die Beobachtung von großem Vorteil und für die Lebensäußerungen des Foetus nicht weiter hemmend, wenn die Temperatur der umgebenden Flüssigkeit konstant auf 40° gehalten wird. Trotz dieser Maßnahme befindet sich das Untersuchungsobjekt nicht mehr unter physiologischen Bedingungen, denn durch das Fehlen des Placentarkreislaufs kommt es zu einer steigenden Asphyxie. Andererseits läßt sich daran denken, daß der Sauerstoffmangel für die zur Beobachtung kommenden motorischen Effekte günstig ist. Die meisten untersuchten Föten — ihre Länge betrug zwischen 6 und 23 cm — führen nach der Extraktion mehr oder weniger lebhafte Bewegungen des Kopfes, Rumpfes und der Extremitäten aus. Die Bewegungen sind langsam, asymmetrisch, arhythmisch und unkoordiniert. Thoraxbewegungen wurden nur bei den ältesten Foeten beobachtet. Die Dauer dieser Erscheinungen übersteigt selten wenige Minuten, sie können aber durch äußere Reize in Form von verschiedenen Reflexen ausgelöst werden. Dabei handelt es sich zumeist nicht um isolierte Reflexe, die sich z. B. auf die gereizte Extre-

mität erstrecken, sondern um Bewegungen, die auf die übrigen Extremitäten übergreifen. Man kann wohl sagen, daß jeder Hautabschnitt als reflexogene Zone für sehr variable Reaktionen dienen kann, welche die Neigung haben, sich mehr oder weniger über den ganzen fötalen Organismus auszubreiten. Oft werden sog. diagonale Reflexe beobachtet, indem die Reizung eines Fußes in ziemlich konstanter Weise eine Bewegung in der gekreuzten Hand auslöst. Ebenso gelangte Reflexhemmung zur Beobachtung sowie das Vorhandensein von Sehnen- und Labyrinthreflexen. Legt man den Foetus aus einer vertikalen Stellung horizontal hin, so beobachtet man am häufigsten in den Extremitäten bilaterale-symmetrische Bewegungen. Gewisse Muskeln (Biceps und Pectoralis) können sehr leicht mechanisch erregt werden. Der Unterschied in der Erregbarkeit verschiedener Muskeln hängt wohl mit dem zeitlichen Unterschied in ihrer strukturellen Differenzierung zusammen. An der fötalen Herztätigkeit ist die große Labilität des Rhythmus, besonders in Abhängigkeit von der Temperatur auffallend. Daß es sich bei den Reflexerscheinungen wirklich um echte Reflexe handelt, ergab sich durch Durchschneidungsversuche am Rückenmark in verschiedenen Höhen. Dem frühzeitigen Erscheinen von Labyrinthreflexen entspricht eine besonders frühe, schon bei 4 c langen Föten bereits vollkommen differenzierte Entwicklung des Vestibularapparates. Die geschilderten Beobachtungen bieten auch in pathologisch-physiologischer Beziehung viel Interessantes.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Schrijver, D.: Ein Zehenreflex und seine Bedeutung bei Psychosen. Zeitschrift f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 79, H. 4/5, S. 398—411. 1922.

Beschreibung eines Reflexes, der sich in einer Plantarflexion aller Zehen des betreffenden Beines äußert und durch Beklopfen der medialen Tibiafläche, des Lig. patellae und des ganzen Oberschenkels ausgelöst wird. Er fand sich besonders bei Katatonikern und Hebephrenen (in 28 bzw. 38% der Fälle), aber auch gelegentlich bei allen anderen Geisteskrankheiten. Der Reflex hat mit dem Fußrückenreflex von Mendel-Bechterew nichts zu tun, ist kein Zeichen der Pyramidenbahnläsion, kommt aber auch neben Pyramidenzeichen vor. Es bestand kein Parallelismus zwischen der Stärke des Reflexes und der allgemeinen Reflexerregbarkeit. Von der Mendel-Bechterewschen Stelle ließ er sich nur selten auslösen. Er war meist unsymmetrisch vorhanden. Da der Reflex besonders bei Dementia praecox-Kranken häufig und stark ausgeprägt war, vermutet Verf. einen Zusammenhang mit Liquordrucksteigerung und Hirnanschwellung.

E. Küppers (Freiburg i. B.).

Radovici, A.: La sémiologie du réflexe palmo-mentonnier. (Das Verhalten des Handflächen-Kinnreflexes.) Ann. de méd. Bd. 12, Nr. 1, S. 56—63. 1921.

Der Reflex, der 1920 von Marinesco und Radovici (vgl. diese Berichte 4, 5) beschrieben wurde, besteht in einer Zusammenziehung der gleichseitigen Kinnmuskulatur bei Reizung der Haut über dem Daumen. Er ist beim Gesunden fast konstant auf der rechten Seite schwächer, ein Verhalten, das der Autor mit der höheren Differenzierung des rechten Armes erklärt. Die Prüfung des Reflexes ist ein Hilfsmittel zur Diagnose des Sitzes einer Pyramidenläsion. Einseitige Steigerung zeigt eine Störung oberhalb des Facialisernes an (z. B. bei der Kapselhemiplegie). Doppelseitige Steigerung findet sich bei Pseudobulbärparalyse, amyotrophischer Lateralsklerose usw. Nucleäre oder periphere Facialislähmung hebt den Reflex auf der Seite der Läsion auf. Eine Läsion im oberen Halsmark (C_1 — C_6) führt eine dem Babinskischen Zeichen am Fuß entsprechende Abänderung des Reflexes herbei; die Bewegung in der Kinnmuskulatur kommt nur zustande, vielmehr kommt es zu einer langsamen isolierten Extension des Daumens. Totale Zerstörung der Cervicalanschwellung geht mit Aufhebung des Reflexes einher; bei partieller Läsion, die die Segmente C_8 — D_1 verschont, kommt es bei Reizung der Handinnenfläche zu einer Zuckung in den Mm. pectorales. Bei Läsionen unterhalb D_1 ist der Handflächen-Kinnreflex ungestört.

Erna Ball (Berlin).

Arthus, Henri: Conservation intégrale de la sensibilité réflexe dans la cautérisation et dans la cobraisation. (Die uneingeschränkte Erhaltung der Reflexsensibilität bei Cauterisation und Cobraisation.)

lilität im Zustande der Curare- und Cobravergiftung.) Arch. internat. de physiol. Bd. 20, H. 2, S. 131—143. 1922.

Durch diese Experimente wird erneut der Beweis erbracht, daß durch die Wirkung des Curare- und Cobragiftes die Sensibilität nicht betroffen wird. Der herzhemmende Reflex, der durch das Eindringen von Chloroformdämpfen in die Schleimhaut der oberen Luftwege beim Kaninchen erzeugt wird, bleibt auch im Zustande der völligen Bewegungslosigkeit durch Curare und Cobra bestehen. Diese Reflexsensibilität ist dabei nicht einmal in quantitativer Weise beeinflusst, denn die Größe der Herzschlagverlangsamung ist bei Einbringen der gleichen Menge von Chloroformdämpfen dieselbe, ob das Tier vergiftet ist oder nicht. Dieser Erfolg ist deshalb beachtenswert, weil er ehrt, daß die zentripetale, dem Bewußtsein nicht unterstellte Leitung durch die genannten Gifte nicht geschädigt wird, was aus den bisher vorliegenden klassischen Untersuchungen von Claude Bernard bei Curare-, Arthus bei Cobravergiftung nicht mit voller Sicherheit zu erschließen war. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. Br.).

Zondek, S. G.: Über das Wesen der Vagus- und Sympathicusfunktion. Die Identität von Nerv- und Ionenwirkung. (*Pharmakol. Inst., Univ. Berlin.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 132, H. 4/6, S. 362—392. 1922.

Von der Tatsache ausgehend, daß die Funktion der Organe sowohl von dem Gleichgewicht der vegetativen Nerven (Vagus und Sympathicus) wie dem Gleichgewicht bestimmter anorganischer Kationen (Na, K, Ca) abhängt, wurde der Frage nachgegangen, ob zwischen der Nerven- und Kationenwirkung nicht irgendwelche Beziehungen bestehen. Die Untersuchungen, die sich auf die verschiedensten Organe erstreckten, ergaben folgendes: Die Natrium- und Kaliumwirkung entspricht immer der Vaguswirkung, die Calciumwirkung dagegen im Prinzip immer der Sympathicuswirkung. Wo Vagusreizung erregend wirkt (Darm, Blase usw.), wirkt auch Natrium- und Kaliumzufuhr (d. h. künstliche Natrium- und Kaliumkonzentrierung) erregend; wo Vagusreizung hemmend wirkt (Herz), wirkt auch Kalium hemmend. Das gleiche gilt für den Sympathicus und das Calcium. Natrium, Kalium und Calcium machen die Schwankungen der Vagus- und Sympathicuswirkung immer in entsprechender Weise mit. Nerv- und Ionenwirkung verlaufen aber nicht nur parallel, sondern sind auch wesensgleich. Sie lassen sich untereinander austauschen. Die Natrium- und Kaliumwirkung kommt auch nach Ausschaltung des Vagus zustande; dagegen bleibt gewöhnlich die Wirkung einer Vagusreizung nach Entfernung des Natriums und Kaliums aus. Auch Sympathicusreizung bei Fehlen von Calcium ist meist erfolglos. Kommt eine Nervenwirkung doch zustande, so ist sie meist in ihrer Art verändert. Die Beziehungen, die zwischen Nerv- und Ionenwirkung bestehen, werden folgendermaßen gedeutet. Das vegetative Nervensystem steht über dem Elektrolytssystem des Erfolgsorgans. Die vegetativen Nerven rufen letzten Endes eine Verteilungsänderung der Ionen an den Zellen hervor, und zwar der Vagus in dem Sinne, daß das Natrium und Kalium, der Sympathicus in dem Sinne, daß das Calcium im Vordergrund der Zellwirkung steht. Erst die Änderung des Kationengleichgewichtes ruft die Funktionsänderung der Organe hervor und leitet die Prozesse ein, die wir den vegetativen Nerven zuzuschreiben gewohnt sind. Besteht das Wesen der Vagus- und Sympathicuswirkung darin, die Ionenzufuhr zur Zelle zu regulieren, so muß eine gestörte Vagus- und Sympathicusfunktion zu einer Störung dieser Ionenregulierung führen. Bei allen Krankheitszuständen, die auf einen abnormen Erregungsablauf im vegetativen Nervensystem zurückgeführt werden können, müssen daher Störungen im Elektrolytssystem vorliegen. Hieraus lassen sich neue Gesichtspunkte für die Pathologie wie Therapie der sog. funktionellen Organstörungen ableiten. *Zondek.*

Burn J. H.: The relation of nerve-supply and blood flow to sweating produced by pilocarpine. (Die Beziehung zwischen Nervenversorgung und Blutströmung zur Schweißsekretion unter dem Einfluß von Pilocarpin.) (*Nat. Inst. f. med. research, London.*) Journ. of physiol. Bd. 56, Nr. 3/4, S. 232—247. 1922.

Die Schweißsekretion auf der Fußsole der Katze ist quantitativ im allgemeinen

nicht leicht zu verfolgen. Trotzdem ist es Verf. gelungen, eine einigermaßen brauchbare Methode ausfindig zu machen, die darin besteht, daß man den Schweiß auf kleinen gewogenen Stücken von trockenem Filtrierpapier auffängt. Die Experimente wurden an Kätzchen im Alter von 2—3 Monaten streng aseptisch im Zustand von Äthernästhes durchgeführt. Die vollständige Degeneration der sympathischen Nerven führt zu keiner Verminderung der Wirkung des Pilocarpins auf die Schweißdrüsen des Kätzfußes. Es wird häufig sogar mehr Schweiß abgesondert als sonst. Degeneration des gesamten gemischten Nervenstammes für das Bein ist unmittelbar gefolgt von einer stärkeren Schweißsekretion, zumeist aber nach einer wechselnd langen Zeit von einer erheblichen Verminderung der Schweißabgabe auf Pilocarpin. Parallel mit den Veränderungen in der Schweißsekretion im Gefolge einer bloßen Nerven-Sympathicus- oder vollständigen Degeneration gehen Veränderungen in der vasodilatatorischen Reaktion des Beines auf Histamin einher, und zwar im Sinne ihrer Herabsetzung. Gleichzeitig treten in der Haut trophische Störungen auf. Alle 3 Veränderungen sind vermutlich auf eine Störung in der normalen peripheren Blutversorgung zurückzuführen. Durch subcutane Injektion von Adrenalin kann die nach völliger Denervation herabgesetzte Schweißsekretion auf Pilocarpin wenigstens für eine Zeitlang wiederhergestellt werden.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Goering, Dora: Nachtrag zur Arbeit: „Über den Einfluß des Nervensystems auf das Fettgewebe.“ Siehe diese Zeitschrift 8, S. 312. Zeitschr. f. d. ges. Konstitutionsl. Bd. 8, H. 5, S. 458. 1922.

Es sind Fälle von Fettleibigkeit wie bei Dystrophia adiposogenitalis nach Encephalitis epidemica, die nicht weiter angeführt oder kritisch besprochen werden, beschrieben. Bei der häufigen Lokalisation der encephalitischen Herde in den Stammganglien spricht nach Verf. diese Fettentwicklung für die „Existenz eines Zentrums für das Fettgewebe im Zwischenhirn“ (vgl. diese Berichte 15, 279.)

A. Simons (Berlin).

Valentin, Bruno: Die Nervenvereisung. (Univ.-Klin. f. orthop. Chirurg., Frankfurt a. M.) Med. Klinik Jg. 18, Nr. 42, S. 1337—1339. 1922.

Das vom Autor gemeinsam mit Bielschowsky angestellte Studium der Degenerationsvorgänge an vereisten Nerven im Tierexperiment hat den Vorteil, daß man die Schädigung dosieren und dementsprechend raschere oder langsamere Regeneration erzielen kann. Das rasche Eintreten der Regeneration nach Vereisung ist darauf zurückzuführen, daß sich die Blutgefäße des Nerven sehr bald erholen. Auf der vereisten Strecke erfolgt ein ganz rapider Zerfall von Nervenfasern, ebenso rasche Beseitigung der Zerfallprodukte und Regeneration von den Stümpfen aus. Schon nach 3. Tage nach der Operation ist der größte Teil der zerstörten Nervenfasern durch die Schwannschen Zellen und die endoneuralen Bindegewebszellen resorbiert, während letztere bei keiner andern Schädigung so frühzeitig und so reichlich auftreten. Der rasche Ablauf der Prozesse hat zur Folge, daß man, anders als bei anderen Querschnittsläsionen, ein eigenartiges Nebeneinander von Degenerations- und Regenerationsvorgängen beobachten kann, offenbar deshalb, weil hier die jungen Nervenfasern, ohne Bindegewebe oder Narbe durchwachsen zu müssen, direkt in die präformierten Bahnen gelangen.

Erwin Weisberg (Wien).

Ferrarini, G.: Sur l'énervation de la parotide. (Über die Entnervung der Parotis.) Arch. ital. de biol. Bd. 71, H. 1, S. 40—63. 1922.

Durchschneidung der Chorda tympani führt zu einer stetigen Verminderung des Volumens und des Gewichtes der Parotis und Submaxillaris, so zwar, daß am Ende des zweiten Monats ein Gewicht erreicht wird, das dem bei jugendlichen Individuen entspricht. Beläßt man die Versuchstiere — Hunde — dann noch am Leben, so nimmt die Drüse weiter an Bestand ab. Es kommt zu einer mehr oder weniger disseminierten einfachen Atrophie des Organs; eine epitheliale Nekrose kommt selten zur Beobachtung. Das interstitielle Bindegewebe erfährt eine Verbreiterung und Vermehrung, sowie eine ödematöse Durchtränkung, doch ohne daß es jemals zu einer wirklichen Sklerosierung des Drüsenparenchyms kommt. Durchschneidung des Nervus auriculotemporalis führt

Menschen führt zu einem dauernden Stillstand der Ohrspeicheldrüsensekretion, doch nicht unmittelbar im Anschluß an die Operation, sondern erst im Verlaufe einiger Tage.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Takahashi, N.: Hodenatrophie nach Exstirpation des abdominalen Grenzstranges. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 196, H. 2, S. 237–242. 1922.

Der Einfluß der sympathischen Innervation auf ein Gewebe kann auch auf die Weise geprüft werden, daß man nach operativer Entfernung der Nerven nachsieht, ob eine Gewichtsverminderung auftritt. Einseitige Exstirpation des Bauchsympathicus im Bereiche der unteren drei Lumbal- und oberen ersten bis zweiten Sakralwirbel bleibt ohne Rückwirkung auf den Massenbestand von Niere, Nebenniere, Ovarien, Hinterschenkelskeletteile und Arterienstücke der gleichen Seite. Am Hoden ergab sich dagegen ein ganz prägnanter Effekt. Bei Wägung, Messung und histologischer Untersuchung erwies sich der der operierten Seite als atrophisch. Aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dieser Erscheinung nicht um die Wirkung von Nebenverletzungen.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Lashley, K. S.: Studies of cerebral function in learning. Nr. III. The motor areas. (Studien über die cerebrale Funktion beim Lernakt. III. Die motorischen Zonen.) (*Dep. of psychol., univ. of Minnesota, Minneapolis.*) Brain Bd. 44, Tl. 3, S. 255–285. 1921.

Verf. hat in früheren Arbeiten dargetan, daß Ratten, die man auf Lichtreize dressiert hatte, diese erlernte Fähigkeit bei Zerstörung der Area striata verloren, nicht aber bei Zerstörung der elektrisch erregbaren Region. Die vorliegende Arbeit bringt nun analoge Untersuchungen bei Abtrennung der motorischen Rinde und Zerstörung des Nucleus caudatus beiderseits. In einer ersten Versuchsreihe wurden die genannten Partien beider Hirnhälften zerstört bzw. abgetrennt, und dann wurde die Dressur vorgenommen. Die Tiere mußten ihr Futter aus dem erleuchteten Teil einer Versuchskammer holen. Es zeigte sich, daß die vorher vorgenommene Operation keinen Einfluß auf den Erlernungsprozeß hatte. In der zweiten Versuchsreihe wurden die Tiere zuerst auf das optische Signal dressiert, und dann wurde die beschriebene Operation an ihnen vorgenommen. Dabei zeigten sich bei allen Tieren deutliche Residuen der erlernten Reaktion. Die Tiere brauchten viel weniger Wiederholungen der Reaktion als beim ursprünglichen Erlernen. Diese Versuche zeigen, daß der Reflexbogen dieses bedingten Reflexes weder über die elektrisch erregbare Zone des Gehirns noch über den Nucleus caudatus geht. Nur die Area striata ist bei der Ratte an dem Zustandekommen der Lichtunterscheidung beteiligt. Die Bahn dieses bedingten Reflexes muß von der Area striata über die occipito-thalamischen Fasern gehen. Bei einseitiger Läsion der motorischen Zone und des Nucleus caudatus zeigten die operierten Tiere Haltungsanomalien, sie drehten sich nach der verletzten Seite. Die elektrisch erregbare Zone und der Nucleus caudatus haben mit der Regulation der „posturalen Reflexe“ (Sherrington) zu tun. Auch bei den höheren Säugern sind bei Fehlen der motorischen Zone Willkürbewegungen möglich (II. vgl. diese Berichte 15, 282). *Sittig* (Prag).

Wulfften Palthe, P. M. van: Psychische Funktionen während des Fliegens in großer Höhe. Psychiatr. en neurol. bladen Jg. 1922, Nr. 5, S. 280–312. 1922.

Prüfung der Aufmerksamkeit durch Anstreichen gleichartiger Zeichen in einem Text während des Fliegens. Die ersten Zeichen der Störung beginnen bei etwa 5000 m Höhe und sind in erster Linie durch den Sauerstoffmangel bedingt. Das Arbeiten geht allmählich langsamer und die Fehler häufen sich in sehr auffälliger Weise. Die Schrift wird ataktisch, es kommt zu Auslassungen von Buchstaben und Silben. Gleichzeitig besteht ein Gefühl erhöhten geistigen Wohls und eine übertriebene Idee psychischer Kapazität, verbunden mit einem auffälligen Mangel an Selbstkritik — also Erscheinungen, die an eine beginnende Alkoholvergiftung erinnern, so daß man von einem „Höhenrausch“ sprechen könnte. Es entstehen Schwierigkeiten beim Beobachten, z. B. beim Ablesen der Instrumente. „Man sieht die Dinge, ohne instande zu sein, sie

eigentlich zu begreifen.“ Die Ataxie der Schrift ist nicht durch die Kälte bedingt wie Versuche in einer Unterdruckkammer mit normaler Temperatur zeigten. Schließlich besteht eine eigentümliche Gleichgültigkeit, die z. B. beim Verf., der an sich selbst experimentierte, dazu führte, daß er in seinen Aufzeichnungen in einen burschikosen Ton verfiel, obwohl er wußte, daß sie zur Veröffentlichung bestimmt waren. — Die Arbeit sind Kurven und Schriftproben beigelegt. Küppers (Freiburg i. B.).

Naccarati, Sante: The morphologic aspect of intelligence. (Intelligenz und Körperform.) Arch. of psychol. Nr. 45, S. 1—44. 1921.

Naccarati veröffentlicht mit vielen Tabellen eigene Untersuchungen, die er über den Zusammenhang von Intelligenz und Körperbau an Studenten gemacht hat. Er schließt sich an Gedankengänge von Viola an. Er leugnet einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz und einzelnen Körperkennzeichen, glaubt aber an eine gute Korrelation zwischen ihr und dem mikrosplanchnischen Typ (schwacher Körper, überwiegende Glieder) und dem Verhältnis von Größe:Gewicht. Gleichzeitig ist dieser intelligente, mikrosplanchnische Typus mit zurücktretendem Rumpf auch noch hypertyreoid. — Die Arbeit ist interessant und nicht unkritisch. Gruhle (Heidelberg).

Sinnesorgane.

Spezielle Organfunktionen.

Schellworth, Walther W.: Rezeptionsorgane ohne Empfindung und ihr Verhältnis zu den Sinnesorganen. (Physiol. Inst., Univ. Hamburg, allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.) Zeitschr. f. Biol. Bd. 76, H. 1/3, S. 121—126. 1922.

Im Bereiche der Frage nach den Empfindungen der Tiere kann lediglich die Reaktion auf Reize der Außenwelt auf dem Reflexwege wissenschaftlich untersucht werden. Dabei ist besonders interessant festzustellen, wie sich die Reaktionen auf zwei qualitativ und quantitativ gleiche Reize zueinander verhalten, deren einer eine Sinnwahrnehmung, der andere einen Reflex auslöst. Dies kann mit genügender Sicherheit durch Bestimmung der Schwellenwerte geschehen. Nun besitzen die vegetativen Organe Rezeptionsstellen für Reize, die nachweislich keine Empfindung hervorruft. Hierher gehört der Pylorusreflex, der beim Vorhandensein von Säuren im Duodenum auftritt. Die Reflexversuche wurden an zwei Hunden mit Duodenalfistel und Einleitvorrichtung angestellt, die Geschmacksuntersuchungen geschehen am Menschen. Die Tiere wurden mit einem Brei aus gehacktem und gekochtem Fleisch mit Brot gefüttert, um Störungen, die durch größere Nahrungsbrocken im Ablauf eintreten konnten, zu vermeiden. Der in Zeitabständen von je 3 Minuten herauslaufende Speiselauf wurde gemessen und registriert, Einläufe wurden erst vorgenommen, wenn der Magen regelmäßig arbeitete. Von Zeit zu Zeit wurden Probeeinläufe mit physiologischer Kochsalzlösung gemacht, die keine Änderung des Ablaufs hervorriefen. Gegeben wurden immer 20 ccm der Säure. Als Schwellenwerte für den Reflex wurden gefunden 1/100 n-HCl, 1/120 n-Milchsäure, 1/640 n-Essigsäure, die auch bei gleichen Dosen von verschiedenen Versuchspersonen als sauer schmeckend erkannt wurden. Bei noch größerer Verdünnung versagte der Geschmack ebenso wie der Reflex. Die gleiche Schwellenbestimmung wurde an einem Magenreflex vorgenommen. Bekanntlich halten sich hypo- und hypertone Lösungen im Magen länger auf als isotonische. Als Unterschiedsschwelle wurden für den Reflex $\pm 0,1$ — $0,2\%$ von der isotonischen Lösung gefunden, bei Traubenzucker $\pm 0,4\%$. Im Geschmacksversuche gelang es unter gleichen Bedingungen einer Anzahl von Versuchspersonen mit Leichtigkeit eine Reihe von Lösungen, die um die gleichen Werte variierten, in der Reihenfolge, die ihrer Konzentration entsprach, fehlerfrei zu ordnen. Ein gleiches Verhalten wurde auch für die Konzentration von Traubenzucker im Blut, bei der die Leber beginnt, Glykogen zu bilden, bzw. die Nieren anfangen, Traubenzucker auszuschcheiden, mit zunehmender Sicherheit nachgewiesen. Diese in allen Fällen auffallend gleichen Schwellenwerte scheinen den Schluß zuzulassen, daß die Rezeptionsorgane für qualitativ gleiche

Reize auch quantitativ für diese gleichgestimmt sind, ob sie nun eine Empfindung hervorrufen oder gänzlich ohne eine solche verlaufen.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

d'Alonnes, Revault: Les schèmes présentés par les sens. (Die sinnlich dargebotenen Schemata.) *Rev. philos.* Jg. 46, Nr. 11/12, S. 316—343. 1921.

Im Anschluß an frühere Arbeiten behandelt Verf. die Rolle der summarischen Abkürzungen, der „Schemata“, im Bereiche der sinnlichen Eindrücke. Es handelt sich bei diesen Schemata nicht um Ergebnisse vereinfachender intellektueller Tätigkeit, sondern um den Charakter der Eindruckskomplexe selbst. Die seitlichen Teile der Netzhaut, überhaupt alle weniger empfindlichen Teile der Sinnesorgane, liefern z. B. solche Abkürzungen des mit maximaler Empfindlichkeit Wahrgenommenen in zahllosen Abstufungen. Die verschiedenen Grade der Schematisierung lassen sich in eine Reihe bringen mit Bezug auf die Schwelle der Empfindung. Je mehr sensorische Elemente bei der Verlagerung eines gegenständlichen Komplexes, z. B. bei seiner Annäherung an das Sinnesorgan, über die Schwelle der Empfindung treten, um so reicher, um so weniger schematisch wird der Eindruck im ganzen. Je nachdem, ob der Schwellenwert für alle Elemente des Eindrucks gleich oder nicht gleich ist, ergeben sich verschiedene Fälle, die vom Verf. mit Beispielen erläutert werden. Verf. schlägt Versuchsanordnungen zum näheren Studium der beschriebenen Tatsachen vor und weist auch auf die Bedeutung der Schemata auf dem emotionalen und motorischen Gebiet hin. — Mit der Arbeit wird eine Seite des Psychischen ins Licht gerückt, die in den meisten Darstellungen der Psychologie bisher zweifellos zu kurz gekommen ist. *Küppers.*

Frey, M. von: Versuche über schmerzerregende Reize. (*Physiol. Inst., Univ. Würzburg.*) *Zeitschr. f. Biol.* Bd. 76, H. 1/3, S. 1—24. 1922.

Die künstliche Erregung von Schmerzen mit Ausschluß aller anderen Empfindungen ist bisher auf beträchtliche Schwierigkeiten gestoßen. In der vorliegenden Abhandlung wird nun gezeigt, wie man durch geeignete Verfahrungsweisen auf den verschiedensten Wegen, mechanisch, thermisch, chemisch und elektrisch, reine Schmerzempfindungen hervorrufen kann. Zur mechanischen Reizung empfehlen sich besonders Stachelborsten, das sind Schweinsborsten, an deren einem Ende ein Stachel von *Carduus acanthoides* angekittet ist und die man sich zweckmäßig in einem Satz auf verschiedene maximale Kraft geeicht zusammenstellt. Die Stacheln müssen auf den zwischen den Druckpunkten gelegenen Flächenstücken der Haut zur Einwirkung gelangen; dabei ist jedoch die Wahl der Hautstelle durchaus nicht gleichgültig. Die Oberhaut soll von zarter Beschaffenheit sein, weiter dürfen die Haare nicht so dicht stehen, daß jeder Reiz als Berührung empfunden wird. Von hoher Empfindlichkeit ist die Haut des Halses. Vorzüglich geeignet zur Auslösung rein schmerzhafter Empfindungen (Stechen, Brennen, Jucken) ist die Haut über dem Schlüsselbein. Die Reize pflegen langdauerndes Jucken zu hinterlassen. Sehr bemerkenswert ist die Verspätung der Schmerzempfindung, die bei den schwächeren Reizen die Regel bildet und sich auf viele Sekunden erstrecken kann. Das geeignete Verfahren zur Erzeugung reiner Schmerzempfindungen auf thermischem Wege stellt der Hohlspiegel oder die Sammellinse dar, wenn man mit ihrer Hilfe ein scharfes Sonnenbildchen auf der Haut entwirft. Die Abstufung dieser Reize ist durch Blenden möglich. Reine Schmerzempfindung kann auch durch das Aufbringen von ätzenden Stoffen, vor allem Mineralsäuren, erzeugt werden. Entsprechend der reichen Versorgung der Epidermis mit Schmerznerven ist die Zahl der Stellen, auf denen chemische Reize Schmerz bzw. Jucken erregen, sehr groß. Von welcher Art der Auslösungsvorgang ist, läßt sich zur Zeit nicht sagen. Zur elektrischen Reizung nimmt man als differente Elektrode dünnen Draht oder eine Pinsel-Elektrode mit feiner Spitze. Haarlose Flächen scheiden hierbei vollkommen aus. Die faradische Reizung soll nur wenige Sekunden dauern. Beläßt man die differente Elektrode längere Zeit an demselben Orte, so kommt es praktisch überall neben dem Stechen auch zum Schwirren. Alle Erfahrungen stimmen darin überein, daß der faradisch

auslösbarer Schmerz genau so wie der mechanisch, thermisch oder chemisch erzeugte, zwar von andersartigen Empfindungen begleitet sein kann, aber von ihnen weder beeinflusst, noch durch sie bedingt ist. Damit verliert die Annahme, daß ihr Drucksinns- oder Berührungssinn die Vermittler des Schmerzes seien, ihre Grundlage. Hervorzuheben ist noch, daß durch jedes der hier gebrauchten vier Reizmittel, wenn sie wirksam überschwellig sind, Jucken ausgelöst werden kann, und zwar nicht als Begleiterscheinung andersartiger Empfindungen, sondern als eine der Formen, in denen der Schmerz auftritt.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.)

Frey, M. von: Verspätete Schmerzempfindungen. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie Bd. 79, H. 1/3, S. 324—333. 1922.

Durch jede Art von Reiz, sei er mechanisch (Verwendung einer Stachelborsche Nadel), chemisch, thermisch oder faradisch, ist es möglich, Schmerz in reiner Form, also ohne Begleitung anderer Empfindungen, zu erregen. Voraussetzung dabei ist, daß die Reize im wesentlichen nur die Oberhaut treffen, was beim Aufbringen chemisch wirksamer Stoffe ohne weiteres gewährleistet ist, für die übrigen Reize durch gleichzeitige Einschränkung von Ausdehnung und Stärke erreicht werden kann. Unter solchen Bedingungen treten die dem oberflächlichen System der Schmerznerven eigentümlichen Formen der Empfindung gesondert in Erscheinung, die als Stechen, Brennen, Kratzen, Beißen bezeichnet werden. Hierher gehört auch das Jucken, das eine qualitativ niedrige Stufe des oberflächlichen Schmerzes darstellt. Die auf solche Weise erregten Schmerzen zeichnen sich sämtlich durch den verspäteten Eintritt wie durch eine weitgehende Abhängigkeit ihres zeitlichen Verhaltens von dem des Reizes aus. Es kann daher die verspätete Schmerzempfindung an sich noch nicht als etwas Krankhaftes gelten, wenn nicht die Verspätung eine ungewöhnlich große oder die Schmerzhaftigkeit übermäßige ist. Auch für die doppelte Schmerzempfindung lassen sich Beispiele aus dem Bereich des normalen Verhaltens beibringen, wobei wahrscheinlich ist, daß die erste zeitlich mit dem Reiz zusammenfallende Schmerz als unmittelbare Nerven-erregung, der zweite als mittelbare aufzufassen ist.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.)

Frey, M. von: Zur Physiologie der Juckempfindung. (Physiol. Inst., Universität Würzburg.) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 137 bis 145. 1922.

Während die Frage nach den die Haut versorgenden rezeptorischen Nerven im wesentlichen als geklärt gelten darf, kann das von den durch sie vermittelten Empfindungsarten noch nicht gesagt werden. So fehlt z. B. eine befriedigende physiologische Deutung der unter den Bezeichnungen Kitzel und Jucken bekannten Erscheinungen. Bei Versuchen zur Erregung von jenen Schmerzformen, die der Gruppe der Epidermis-schmerzen zugeteilt werden müssen und mit Hilfe einer Distelstachel auszulösen sich hat sich ergeben, daß alle schwellennahen Reize ausschließlich oder im Wechsel mit schmerzhaften Empfindungen Jucken hervorrufen. Die Versuche müssen an den peripheren Abschnitten der Glieder und am Rumpf angestellt werden, wobei man sich abseits von den Haarbälgen zu halten hat, um keine Druck- oder Berührungsempfindungen zu erzeugen. Jucken und Schmerz werden also durch die gleiche Reizung hervorgerufen, die Dichte der erregbaren Orte und der zeitliche Ablauf der Erregungen sind für beide im wesentlichen übereinstimmend, so daß es gerechtfertigt ist, beide dem selben nervösen Apparat zuzuteilen, der auf schwache Reize mit Jucken, auf stärkere mit schmerzhaften Empfindungen antwortet. Wird die Schmerzempfindlichkeit an einer Hautstelle durch Kataphorese aufgehoben, so ist auch Jucken nicht mehr auslösbar. Für die Erregung von Jucken ist noch eine weitere Bedingung von Bedeutung, nämlich die gleichzeitige oder doch in große zeitliche Nähe gerückte Reizung einer Anzahl benachbarter Hautstellen. Die Erscheinung der gegenseitigen Verstärkung von Erregungen, wie sie auch auf anderen Sinnesgebieten bekannt ist, spielt hier offenbar eine wichtige Rolle.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.)

Hoche, A.: Der Schmerz und seine Behandlung. Dtsch. med. Wochenschr. Jg. 48, Nr. 37, S. 1246—1248. 1922.

In der Einleitung dieser sehr interessanten Abhandlung wird das Schmerzproblem von der psychologischen und physiologischen Seite her beleuchtet. Es werden sodann die Wirkungen und Arten des Schmerzes mit ihrer eigenen Färbung besprochen, endlich seine Behandlung, die natürlich außerordentlich stark wechselt von der rein örtlichen bis zur allgemeinen, die beide darauf ausgehen, den ursächlichen krankhaften Prozeß zu heilen. Es verbleiben aber noch genügend tragische Fälle, in denen der Schmerz nur als bloßes Symptom beseitigt werden kann.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Kraepelin, Emil: Zur Kenntnis des Drucksinns der Haut. Psychol. Arb. Bd. 7, H. 3, S. 413—441. 1922.

Verf. bestimmte an 2 Versuchspersonen Druckschwellenwerte und untersuchte eine Reihe von Einflüssen auf die erhaltene Größe, vor allem den der Ermüdung. Zu den Versuchen wurde eine kleine Papiertüte benutzt, an der eine Nadelspitze von ca. 1 qmm Fläche befestigt war, die mit verschiedenen Gewichten belastet wurde. Die gemessenen Schwellenwerte betrugen im Durchschnitt 0,097 bzw. 0,088 g am Nagelglied des rechten Mittelfingers. Man kann natürlich rechtmäßig nicht von einem Schwellenwert sprechen, sondern nur von einem Schwellengebiet, denn die Festlegung eines Schwellenwertes ist innerhalb ziemlich weiter Grenzen an eine lange Reihe bestimmter Voraussetzungen gebunden, zu denen vor allem Übung und Ermüdung gehören. Im Laufe einer längeren Versuchszeit kann nämlich die Übung das ganze Schwellengebiet verschieben, und zwar so, daß die zweiten Reihen eines Versuchstages bessere Ergebnisse liefern als die ersten. Weiter wird der Ausfall der Proben stark durch die Einstellung der Aufmerksamkeit beeinflußt, aber auch durch örtliche Vorgänge in den Sinneswerkzeugen der Haut. Von besonderem Interesse ist die Feststellung, daß der Abstumpfung der Empfindlichkeit unter der Einwirkung schwacher Reize eine bald rascher, bald langsamer sich entwickelnde Steigerung derselben vorausgeht, und ebenso die nur nebenher ermittelte Tatsache, daß sich im Anschluß an Ermüdungsversuche an der entsprechenden Hautstelle der anderen Seite eine beträchtliche Steigerung der Empfindlichkeit nachweisen ließ. Die individuelle Verschiedenheit des Verhaltens der Erregbarkeitssteigerung könnte einen Hinweis bilden, daß auch die Beschäftigung und ihre Art einer der bestimmenden Faktoren bei den Schwellenwerten ist.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Borak, Jonas: Zur Physiologie der Gewichtsempfindung auf Grund von Versuchen an Amputierten. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. III, Bd. 129, H. 4/10, S. 53—82. 1920.

Die Gewichtsempfindungen wurden auf beiden Armen, dem gesunden und dem nach Sauerbruch operierten Amputationsstumpf statisch und dynamisch geprüft. Im ersten Falle wird der Arm bloß belastet, im zweiten Falle wird zugleich eine Hebung und Senkung des Gewichtes mittels einer Muskelkontraktion am amputierten, bzw. eine Gelenkbewegung am gesunden Arm an der Versuchsperson vorgenommen. Die Vorrichtung am gesunden Arm bestand in einer zusammenschürbaren, der Weite nach regulierbaren Ledermanschette, an welcher die Wagschale angehängt wird. Ebenso wurde eine Wagschale an dem Amputationsstumpf befestigt. So konnte die Bedeutung der Muskelkontraktion für die Beurteilung von Gewichtsunterschieden gesondert vom Einfluß der Gelenkbewegungen untersucht werden. Bei dynamischer Prüfung von Gewichten sind die Unterschiedsschwellen am amputierten und gesunden Arme gleich. Die auf diese Weise entstandenen Gewichtsempfindungen sind somit größtenteils als durch Muskelzusammenziehung hervorgerufen anzusehen. Die durch dynamische Prüfung feststellbaren Unterschiedsschwellen sind am amputierten und gesunden Arme niedriger als die durch statische Gewichtsprüfung gewonnenen. Es sind somit die sensiblen Nervenendigungen in den Muskeln für Gewichtsunterschiede empfindlicher als in der äußeren Decke; das besagt, daß die Empfindlichkeit für Veränderungen des

Kontraktionszustands größer ist als für bloße Dehnungen bzw. Deformationen der Oberfläche.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Bidou, Gabriel: Compas d'orientation du pied. (Ein Orientierungszirkel für den Fuß.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 174, Nr. 2 S. 1370—1372. 1922.

Beschreibung eines Apparates, der über die Stellung des Fußes unter normalen und krankhaften Bedingungen Aufschluß gibt, und zwar durch Angabe der Winkel in bezug auf ein festes Koordinatensystem. Gemessen wird die Stellung des Fußes im Verhältnis zu Bein, sowie die Veränderung der Winkel zu drei Normalebenen, der horizontalen, vertikalen und frontalen. Deformitäten können so auf wissenschaftlicher Grundlage festgestellt und ausgeglichen werden.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

● **Kenneth, John H.: Osmics. The science of smell.** (Osmische Studien. Die Wissenschaft vom Geruch.) Edinburgh: Oliver & Boyd 1922. 42 S.

Bei dieser Schrift handelt es sich um eine Zusammenstellung der bisher vorliegenden Arbeiten über Geruchsstoffe und die Leistungen unseres Geruchsorgans, die erweitert und weitergeführt werden soll. Der Verf. führt neue englische Ausdrücke in die Terminologie dieses Arbeitsgebietes ein; das besagt schon der Titel.

Emil v. Skramlik.

Watson, Edwin Roy: Smell. (Der Geruch.) (Daccacoll., Dacca, Eastern Bengal Biochem. Journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 613—618. 1922.

Zweck der vorliegenden Untersuchung war das Ausfindigmachen einer Methode, mit deren Hilfe man Gerüche genau und wissenschaftlich beschreiben kann. Dabei fiel der Parallelismus auf, der zwischen der Beeinflussung der Oberflächenspannung von wässrigen Lösungen verschiedener Duftstoffe und der Intensität ihres Geruchs besteht. Von 22 untersuchten Riechstoffen lassen sich 17 so in einer Reihe anordnen, daß die Intensität ihres Geruchs, gemessen an den Schwellenwerten der Empfindung, ansteigt. Dann kann man gleichzeitig feststellen, daß ihre Befähigung zur Steigerung der Oberflächenspannung sinkt. Eine Ausnahme von dieser Regel machen vor allem Ammoniak, Pyridin und Äthylmercaptan. Prüft man weiter die Adsorption dieser Substanzen durch Tierkohle, so gleicht sich der zuletzt gefundene Unterschied einigermaßen aus, indem Pyridin und Äthylmercaptan mit den anderen in eine Reihe bringen sind. Man kann deshalb wohl als allgemeine Regel aufstellen, daß diejenigen Substanzen den intensivsten Geruch aufweisen, die in wässriger Lösung von Tierkohle adsorbiert werden.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Ohma, S.: La classification des odeurs aromatiques en sous-classes. (Die Klassifikation der aromatischen Gerüche in Unterabteilungen.) (Laborat. de physiologie, univ., Utrecht.) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 6, Lieferung S. 567—590. 1922.

Auf Grund von Ermüdungsversuchen durch Verdampfung verschiedener Duftstofflösungen in einer entsprechend gebauten Kammer und der Bestimmung von Schwellenwerten für eine Anzahl von Riechstoffen im normalen Zustand kommt Verf. zum Schluß, daß es sich empfiehlt, die von Linné eingeführte Klasse der aromatischen Gerüche zu belassen. Sie wird aber zweckmäßig in 3 Unterabteilungen geschieden: In die Bittermandelgerüche, die Campher- und Gewürz- sowie die Citralgerüche. Das Zentrum der Klasse der aromatischen Gerüche wird durch den Duft der Gewürze und des Camphers gebildet, unter denen dem Eucalyptol eine besondere Stelle zuzuweisen ist.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Liljestrand, G.: Über den Schwellenwert des sauren Geschmacks. (Physiolog. chem. Laborat., Karolinisches Inst., Stockholm.) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 532—537. 1922.

Verf. stellte den Schwellenwert für den Geschmack einer Anzahl von Säuren fest, deren Wasserstoffionenkonzentration nach der colorimetrischen Methode bestimmt wurde. Für die Mineralsäuren (Salz-, Salpeter- und Schwefelsäure) ergab sich so ein p_H von 3,4—3,5, während für die schwachen Säuren (Essig-, Milch-, Citronen-, Ameisen- und Buttersäure) ein p_H von 3,7—3,9 ermittelt wurde. Von Interesse war, daß die

Pufferlösung von $p_H = 3,9$ einen stark sauren Geschmack aufwies, der im Gegensatz zu dem rasch verschwindenden, außerordentlich schwachen Geschmack bei den verdünnten Säuren bestehen blieb, während die Lösung im Munde gehalten wurde. Tatsächlich konnte eine Verminderung der Zahl der freien Wasserstoffionen, bei den geprüften Säuren festgestellt werden, wenn sie längere Zeit im Munde belassen werden (Beimengung von Speichel). Andererseits ist man bei genügender Basenkapazität der verwendeten Lösungen imstande, die Empfindung sauer ziemlich in der Nähe des Neutralitätspunktes zu bekommen. Die Empfindlichkeit der Geschmacksorgane für freie H-Ionen ist deshalb etwa 1000 mal so groß wie es nach älteren Bestimmungen den Anschein hatte.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Renqvist, Yrjö: Ein Versuch, den Geschmacksreiz des Wasserstoffsuperoxydes als einen im Geschmackssystem stattfindenden chemischen Prozeß aufzufassen. (*Physiol. Inst., Univ. Helsingfors.*) Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 42, H. 5/6, S. 273 bis 280. 1922.

Unter Geschmackssystem versteht Verf. jenes heterogene System, das sich aus den Geschmackszellen und der im Munde befindlichen schmeckenden Lösung zusammensetzt. Wenn die im System befindliche schmeckbare Substanz chemisch indifferent ist, dürfte der Adsorptionsprozeß als der Reiz für die Geschmacksempfindung aufzufassen sein. Wenn dagegen die zu schmeckende Substanz mit der festen oder festflüssigen Phase oder Substanz des Geschmackssystems reagieren kann, ist es wahrscheinlich, daß die Energie des stattfindenden chemischen Prozesses als der Reiz zu betrachten ist. Als solche Substanz wurde Wasserstoffsuperoxyd in wässriger Lösung gewählt. Es wird eine Gleichung aufgestellt, deren Gültigkeit geprüft wird. Die Berechnungen ehren, daß man als Reiz der Geschmacksempfindung tatsächlich den durch diese Substanz im Geschmackssystem hervorgerufenen chemischen Prozeß auffassen kann.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).

Roasenda, G.: Nuovo processo di esame della sensibilità gustativa nelle paralisi facciali periferiche. (Eine neue Geschmackssinnprüfung bei peripheren Facialislähmungen.) (*Inst. di neuropat., univ. Torino.*) Policlinico, sez. med. Bd. 29, H. 9, S. 509—518. 1922.

Führt man bei einer Stromstärke von 10—12 Milliamp. die Anode (Elektrode von 4 cm Durchmesser) längs der Dornfortsätze der Halswirbelsäule von unten nach oben, während die Kathode (Platte von 8—100 qcm) auf dem Brustbein liegt, so hat die Versuchsperson eine Geschmacksempfindung an der Zungenbasis, solange die Anode über den unteren Halswirbeln liegt; sobald dann die Elektrode die mittlere oder obere Halswirbelsäule erreicht, tritt eine Geschmacksempfindung in der Schleimhaut des vorderen Zungenabschnittes auf, und zwar gleichmäßig auf beiden Seiten.

Als Grundlage der Erscheinung nimmt Roasenda an, daß bei tiefem Sitz der Anode die aus dem Glossopharyngeus stammenden Geschmacksfasern, bei hohem Sitz die Fasern der Chorda tympani in ihrer Verlaufsstrecke zur Zunge gereizt werden. In Fällen von peripherer Facialislähmung mit Sitz der Läsion im Canalis Fallopii oberhalb des Abganges der Chordafasern läßt sich mit der angegebenen Methode in den meisten Fällen eine Abschwächung oder vollständiges Fehlen der Geschmackssensation auf dem vorderen Zungenabschnitt der betroffenen Seite feststellen, auch in Fällen, in welchen mit den üblichen Geschmackssinnprüfungen keine Ausfälle nachweisbar sind. Es bedarf einiger Einübung, bis die Kranken prompte und präzise Antworten geben. Der Kranke hat anzugeben: 1. wann sich auf der Zunge eine Geschmacksempfindung bemerkbar macht; 2. wann die Geschmacksempfindung auf dem hinteren, wann auf dem vorderen Zungenabschnitt wahrgenommen wird; 3. ob die Empfindung auf beiden Zungenhälften gleich stark merkbar oder auf einer Seite abgeschwächt ist bzw. ganz fehlt.

Ed. Gamper (Innsbruck).^{oo}

Samaja, Nino: Pupilla e respiro. (Pupille und Atmung.) Note e riv. di psichiatri. Bd. 10, Nr. 2, S. 207—240. 1922.

1905 hat Signorelli einen „inspiratorischen mydriatischen Reflex“ be-

schrieben. Nach Samaja ist dieser Reflex identisch mit der Pupillenerweiterung die Kußmaul schon 1855 („Untersuchung über den Einfluß, welche die Blutströmung auf die Bewegung der Iris und andere Teile des Kopfes ausübt“, Würzburg 1855) bei stärkerer Inspiration und Expiration beschrieben hat und die auch Cocchi 1872, Mosso 1875 und François - Franck 1878 schon erwähnt haben. Die Pupillenerweiterung, die Bilancioni und Bonnani 1921 beim Tubenkatheterismus sahen und als Reflexe von der Tube aus auffaßten, hält S. für einen einfachen Schmerzreflex. Die Anisokorie bei Erkrankungen der Brustorgane beruht nach S. auf Reizung (vorwiegend bei akuten Erkrankungen) oder Lähmung (vorwiegend bei chronischen Erkrankungen) der pupillenerweiternden Fasern des Sympathicus. Gleichzeitig können je nach dem Sitz der Läsion, Symptome an der Orbita, den Schweißdrüsen und Vasomotoren von Seiten des Sympathicus auftreten. Schließlich ist S. der Ansicht, daß die einseitige Miosis bei Verstopfung der einen Nasenhöhle nicht auf einen hypothetischen Reflex, sondern auf Gefäßverbindungen zwischen Nase und Auge zurückzuführen ist.

Stargardt (Bonn).

Maggiore, Luigi: Über den Mechanismus der Entwicklung der Ora serrata des menschlichen Auges. Vorl. Mitt. Verhandl. d. außerordentl. Tagung d. ophth. Gesellsch. Wien, 4./6. VIII. 1921, S. 355—361. 1922.

Der Autor hat an menschlichen Embryonen die Entwicklung der Ora serrata von der ersten Hälfte des 3. Monats bis zum Neugeborenen studiert, und an genau schematisierten Abbildungen sehr anschaulich dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung wird angekündigt. Wenn die Ora serrata deutlich erkennbar wird (Ende des 3. Monats) liegt sie etwa am Hornhautrande, um sich dann immer weiter nach dem Äquator hin zu verschieben. Hand in Hand geht mit dieser Verschiebung die Entwicklung des Ciliarkörpers; allerdings geht die Verschiebung der Ora viel schneller als die des hinteren Randes des Ciliarkörpers, der durch das Ende der Brückeschen Fasern gekennzeichnet ist. Am Schluß der Ausbildung entspricht die Grenze zwischen Pars optica retinae und Pars ciliaris der Grenze zwischen Ciliarkörper und Aderhaut. Ora, hinterer Rand des Ciliarkörpers und Kammerwinkel behalten nicht immer die gleiche Lage zueinander. Vor allem zeigt die Pars optica von einem gewissen Stadium an nur eine sehr geringe Vergrößerung ihrer Oberfläche. So muß sich mit dem weiteren Wachstum der scleren und uvealn Augenhülle die Netzhaut dem größeren Umfang anpassen, wobei sie notwendig sich gegen den Äquator zurückziehen muß. Der Verschiebung der Ora vor dem Gegend des Hornhautrandes nach dem Äquator in den verschiedenen Entwicklungsstadien des menschlichen Auges entspricht eine analoge Verschiebung des anatomischen Netzhautrandes bei verschiedenen Wirbeltierklassen von den niedrigsten bis zu den höchststehenden. Bei den Fischen, Amphibien, Reptilien usw. entspricht der Netzhautrand der Iriswurzel, weil der Ciliarkörper fehlt oder wenig differenziert ist. Nur in dem Maße, als sich dieser ausbildet, verschiebt sich der Netzhautrand immer mehr nach dem Äquator, bis er am Auge der Primaten dieselbe Lage hat wie beim Menschen.

Kallius (Berlin).

Cattaneo, Donato: La struttura della retina nei vertebrati. (Der Bau der Netzhaut bei den Wirbeltieren.) (*Istit. di istol. e patol. gen., univ., Pavia.*) Ann. d. ist. e clin. oculist. Jg. 50, H. 6/9, S. 349—390. 1922.

Die von Cattaneo nach verschiedenen Versuchen angewandte Methode ist im wesentlichen ein Silberreduktionsverfahren, das beim Studium der feineren Histologie des Zentralnervensystems bekanntlich geradezu unentbehrlich ist. Es handelt sich dabei um eine Modifikation der Methode von Ascoli, die ziemlich kompliziert ist, und die eingehend beschrieben wird. Die Methode hat die interessante Eigenschaft, daß sich bei gewissen Tieren bestimmte Zellelemente besonders gut imprägnieren, andere dagegen weniger oder gar nicht. Außer dieser Methode wurden auch noch die übrigen gebräuchlichen Fixations- und Färbemethoden angewendet. Es wurde ein großes Material von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen zur Unter-

nachung herangezogen. Die Arbeit beginnt mit einer Besprechung der Bezeichnung der verschiedenen Schichten der Netzhaut. Es wird folgende Einteilung als die zweckmäßigste erklärt und der Arbeit zugrunde gelegt: 1. Die Schicht der Pigmentzellen. 2. Die Schicht der Sehzellen. 3. Die äußere intermediäre Schicht. 4. Die Schicht der Übergangszellen. 5. Die innere intermediäre Schicht. 6. Die Schicht der Ganglienzellen. 7. Die Schicht der Sehnervenfaseru. 1. Die Schicht der Pigmentzellen. In diesem Abschnitt streift der Verf. das Problem der Pigmententstehung, ohne jedoch genauer darauf einzugehen. Er beschränkt sich auf die bloße Feststellung der morphologischen Tatsache, daß in der äußeren Zone der Pigmentepithelien mit Eisen-Hämatoxylin siderophile Granula von verschiedenem Aussehen, verschiedener Form und Größe nachweisbar sind und daß solche Granula in dem inneren Abschnitte der Zellen fehlen, wo sich ausschließlich die Pigmentgranula befinden. 2. Die Schicht der Sehzellen. Mit dieser Bezeichnung werden die Schicht der Stäbchen und Zapfen, sowie die äußere Körnerschicht zusammengefaßt, da die Gesamtheit aller dieser Teile eine celluläre Einheit bildet. Die diesem Abschnitt zugrunde liegenden Studien wurden hauptsächlich an der Netzhaut der Vögel ausgeführt. Neben manchem schon Bekanntem wurde in der Netzhaut des Hühnchens und Kaninchens ein eigenartiger Befund erhoben. Es ist dies ein Granulum von geringer Größe, das sich im Außenglied befindet und durch Silber stark braun gefärbt wird. Von diesem Granulum geht ein etwas heller gefärbter Faden aus, welcher sich allmählich verdünnt und das Außenglied geradlinig durchsetzt. Es dürfte sich, wie auch Verf. annimmt, bei diesem Befunde um den auch schon von anderen Autoren (Held, Kolmer, Leboucq u. a.) beschriebenen Außenfaden des Außengliedes handeln. Auch einige sonstige Einzelheiten sind beobachtet und festgestellt worden. So zum Beispiel in mit Hämatoxylin gefärbten Schnitten der Taubenetzhaut im Bereich des Außengliedes ein großes regelmäßiges, intensiv gefärbtes Granulum von länglicher Form. In dem Außenglied sowohl des Huhns als der Taube und zwar deutlicher bei den Zapfen war zuweilen (bei Färbung) mit Eisenhämatoxylin ein spiralg verlaufender Faden nachzuweisen, der aber mit Wahrscheinlichkeit als ein Kunstprodukt, entstanden unter der Einwirkung der fixierenden Lösungen, aufzufassen ist. 3. Die äußere intermediäre Schicht. Zu dieser Schicht werden auch die äußeren horizontalen Zellen gerechnet, weil ihre Fortsätze an der Bildung des dichten Fibrillennetzes teilnehmen, das die äußere intermediäre Schicht darstellt, und weil ihr Zellkörper größtenteils in unmittelbarer Berührung mit diesem Fibrillennetz sich befindet. Die Befunde sind fast ausschließlich an Säugetieren erhoben worden. Im äußeren Bereiche der Schicht endigen die Ausbreitungen der Sehzellen. Im allgemeinen erscheint die äußere intermediäre Schicht gebildet von einem sehr feinen Netz von Fibrillen mit vorwiegend horizontalem Verlaufe. Die Dicke dieser Schicht ist im Vergleich mit den übrigen Schichten der Netzhaut gering, aber das Fibrillennetz außerordentlich verwickelt. Ob zwischen den Endausbreitungen der verschiedenen Elemente Anastomosen oder nur einfache Beziehungen durch Berührung bestehen, ist nicht leicht zu entscheiden. In einigen gut geglückten Präparaten konnte jedoch mit Sicherheit festgestellt werden, daß zwischen den Ausbreitungen der bipolaren und denen der horizontalen Zellen keine Anastomosen bestehen. Die horizontalen Zellen färben sich mit der genannten Methode außerordentlich schön und zwar am besten die sogenannten äußeren horizontalen Zellen Cajals, umfangreiche Elemente mit abgeplattetem, horizontal angeordnetem Zellkörper, von dem zahlreiche Fortsätze entspringen. Ein charakteristisches Merkmal dieser Zellen besteht darin, daß sich diese Fortsätze vom Zellkörper in gleicher Höhe mit ihm abzweigen und dadurch, daß sie sich bogenförmig nach außen zu falten, zur Bildung der äußeren intermediären Schicht beitragen. Eine bisher von den Autoren nicht angegebene interessante Tatsache besteht darin, daß zwischen den verschiedenen Säugetieren bestimmte morphologische Unterschiede bestehen, derart, daß man aus dem Verhalten der horizontalen Zellen geradezu die Art des betreffenden Tieres, zum Beispiel ob Kaninchen oder Rind,

bestimmen kann. Die horizontalen Zellen haben bei allen Säugetieren eine fibrilläre Struktur, die bei der angewandten Technik zuweilen außerordentlich klar hervortritt. Diese Fibrillen verlaufen nicht isoliert im Protoplasma, sondern sind durch sehr und quer verlaufende Fibrillen verbunden. Sie haben also eine netzförmige Struktur. Die bekannte Tatsache, daß sich die horizontalen Zellen färbereicher etwas anders verhalten als die anderen Netzhautzellen, wird auch bei der Färbung nach Ascoli bestätigt. Während die übrigen Netzhautzellen bräunlich erscheinen, haben die horizontalen Zellen eine rötliche Färbung. Die Frage, ob zwischen den horizontalen Zellen Anastomosen stattfinden, wird von C. verneint. Nur ausnahmsweise waren bei einem Kaninchen die beiden Protoplasmakörper durch einen gemeinsamen dicken Fortsatz miteinander verbunden. Es handelt sich dabei aber um sog. Zwillingszellen, die als eine Anomalie aufzufassen sind. Die Frage, ob die horizontalen Zellen einen zylindrischen Fortsatz besitzen, der sie zu nervösen Elementen stempeln würde, konnte nicht mit Sicherheit entschieden werden. Beim Kaninchen und Meerschweinchen fehlen solche Fortsätze vollständig. Dagegen finden sich bei großen Säugetieren in gleicher Höhe mit den fibrillären Verzweigungen häufig Fasern von gleichmäßiger Dicke, intensiver Färbung und enormer Länge, die zwar als nervöse Fortsätze betrachtet werden können, deren Ursprung und Ende aber nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte. Andererseits haben aber auch die gewöhnlichen Neurogliafärbungen keine sichere Stütze für die Auffassung der horizontalen Zellen als gliöse Elemente ergeben. 4. Schicht der Netzhautgangszellen. (Sogenannte innere Körnerschicht der Autoren.) Mit der angewandten Methode erhält man gute Reaktionen der bipolaren Zellen besonders in der Netzhaut des Meerschweinchens und Hundes. Man beobachtet dabei, daß das neurofibrilläre Netz der bipolaren Zellen sich im oberen Pol der Zelle lokalisiert, also in dem Bereich, von dem die aufsteigenden Fortsätze ausgehen, die gegen die Schicht der Sehzellen gerichtet sind. Es handelt sich dabei um 1, 2, 3 und auch mehrere Fortsätze, die die äußere intermediäre Schicht durchsetzen und sich in den Fibrillen der äußeren Lagen der Netzhaut auflösen. Diese Fortsätze verlieren, indem sie federbuschähnliche Verzweigungen, die sog. Pennantfortsätze, bilden. Aus der Tatsache, daß diese Verzweigungen verschiedene Richtungen aufweisen, kann man nach C. mit Cajal auf verschiedene Arten der bipolaren Zellen schließen. Da die bipolaren und die horizontalen Zellen häufig gleichzeitig gefärbt werden können, können ihre gegenseitigen Beziehungen mit Sicherheit festgestellt werden. Daraus ergibt sich, daß auch bei diesen Zellen von einer Kontinuität ihrer Fortsätze keine Rede sein kann. Auch zwischen den absteigenden Fortsätzen und den Verzweigungen der Ganglienzellen konnten keine direkten Beziehungen nachgewiesen werden. Die Fortsätze verlieren sich unmerklich in der inneren intermediären Schicht. Auch die Amacrinzellen lassen sich mit der Methode von C. sehr gut darstellen. Sie sind zweifach: 1. Nerven- oder Nervenzellen, deren Protoplasma eine ausgesprochene fibrilläre Struktur aufweist. Die Neurofibrillen setzen sich in die absteigenden Äste der Zellen fort, die sich in der inneren Schicht in mehrfachen Teilungen in der inneren plexiformen Schicht auflösen. Die Einteilung nach Cajal in verschiedene Arten von Amacrinen wird angenommen. Auch das färbereiche Verhalten dieser Zellen ist bei verschiedenen Tierarten verschieden, so z. B. bei den Vögeln anders als bei den Säugetieren. Die Cajalschen Assoziationsamacrinen haben auch gefunden. Sie werden von ihm als Assoziationszellen bezeichnet, da sie mit typischen nervösen Fortsätzen, Achsenzylindern, ausgestattet sind. Auch die Beziehungen zwischen den Amacrinen gefundenen Ganglienzellen ließen sich nach C. darstellen und sie bekunden dabei ihre ganglionäre Natur, abgesehen von ihrer bedeutenden Größe, besonders deutlich durch das Vorhandensein eines neurofibrillären Netzes sowohl im Zellkörper als in den Fortsätzen. 5. Innere intermediäre Schicht. (Innere plexiforme Schicht der Autoren.) Die innere intermediäre Schicht bildet ein ungeordnetes feines Netzwerk von äußerst kompliziertem Bau, in dem es unmöglich ist, den Ursprung und Anfang der Fasern festzustellen. Die Fasern dieses Netzwerkes haben einen vorwiegend horizontalen und häufig leicht gewellten Verlauf. In seinem Bereich sind zwei

Zelltypen festzustellen, von denen die einen ohne weiteres als verlagerte Amacrinen zu erkennen sind (Cajal). Die anderen sind als verlagerte Ganglienzellen anzusehen. Bei verschiedenen Wirbeltieren kann man in der inneren intermediären Schicht mehrere Lagen, so zum Beispiel bei den Vögeln, 3—5 unterscheiden. Endlich finden sich noch in der gleichen Schicht und zwar in jedem Gesichtsfelde mehrere Fasern von besonderem Aussehen, die morphologisch mit denen der zylindrischen Fortsätze der sog. Assoziationszellen übereinstimmen und vielleicht auch von ihnen abstammen. Doch ist der Nachweis des Zusammenhangs mit diesen Zellen nicht zu erbringen gewesen. 6. Die Schicht der Ganglienzellen. Der größte Teil der Ganglienzellen ist mit dendritischen Fortsätzen ausgestattet, welche sich schräg in der ganzen Dicke der inneren intermediären Schicht ausbreiten und sich dort ohne eine besondere Bevorzugung der verschiedenen Schichten verteilen. Allen Ganglienzellen gemeinsam ist der nervöse Fortsatz, der gut und deutlich nachweisbar ist, immer vom inneren Teile der Zelle ausgeht und sich direkt in eine Nervenfasern umbildet. Inmitten der Ganglienzellenschicht finden sich auch kleinere Zellen, die nach ihrem ganzen Verhalten nur als Amacrinen angesprochen werden können. Sie sind von Cajal deswegen als dislozierte Amacrinen bezeichnet worden. Die bekannte neurofibrilläre Struktur des Zellkörpers und der Fortsätze der Ganglienzellen ist mittels der angewandten Methode deutlich nachzuweisen. 7. Nervenfaserschicht. Die Nervenfasern vereinigen sich zu Bündeln von im allgemeinen gleicher Dicke. Die von verschiedenen Autoren beschriebenen Verdickungen und Anschwellungen müssen auch nach C. als Kunstprodukte betrachtet werden. In der Nervenfaserschicht treten auch Fasern auf, die von anderer Herkunft sind als die von der Ganglienzellenschicht kommenden. In Übereinstimmung mit Cajal und Dogiel werden diese Nervenfasern als zentrifugal verlaufende betrachtet. Solche sind von C. besonders beim Huhn beobachtet worden und zwar vorzugsweise in der Umgebung der Papille, wo sie zunächst in den oberflächlichsten Schichten der Netzhaut verlaufen, dann an einem bestimmten Punkte rechtwinklig nach außen umbiegen, um schließlich unmittelbar oberhalb der intermediären Schicht in der Nähe der Amacrinen zu enden. Außerdem sind einige zentrifugale Fasern mit Kollateralen in der innern intermediären Schicht gefunden worden. Histogenese der Netzhaut. Den Schluß der Arbeit bilden Ausführungen über die Histogenese der Netzhaut. Die besten Ergebnisse wurden gewonnen mit der Fixationsmethode von Bouin und Perenyi. Gefärbt wurde mit Heidenhains Eisenhämatoxylin. Auch das Silberreduktionsverfahren wurde angewendet. Als Studierobjekt diente die Forelle, von der reichlich embryonales Material zur Verfügung stand. Dieser Teil der Arbeit enthält im allgemeinen nichts grundsätzliche Neues und beschränkt sich im wesentlichen auf eine kurze Beschreibung des Auftretens der verschiedenen Elemente der Netzhaut in chronologischer Reihenfolge. Hervorzuheben ist, daß 1. Kernteilungsfiguren ausschließlich in der äußeren Netzhautschicht gefunden wurden, so daß angenommen werden muß, daß alle Zellelemente der Netzhaut von ihr abstammen. 2. Daß in der Netzhaut der Forelle in bezug auf ihre Entwicklung zwei Portionen zu unterscheiden sind, eine zentrale und eine periphere, wobei sich die letztere von der ersteren in späteren Stadien durch ein Bestehenbleiben der Kernteilungen in der äußeren Schicht, durch eine spindelige Form der Zellen und endlich durch eine besondere Verteilung und ein besonderes Aussehen des Kernchromatins unterscheiden. Demnach bleibt die periphere Netzhautpartie ein verhältnismäßig rudimentär entwickelter Teil der Netzhaut, übernimmt aber durch die dort anhaltende Zellvermehrung eine wichtige Rolle in der histogenetischen Entwicklung dieser Membran.

R. Seefelder.

Holm, Ejler: Das gelbe Maculapigment und seine optische Bedeutung. v. Graefes Arch. f. Ophth. Bd. 108, H. 1/2, S. 1—85. 1922.

Holm behandelt in drei ausführlichen Kapiteln 1. die Lage und Eigenschaften des gelben Pigments, 2. die optischen Wirkungen des gelben Pigments und 3. das zentrale Dunkelskotom. Er findet das Maculapigment am frisch enucleierten Auge;

durch seine Löslichkeitsverhältnisse kennzeichnet es sich als lipochromes Pigment wie es im Eidotter und, in starker Verdünnung, als Lutein im Blutserum vorkommt. Das durch Äthylalkohol extrahierte Eidotterpigment zeigt ganz ähnliche Absorptionsverhältnisse. Ophthalmoskopisch gelingt der Nachweis des Pigments in vivo bei Benutzung von rotfreiem Licht, an stark pigmentiertem Augenhintergrund bei Benutzung von kräftigem Tageslicht und am besten bei Benutzung eines Strahls von direktem Sonnenlicht, der in das Dunkelzimmer fällt. Die Einwände von Gullstrand, daß der Farbstoff erst postmortal eindringe, werden widerlegt. Im zweiten Abschnitt beschreibt Verf. den Maxwellschen Fleck, der entoptisch im blauen Licht gesehen wird, mit seinen individuellen Differenzen und führt zum Vergleich den Versuch an, daß ein genügend kleines (2° Gesichtswinkel) blaues Objekt zentral dunkler als peripher und daß Krystallviolett zentral rot erscheint, was sich durch die Absorptionswirkung des dem zentralen Sehen vorgelagerten gelben Farbfilters erklärt. Da die Pigmentierung individuell verschieden ist, werden sich daraus Verschiedenheiten des Farbensinns bei Einstellung von Farbgleichungen im zentralen Sehen ergeben. Aus dem dritten Abschnitt, dem eine ausführliche Erörterung der Duplizitätstheorie vorangeht und dessen zahlreiche Einzelbeobachtungen im Ref. nicht kurz wiederzugeben sind, sei folgendes hervorgehoben. Verf. beobachtet am weißen Schweiß eines bewegten farbigen Objekts und führt außer der Duplizitätstheorie die andere Erklärungsmöglichkeit an, daß das z. B. rote Licht die aufnehmenden Rotelemente am stärksten und daher am schnellsten, kurz darauf aber, wenn es schwächer, die anderen Farbelemente der Netzhaut reizt. Verf. sieht das Purkinische Nachbild in der Fovea centralis nicht. Ein weißes Objekt, das unter einem Gesichtswinkel von knapp 1° gesehen wird (2,5 cm groß in 1,5 m Entfernung) und von einer verschieden weit entfernten Stearinkerze beleuchtet ist, erscheint, wenn die Beleuchtung durch Fernerrücken der Kerze herabgesetzt wird, im zentralen Sehen gelblich bis orange, während es im peripheren Sehen einen schwachen bläulich-violetten Schatton hat. Das zentrale Skotom, das bei genügend schwachem weißen Licht als dunkler rhombischer Fleck erscheint, hat im Gegensatz zum Maxwellschen Fleck keinen Ring und keinen Foveolafleck und ist bei sehr schwachem Licht über doppelt so groß wie bei etwas stärkerem Licht. Ein gelber oder roter Fleck auf blauem Grunde hebt sich zentral weniger scharf ab als peripher, ein blauer Fleck auf rotem Grunde hebt sich zentral schärfer ab als peripher. Verf. kommt zu dem Schluß, daß von den Erscheinungen des Dämmerungssehens mehrere statt durch die Duplizitätstheorie durch die einfache Absorptionswirkung des zentral vorgelagerten Pigments zu erklären sind, nicht aber die sehr großen Adaptationsunterschiede zwischen zentralem und peripherem Sehen. Den Zweck des Pigments sieht Verf. darin, daß es den feinsten Teil des Auges gegen eine zu starke Wirkung der schädlichsten, kurzwelligen Strahlen schützt und die chromatische Aberration vermindert. Ebbecke (Göttingen)

Magitot, A. P.: How to know the blood pressure in the vessels of the retina. (Wie man den Blutdruck in den Netzhautgefäßen mißt.) *Americ. journal of ophthalm.* Bd. 5, Nr. 10, S. 777—784. 1922.

Baillard hat das Verdienst, daß er als erster im Jahre 1917 die Pulsationserscheinungen der Netzhautgefäße zu physiologischen und klinischen Studien über die Blutzirkulation im Auge benutzt hat. Er übt mit einem kleinen federnden Stempel, der Apparat wird geliefert von Boullitte, Paris, Rue Bobillot 16, und von Pirard & Cardevache, Rue Blainville Nr. 7, Paris) auf den Augapfel einen Druck aus, dessen Höhe man ablesen kann, und bestimmt unter Beobachtung der Papille mit dem Augenspiegel die Druckwerte, bei denen Pulsation und Anämie in der Zentralarterie auftritt. Wenn der Innendruck des Auges vorher tonometrisch gemessen wurde, so kann man an der Hand einer einmal festgelegten Kurve aus der Höhe des nötigen Stempeldrucks die Höhe des Augeninnendrucks bestimmen, die dem diastolischen Druck (Auftreten des Arterienpulses) und dem systolischen Druck (Auftreten der Anämie) entspricht.

und damit auch den totalen Blutdruck selbst. Der Augeninnhalt drückt auf die Papille etwa wie die Riva-Rocci-Manschette auf die komprimierte Extremität bei der Messung des Blutdrucks an der Arterie des Arms. Aus dem Fehlen der Pulsation am normalen komprimierten Augapfel läßt sich der Schluß ziehen, daß der Arteriendruck im Augeninneren auch in der Diastole höher ist als der Augeninnendruck. Anders liegen die Verhältnisse an den Venen: Während die Pulswelle in den Arterien kurze abrupte Bewegungen zeigt, läuft sie in den Venen in langsamem rhythmischem Steigen und Sinken und spontane Venenpulsation tritt sehr oft auch am normalen Auge auf, ohne daß ein Druck ausgeübt wird. Die diastolische Blutwelle in den Venen hat oft einen niedrigeren Druck als das Augeninnere. Während der Veneninnendruck individuell etwas größere relative Verschiedenheiten zeigt, liegt der Arterieninnendruck im normalen Auge unter normalen allgemeinen Blutdruckverhältnissen innerhalb ziemlich enger Grenzen: Der diastolische Druck in der Retina beträgt 30—35 mm Hg, der systolische Druck 70—80 mm Hg.

Vor der eigentlichen Messung muß zunächst an beiden Augen mit dem Tonometer nachfolgende Einübung der Augeninnendruck bestimmt werden. Bei der Gefäßdruckmessung kann der Patient liegen oder sitzen. Die Beobachtung der Gefäße kann im aufrechten oder umgekehrten Bild vorgenommen werden; im Falle des umgekehrten Bildes muß die Vergrößerung eine genügende sein und man gebraucht dazu am besten das kleine Gullstrand'sche Landophthalmoskop. Der federnde Stempel wird im temporalen Bezirk der Lidspalte auf die Gegend des Rectus externus aufgesetzt. Bei Benutzung des aufrechten Bildes kann man den Stempel selbst aufdrücken; bei Benutzung des umgekehrten Bildes braucht man eine Assistentin. Die Untersuchung am linken Auge ist auch bei Verwendung des aufrechten Bildes ohne Assistentin schwieriger, wenn man nicht über eine genügende Geschicklichkeit in der Benutzung der linken Hand verfügt, um damit den Spiegel halten zu können; man kann sich helfen, indem man das Meßinstrument mit der linken Hand über die Stirn hinweg temporal auf den Augapfel drückt. Der Untersucher muß seine Aufmerksamkeit intensiv auf die Papille richten; dort allein ist die Pulsation deutlich zu sehen. Der Anfänger soll dabei auch genau auf die Unterschiede zwischen Arterien- und Venenpulsation achten. Ist das Spiegelbild gut eingestellt, so beginnt der Untersucher mit dem Druck auf den Augapfel. Bei Sichtbarwerden der ersten Pulsation hält er das Instrument ruhig in derselben Stellung, richtet das Licht des elektrischen Spiegels etwas seitlich auf die Skala des Federstempels und liest ab. Darauf richtet er den Spiegel wieder auf das Auge und vermehrt den Druck bis zu dem Moment, wo die Pulsation ganz verschwindet und das Gefäß blutleer wird; alsdann liest er den Wert nochmals ab. Jeder Druck auf das Auge verursacht ein wohl zu berücksichtigendes Absinken des Phthaltomotus; deshalb muß die Untersuchung möglichst ohne Verzögerung zu Ende geführt werden. Vor jedem erneuten Aufsetzen des Stempels sollte man jedenfalls 5 Minuten warten, damit die Augenspannung wieder auf den normalen Wert ansteigt. Bei längerem Anhalten des gleichen Stempeldrucks kann man es erleben, daß die anfangs blutleer gewordenen Gefäße wieder Pulsation zeigen, weil inzwischen die Spannung des Augapfels nachgelassen hat. Bei den ersten Versuchen empfiehlt sich, nur den Venenpuls und den diastolischen Druck zu beobachten; man übt dabei die Handhabung der Apparatur. Der ungeübte Untersucher hat meist eine Neigung, nicht genügend starken Druck auszuüben; wer aber augenspiegeln kann, erlernt die Technik in 14 Tagen. Der Federstempel muß horizontal angedrückt werden, damit das Eigengewicht des Instrumentes keinen Fehler verursacht. Die gute Funktion des Federstempels läßt sich exakt nachprüfen, indem man den Apparat in einem Halter über die Schale einer ausbalancierten Waage nach unten gerichtet so einspannt, daß er die eine Wagschale gerade berührt, und darauf die andere mit Gewichten belastet.

Die Messung des lokalen Blutdrucks im Auge hat nur dann eine klinische Bedeutung, wenn man sie mit dem Augeninnendruck oder mit dem systolischen und dem diastolischen allgemeinen Blutdruck vergleichen kann. Den Augeninnendruck mißt man mit dem Schiötzschen Tonometer. Mit Hilfe dieses Tonometers wurden auch Kurven hergestellt, die anzeigen, um welchen Betrag der Augeninnendruck durch bestimmte Stempeldrucke erhöht wird. Die Werte sind verschieden, je nach dem Innendruck, der im untersuchten Auge vorher herrschte. Hat man den Druck am untersuchten Auge, wie es geschehen soll, vorher tonometrisch bestimmt, so kann man aus der Höhe des Stempeldrucks, bei dem die Phänomene an den Arterien auftreten, mit Hilfe der Kurve den Augeninnendruck bestimmen, der in diesem Moment herrscht und damit zugleich den entsprechenden Gefäßinnendruck. Zur Bestimmung des allgemeinen Blutdrucks bedient man sich am besten moderner Apparate mit einer Arm-

binde, unter Benutzung der auscultatorischen Methode. Der normale Blutdruck an der Netzhautarterie verhält sich zum normalen allgemeinen Blutdruck ungefähr wie 45 : 100, bei hohem allgemeinen Blutdruck ist das Verhältnis ungefähr wie 50 : 100. Unter pathologischen Bedingungen ist dies Verhältnis ein wesentlich anderes. Bei Stauungspapille ist der diastolische und der systolische allgemeine Blutdruck unverändert; der diastolische Netzhautblutdruck hoch, der systolische dagegen oft normal. Bei Angiosklerose der Netzhaut ist der allgemeine Blutdruck wechselnd, hoch, niedrig oder normal, der diastolische und der systolische Netzhautblutdruck stets niedriger. Bei Glaukom ist der allgemeine Arteriendruck normal oder hoch, der lokale Druck an der Netzhaut für Diastole und Systole stets hoch und der lokale Venendruck besonders hoch. Auch bei anderen Erkrankungen wurde der Blutdruck des Auges geprüft, doch waren die Fälle noch nicht genügend zahlreich, um dabei allgemeingültige Resultate abzuleiten.

Comberg (Berlin).

Kleiber, G.: Über die Wirkung örtlich angewandter Kalksalzlösungen auf den Augendruck. Arch. f. Augenheilk. Bd. 91, H. 3/4, S. 288—299. 1922.

Chiari und Januschke hatten 1911 festgestellt, daß Transsudat- und Exsudatbildung durch Kalksalze gehemmt werden, und daß die Chemosis der Bindehaut nach Senfölen oder Abrineinträufelung ausbleibt, wenn das Tier mit Kalksalzlösungen behandelt worden ist. Die Wirkung wurde auf eine Abdichtung der Gefäßwände bezogen und durch eine Änderung in der physikalischen oder chemischen Beschaffenheit der zwischen den Zellen liegenden Verbindungsmembranen zu erklären versucht. Leo, Dutoit und Wessely hatten daraufhin die Anwendung der Kalksalze bei der Behandlung skrofulöser Erkrankungen in die Augenheilkunde eingeführt. Tristano und Weekers hatten später intravenöse Anwendung der Kalksalze bei Glaucom versucht. Kleiber stellte sich die Aufgabe, die Wirkung lokaler Anwendung von Kalksalzen am Auge zu studieren. Die Versuche wurden am Kaninchen vorgenommen. Bei den ersten Versuchen wurden 0,3—0,5 ccm einer 4 proz. Chlorcalciumlösung in die Vorderkammer eingespritzt, nachdem vorher das Kammerwasser mit einer feinen Kanüle abgesaugt war. Es zeigte sich bei den nicht unter ganz einheitlichen Bedingungen angestellten Versuchen, daß meist noch mehrere Tage nach der Injektion der Druck erniedrigt blieb. Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden Injektionen in das Glaskörper gemacht, nachdem vorher 0,1—0,3 ccm abgesaugt waren. Injektion von 0,3—0,5 ccm 1—3 proz. Chlorcalciumlösung und 3 proz. Afenillösung ergab in jedem Falle eine merkbare Druckherabsetzung, die mehrere Tage anhielt. Auch subconjunctivale Injektion von 0,5 ccm 3 proz. Afenillösung, 1 ccm 1/2 proz. Afenillösung, 1 ccm Calcinellösung, 1 ccm 1 proz. Kalksalzlösung des Aspirins übte einen deutlichen druckherabsetzenden Einfluß für mehrere Tage aus. Die anfängliche Drucksteigerung, die Wessely bei Injektion hypertotonischer Kochsalzlösung unter die Conjunctiva beobachtet hatte, blieb aus. Als Nebenwirkung bei intraokularer Einführung von Chlorcalciumlösung erhielt man eine geringere oder stärkere Entzündung; diese war aber nicht die Ursache der Druckerniedrigung, denn die druckherabsetzende Wirkung setzte sofort nach der Injektion ein und wurde außerdem auch bei subconjunctivalen Einspritzungen beobachtet. Der Fluoresceinaustritt ins Kammerwasser wurde am kalkvorbehandelten Auge deutlich gehemmt. Entsprechend den Versuchen von Spiess und Bruce muß angenommen werden, daß neben der reinen Gefäßwirkung noch eine Lähmung peripherer Nerven im Spiele ist. Es wird darauf hingewiesen, daß Römer (1920) durch Magnesium ebenfalls eine Druckherabsetzung erzielte. Comberg.

Adams, Elliot Q. and Percy W. Cobb: The effect on foveal vision of light (and dark) surroundings. V. (Der Einfluß heller [oder dunkler] Umgebung auf das foveale Sehen.) (Laborat. of pure science, Nela research laborat., Nela Park, Cleveland, Ohio.) Journ. of exp. psychol. Bd. 5, Nr. 1, S. 39—45. 1922.

Über die Wandlungen der Unterschiedsschwelle bei unabhängigen Veränderungen in der Helligkeit des Versuchsfeldes und seiner Umgebung hat P. W. Cobb

gleichen Stelle (I [6] 540—566, Dezember 1916) auf Grund einer physikalisch-chemischen Erklärung des Kontrastes theoretische Betrachtungen hergeleitet, die zu den Beobachtungsergebnissen nur beschränkt paßten. Sie stimmen etwas besser zusammen, wenn wenige einfache und qualitativ einleuchtende Annahmen über die Natur der Nerventätigkeit in der Netzhaut gemacht werden. Nämlich: 1. Bei vollständiger Adaptation für ein Feld von fester und gleichmäßiger Helligkeit erreicht die Unterschiedsschwelle einen Wert, der unabhängig ist von der Helligkeit und nicht größer als derjenige für ein ungleichmäßiges Feld. 2. Bei ungleichmäßigem Feld ist der Adaptationszustand derjenige, der durch ein gleichmäßiges Feld hervorgerufen würde, dessen Lichtstärke gleich ist einem geometrischen Mittel der Lichtstärke der verschiedenen Feldabschnitte. 3. Die Erregung der Sehnervenfaser spielt sich in einer Folge von Stößen ab, deren Häufigkeit wächst (bei festgehaltener Adaptation) mit der Lichtstärke an dem betreffenden Punkt des Feldes. 4. Der Zwischenraum zwischen zwei Stößen besteht aus zwei Teilen, einem festen (= absolute refraktäre Periode) t_∞ und einer relativen refraktären Periode $\frac{k \cdot t_\infty}{B}$ (s. u.), die im umgekehrten Verhältnis zur Helligkeit der Feldstelle steht. D. h. die Empfindlichkeit (= Kehrwert der geringsten wirksamen Lichtstärke) wächst linear mit der Zeit, bis ihr Produkt mit der Lichtstärke einen kritischen Wert erreicht, worauf ein neuer Stoß erfolgt. 5. Gleiche Unterschiede der Häufigkeit der Erregung sind gleich merkbar. — Feste Adaptation. Der Einfachheit halber wird zunächst die Veränderung der Unterschiedsschwelle für ein Prüfungsfeld als Funktion der veränderlichen Lichtstärke desselben betrachtet. Das trifft annähernd zu, wenn ein Prüfungsfeld von der geringsten brauchbaren Größe in einer unveränderlichen Umgebung gesehen wird. Der Zwischenraum zwischen zwei Stößen ist $t = t_\infty + \frac{k \cdot t_\infty}{B}$ [1] (s. o.). B ist die Lichtstärke des Prüfungsfeldes. Die Konstante k wechselt (nach Annahme 1 und 5) mit der Adaptationshelligkeit B_1 , soweit eine völlige Adaptation möglich ist; $k = B_1$ (s. u.). Die Häufigkeit der Stöße ist $\frac{1}{t}$, ihr Höchstwert $\frac{1}{t_\infty}$, deren Verhältnis $s = \frac{t_\infty}{t} = \frac{B}{B_1 + k}$ [2]. Die Häufigkeit ist durch Abb. 1 dargestellt in ihrer Abhängigkeit von dem Verhältnis der Lichtstärke des Feldes zu der Umgebung, für die das Auge adaptiert ist, bzw. dem Logarithmus dieses Bruches (Sinuskurve). Nach Annahme 5 entspricht dem eben merklichen Helligkeitsunterschied ΔB ein fester kleiner Betrag Δs des Verhältnisses der Häufigkeit der Stöße (s. o.). Die Beziehung zwischen beiden ergibt sich aus der Differentiation der Gleichung [2] nach ΔB als $\frac{\Delta B}{B} = \left(\frac{B}{k} + 2 + \frac{k}{B} \right) \Delta s$ [4]. Der niedrigste Schwellenwert ergibt sich danach für $k = B_1$. Dann nimmt die Gleichung, wenn ΔB , Δs für dB , ds gesetzt wird, die Form an: $\frac{dB}{B} = \left(\frac{B}{B_1} + 2 + \frac{B_1}{B} \right) \Delta s$ [7]. Eine zweite Abbildung gibt in Kurvenform die Beziehung wieder zwischen dem Verhältnis der Lichtstärkenänderung und der durch sie hervorgerufenen Nervenenerregung $\frac{dB}{B \cdot ds}$ einerseits und dem Verhältnis des Bruches aus Lichtstärke B des Versuchsfeldes zur Lichtstärke der Umgebung, für die das Auge adaptiert ist, andererseits. Wenn der Einfluß des Prüfungsfeldes auf die Adaptation berücksichtigt werden soll, so gilt die Gleichung [7] nur, wenn B_1 nicht die Lichtstärke der Umgebung bedeutet, sondern das geometrische Mittel $B_1 = \sqrt{\alpha B^2 + (1 - \alpha) B/2}$ [8]. α ist ein Koeffizient, der im Versuch zu bestimmen ist und die verhältnismäßigen Einflüsse des Versuchsfeldes und der Umgebung auf die Adaptation ausdrückt. Diese Formeln [7 und 8] werden mit den Versuchsergebnissen verglichen. Dazu sind die geometrischen Mittelwerte dreier Beobachter aus einer früheren Arbeit zusammengestellt. Ferner ist in einer dritten Abbildung der Kurvenzug des Koeffizienten $\frac{B}{B_1} + 2 + \frac{B_1}{B}$ und die Werte der Versuchsergebnisse (nach Aus-

gleich für eine gemeinsame Grundlinie) in ein Koordinatensystem eingetragen. Ordinate wurde verwendet $\frac{\Delta B}{B} \cdot \frac{1}{4 \Delta s}$, als Abszisse Logarithmus $\frac{B}{B'}$. Ein Anwaschen der allgemeinen Lichtstärke verursacht eine geringe, aber deutliche Erniedrigung der Schwelle. Dieser Unterschied deckt den Grad auf, in dem die Annahmen, besonders die erste, von den Tatsachen abweichen. Die Übereinstimmung ist sonst recht weitgehend.

Erggelet.

Schiötz, Ingolf: Rotgrünblindheit als Erbeigenschaft. (*Univ.-Augenklin. Kristiania.*) Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 68, April-Maih., S. 498—526. 1922.

Schiötz kommt in seiner alles Bekannte über die Vererbung der Rotgrünblindheit zusammenfassenden Arbeit zum Schluß, daß „angeborene Rotgrünblindheit immer und ausnahmslos als eine recessiv geschlechtsgebundene Eigenschaft vererbt wird, und daß bis jetzt noch keine einzige Ausnahme dieses unbeugsamen Prinzips nachgewiesen worden ist“. Er gibt einen eingehenden Überblick über das bisher vorliegende Material, unter Wiedergabe der Stammbäume veröffentlicht von Scott, Nicholl, Sommer, Cohen und Horner, sowie aus letzter Zeit von Groenouw, Nagel, Rivers, Nettleship, Jerchel, Göthlin, Döderlein und vermehrt das vorhandene Material durch 9 selbstbeobachtete Stammbäume, die in verschiedenen Variationen die Gesetzmäßigkeit der geschlechtsgebundenen Vererbung demonstrieren. Die Grundlagen dieser Vererbungsregeln nach Mendel bestätigt durch die Chromosomenforschung, werden erläutert und die Möglichkeiten durch statistische Untersuchungen wertvolle Aufschlüsse über die Häufigkeit der Rotgrünblindheit zu gewinnen, dargetan. Aus seinen durch Untersuchungen an Schülern, Rekruten und Eisenbahngestellten, im ganzen an mehr als 2000 Personen gemachten Erfahrungen, findet er die Häufigkeit der Rotgrünblindheit beim Mann zu 10%, aus Untersuchungen an 2200 Schulmädchen die der Frau zu 1%. Daraus läßt sich die Häufigkeit der weiblichen Konduktoren auf 18% berechnen. Die Häufigkeit bei Horner, daß Farbenblindheit vom Großvater auf die männlichen Nachkommen der Tochter vererbt werde, ist demnach nur teilweise zutreffend: fast die Hälfte der farbenuntüchtigen Männer haben die Anomalie nicht vom Vater ihrer Mutter, sondern von der Mutter ihrer Mutter, die Konduktor war, geerbt und von der Großmutter hat wiederum beinahe die Hälfte das Erbe von der Mutter, die arge und etwas größere Hälfte vom Vater überkommen. Es läßt sich ferner berechnen, daß Eheschließungen zwischen farbenblinden Männern und weiblichen Konduktoren in 1,8% aller Ehen, und Eheschließungen, in denen beide Ehegatten farbenuntüchtig sind, in 1% aller Ehen sich finden müssen. — Schiötz untersucht auch die seltenen Abweichungen vom Gesetz der geschlechtsgebundenen Vererbung in den Stammbäumen von Cuvier, Schoeler, Nettleship, Bateson, und weist nach, daß es sich hierbei entweder um unrichtige Wiedergabe oder mangelhafte Diagnose bzw. Untersuchung handelt. — Die Tatsache (nach Hess und Döderlein), wonach 2 mal oft „sichtige“ Väter „grünblinde Söhne“, 1 mal ein „grünsichtiger“ Vater einen rotblinden Sohn hatte, erklärt sich aus den Vererbungsregeln, wonach der Sohn eines Vaters seine Farbenblindheit nicht vom Vater, sondern von der Mutter überkommen muß. Schiötz selbst hat niemals bei der Untersuchung zahlreicher farbenblinder Familien Ausnahmen von der Regel gefunden.

Fleischer (Erlangen).

Engelking, E.: Vergleichende Untersuchungen über die Pupillenreaktion bei der angeborenen totalen Farbenblindheit. (*Univ.-Augenklin., Freiburg i. Br.*) Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 69, August-Septemberh. S. 177—188. 1922.

Engelking untersuchte die pupillomotorische Valenz der Farben bei (4) farbenblinden im Vergleich zum Normalen und sonstigen Farbensinngestörten. Bei einigen Totalfarbenblinden bestand eine Anpassung der Lidspaltweite an den Adaptationszustand. Bei Betrachtung roten Papieres ist sie weit, bei grünem sehr eng. Ange-

Verhalten zeigte sich in der Pupillenweite. Wie schon Hess gefunden hat, verhalten sich die Protanomen und noch mehr die Protanopen hinsichtlich der pupillomotorischen Valenz der verschiedenen Farben als Übergänge vom Normalen zu den Totalfarbenblinden. Ein Hemeralop zeigte umgekehrt noch ein Verhalten über den Normalen hinaus. Das wird dadurch erklärt, daß sich bei dem Normalen noch eine gewisse Mitwirkung des Dämmerungsapparates bemerkbar macht, die bei dem Hemeralopen fehlt. Auffallend sind die adaptiven Veränderungen der Pupille. Es zeigt sich, daß die Pupillenweite nach Abdunkelung der Belichtung auf 1,09% der 3 Minuten angewandten Ausgangsbelichtung je nach der Abdunkelungszeit, die bis zu 300 Sekunden dauerte, ein charakteristisches Verhalten aufwies. Die Erweiterung vollzieht sich bei allen Typen in annähernd der gleichen Weise und mit derselben Geschwindigkeit. Nur die totale Farbenblindheit verhält sich ganz anders, indem bei ihr innerhalb der für alle übrigen Formen maßgebenden 10—15 Sekunden eine namhafte oder nur vergleichbare Erweiterung überhaupt nicht auftritt. Maßgebend hierfür ist der Gang der Dunkeladaptation. Geht man von viel geringerer Belichtung aus, und dann zu weiterer Verdunkelung über, so wird der Unterschied zwischen den Totalfarbenblinden und den anderen Typen geringer, um beim reinen Dämmerungssehen zu verschwinden. Auch die Verengung der Pupille beim Übergang zu höherer Belichtungsintensität geht beim Totalfarbenblinden etwas langsamer. Die Prüfung der pupillomotorischen Unterschiedsempfindlichkeit gegenüber Lichtern verschiedener Intensität und Zusammensetzung am Hessschen Pupilloskop ergab für den Totalfarbenblinden niedrigere Empfindlichkeitsziffern nach Groethuysen als bei allen anderen Typen. Bei verschiedenen Totalfarbenblinden kommen individuelle Differenzen der Anpassungsfähigkeit vor. Vortr. faßt seine Untersuchungen dahin zusammen, daß die pupillomotorische bzw. adaptive Unterschiedsempfindlichkeit beim Totalfarbenblinden bei starker Helladaptation herabgesetzt ist, während alle sonst untersuchten Farbenblinden sich hinsichtlich der Pupillenreaktion grundsätzlich, aber nicht quantitativ gleich verhalten. Ein Übergang nach den Totalfarbenblinden in dieser Richtung kann nicht anerkannt werden.

Brückner (Jena)._o

Wölfflin, E.: Über Beeinflussung des Farbensinns bei anomalen Trichromaten. (Vorl. Mitt.) Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. Bd. 69, August-Septemberh., S. 205 bis 208. 1922.

In Analogie mit Untersuchungen von Böhmig, der eine Beeinträchtigung des Farbensehens nach körperlicher Ermüdung fand (vgl. diese Berichte 14, 546), hat Wölfflin einen langsameren Anstieg der Adaptationskurve bei Hemeralopen gefunden, nachdem eine körperliche Ermüdung vorausgegangen war. — Er untersuchte den Einfluß von Coffein und Strychnin auf das Farbsehen von Deuteranomen und Deuteranopen. Mitteilung von 4 Beobachtungen.

60jähriger Deuteranomal, Injektion von 5 mg Strychnin. nitric. in die rechte Schläfe. Kurz vorher Prüfung der Rot- und Grüngrenzen mit Engelkingschen Farben im horizontalen Meridian am Perimeter. Grenzen bei 15°, nach 1/2 Stunde Erweiterung auf 20°. Gleichzeitig Herabsetzung der zentralen Farbenschwelle für Rot, nicht für Grün. (Am Farbenkreisel untersucht auf 1 1/2 m ohne Injektion 10° Rotzusatz zum Grau. Nach 1/2 Stunde Schwellenunterschied auf 3—4° heruntergegangen, jetzt etwa entsprechend dem Normalen.) Betrachtung des Kreisels durch einen Kartonausschnitt von 2 qcm ergab für Rot 50° bzw. 23° als Schwelle. 2. 50jähriger Deuteranomal erhielt 4 Tassen Kaffee, worauf die Rotschwelle am Kreisel von 13—14° nach 3/4 Stunden auf 6—7° herabging. Grünschwelle unverändert auf 17°. — 3. 53jähriger Deuteranomal. Nach Kaffee ging die Rotschwelle am Kreisel von 10° auf 7° zurück. Am Perimeter für Rot vor und nach Kaffeegegnuß 25° bzw. 42° temporal, 22° bzw. 27° nasal. Blau und Gelb kaum verändert. Grün vielleicht etwas mehr eingengt. Am Hessschen Pupilloskop blieben die pupillomotorischen Werte gleich. Am Anomaloskop Fall 2 und 3 leichte Verminderung der Grüneempfindung. 4. 21jähriger Deuteranop. Gesichtsfeld für Gelb vor und nach Kaffeegegnuß temporal 65° bzw. 73°, nasal 18° bzw. 40°. Am Farbenkreisel keine Änderung der Schwellenwerte für Gelb und Blau. Bei Protanopen ebenfalls nach Kaffee ausgesprochene Erweiterung der Blau-Gelbgrenzen am Perimeter. Blau nasal 30° bzw. 46°, Gelb 26° bzw. 45°. Temporal keine Erweiterung.

Brückner (Jena)._o

Brown, T. Graham: Reflex orientation of the optical axes and the influence upon it of the cerebral cortex. (Reflektorische Orientierung der Augenachsen und ihre corticale Beeinflussung.) (*Physiol. Inst., Cardiff.*) Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim. Bd. 7, S. 571—578. 1922.

In einem gewissen Stadium der Narkose sind die Augen des Affen trotz ruhiger Schlafes geöffnet und lassen die reflektorische (labyrinthogene) Reaktion der Augenmuskulatur auf passive Kopfdrehung erkennen: Die Bulbi bewegen sich in entgegengesetzter Richtung wie der Kopf, so daß die optischen Achsen gleichsam im Raum fixiert bleiben. Dieser Reflex besteht auch bei enthirnten Tieren, er bleibt ausnahmslos bei einem queren Schnitt zwischen vorderen und hinteren Zwillingshälften, ebenso bei tiefer Narkose (noch vor Verschwinden des Hornhautreflexes). Durch wiederholte faradische Reizung der Hirnrinde ist jedoch der auf andere Weise nicht mehr auslösbare labyrinthogene Reflex wieder zu „wecken“. Mit der dann (durch passive Kopfdrehung) auszulösenden Augenbewegung hat die Rindenreizung direkt nichts zu tun; sie stellt nur einen Zustand her, in welchem der labyrinthäre Reflex auslösbar wird. Diesen Zustand bezeichnet Verf. als „Fixierung der optischen Achsen“. Bei Reizung der Occipitalrinde erfolgt eine Bewegung der Augen nach der gegenüberliegenden Seite. Im Anschluß daran wird der (labyrinthogene) „orientation reflex“ auslösbar bzw. lebhafter als bei der Reizung und am deutlichsten sichtbar, wenn der Kopf nach derjenigen Seite gedreht wird, nach welcher sich die Augen unter dem Einfluß der Rindenreizung bewegt haben. Bei Drehung des Kopfes nach der entgegengesetzten Seite kann die reflektorische Augenbewegung nicht deutlich werden, weil die Augen schon nahe an ihrer in der betreffenden Richtung überhaupt erreichbaren Grenzstellung sind. Reizung des Gyrus front. sup. bewirkte bei den Versuchen des Verf. Öffnung der Lider, Erweiterung der Pupillen und Drehung des Kopfes nach der der Reizstelle gegenüberliegenden Seite ohne Änderung der Augenstellung innerhalb der Orbitae, bei Reizung des Gyrus front. med. erfolgte nur eine Bewegung der Augen nach der gegenüberliegenden Seite (gleichzeitige Drehung des Kopfes und der Augen nur bei stärkerer Reizung). Auch bei Reizung der oberen Stirnwindung beeinflußt den „orientation reflex“: Wenn er vor der Reizung nicht auslösbar war (in der Narkose), so ist er es unmittelbar nach oder während der Rindenreizung. Letzterenfalls verbleiben die Augen unverrückt, weil sie durch die corticale und die labyrinthäre Reizung gleichmäßig, aber in entgegengesetzter Richtung beeinflußt werden: Durch jene erhalten sie den Antrieb zu einer der Kopfdrehung gleichgerichteten, durch diese zu der entgegengesetzten Bewegung. Reizung der mittleren Stirnwindung beeinflußt den „orientation reflex“ gar nicht oder inkonstant. Aus seinen Versuchsergebnissen zieht Verf. folgende Schlüsse bez. der Rolle der verschiedenen Rindenzentren für die Augenbewegungen. Das occipitale besorgt die Überführung eines peripheren, die Aufmerksamkeit erregenden Netzhautbildes auf die Stelle des schärfsten Sehens. Daß es dort trotz etwaiger Kopfbewegungen verbleibt, ermöglicht der durch die Erregung des Rindenzentrums „geweckte“ labyrinthäre („orientation“-) Reflex. Das in der mittleren Stirnwindung gelegene Zentrum beherrscht vorwiegend die willkürlichen Bewegungen der Augen (auf Kommando, beim Lesen). Das Zentrum in der oberen Stirnwindung soll „die Bewegungen der optischen Achsen im Raume“ beherrschen, speziell das Verfolgen eines sich bewegenden Tieres oder Gegenstandes mittels gleichzeitiger Kopf- und Augenbewegungen. Bielschowsky

Rothschild, Heinrich: Untersuchungen über die sog. Zöllnerschen anisoskopischen Zerrbilder. (*Psychol. Inst., Univ. Frankfurt a. M.*) Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt., Zeitschr. f. Psychol. Bd. 90, H. 3/6, S. 137—166. 1922.

Die sogenannten Zöllnerschen Zerrbilder entstehen dann, wenn einfache Figuren hinter einem ruhenden mit einem schmalen Spalt versehenen Karton vorbeigeführt werden, indem sie eine Verzerrung in ihrer parallel zur Bewegungsrichtung verlaufenden Achse erfahren. Bei hoher Bewegungsgeschwindigkeit erscheinen sie verkürzt, bei geringer verlängert. Dabei drängt sich bei hoher Geschwindigkeit der Eindruck an-

gend auf, daß, obwohl die Figuren beträchtlich breiter sind als der Spalt, man sie doch simultan ganz übersehe. Verf. hat die Erscheinung nachuntersucht. Die Figuren wurden auf eine ca. 120 cm lange und 10 bzw. 20 cm hohe weiße Papierrolle gezeichnet, die in horizontaler Richtung über 2 senkrecht stehende Zylinderrollen rotierte. Bewegungsgeschwindigkeit variabel, sie betrug in der Regel 2,5 Sekunden für eine Umdrehung der 120 cm langen Rolle. Die Spaltbreite betrug 1,2 cm. Als Figuren wurden Striche, Punkte, Kreisflächen, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, zum Teil in Kontur, zum Teil ausgefüllt, verwendet. Die Versuchsergebnisse bestätigen die Beobachtungen früherer Autoren. Sie erlauben nicht die Zurückführung der Erscheinungen auf Augenbewegungen. Es zeigte sich, daß einerseits der Unterschied zwischen Figur und Hintergrund, andererseits die Figur und ihre Kontur mit einer Hauptrolle bei den beschriebenen Erscheinungen spielen müssen und zwar sowohl in den Fällen, in denen der Figureneindruck eindeutig war, als auch dort, wo verschiedene Auffassungen sich ermöglichten. So hebt sich z. B. eine Flächenfigur noch deutlich als Ganzes vom Hintergrund ab, im Gegensatz zu dem Innern der Umrißfiguren, so daß z. B. die senkrechten Striche von Umrißquadraten nur als schattenartige Gebilde und weder als Quadratseite noch als Begrenzung der weißen quadratischen Fläche wirken, während die wagerechten Seiten stets deutlich erscheinen. Infolgedessen verschwinden nun auch die wagerechten Striche als Quadratseiten und verbinden sich zu einer kontinuierlichen Linie. Die Tatsache, daß ein hinter dem Spalt sich vorbeibewegendes Objekt unmittelbar simultan erscheint, bedarf noch der psycho-physischen Erklärung. *Brückner (Jena).*

Kiesow, F.: Über bilaterale Mischung von Licht- und Geruchsempfindungen. (*Inst. f. exp. Psychol., Univ. Turin.*) *Arch. néerland. de physiol. de l'homme et des anim.* Bd. 7, S. 281—284. 1922.

Im Anschluß an Untersuchungen über binokulare Farbmischung und Wettstreit ist Verf. zu Ergebnissen gelangt, die darauf hinweisen, daß die miteinander in Wettstreit tretenden Empfindungen nicht genau den äußeren Reizen entsprechen, sondern mehr oder weniger gemischte Eindrücke darstellen. Auf Grund der gewonnenen Tatsachen lassen sich daher bei diesen Vorgängen zwei Prinzipien unterscheiden, die gegeneinander rivalisieren, das der Verschmelzung und der Selbständigkeit. Es erhebt sich nun die Frage, ob man etwa beim Geruchsorgane ähnlichen Erscheinungen begegnet, ob also die miteinander in Wettstreit tretenden Empfindungen nur abgeschwächte Intensitätsgrade der den objektiven Reizwerten entsprechenden Eindrücke darstellen, oder ob sie nicht auch eine qualitative Veränderung erfahren. Einige Versuche mit einem einfachen Doppelolfaktometer, dem feste Riechzylinder aufgesetzt waren, sprechen für diese Annahme. *Emil v. Skramlik (Freiburg i. B.).*

Schlagintweit, Erwin: Über Strychninwirkung auf die Sinne, insbesondere auf das Auge. (*Univ.-Augenklin., München.*) *Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol.* Bd. 95, H. 1/2, S. 104—123. 1922.

Die Empfehlung des Strychnins zur Behandlung von Amblyopien und Amaurose beruht auf ungenauer Beobachtung. Verf. prüfte mit Verwendung exakter Untersuchungsmethoden die Wirkung des Strychnins nitr., das entweder in 1proz. Lösung (2—4 mg) subcutan eingespritzt oder 3proz. in Mengen bis zu 12 mg in den Bindehautsack eingeträufelt wurde. An dem v. Hess angegebenen Apparat zeigte das Gesichtsfeld keine Änderung der Blaugrenzen nach Strychnin. Ebenso wenig wurde das Verhalten der Sehschärfe im indirekten und direkten Sehen beeinflusst. Auch eine Erhöhung der Unterschiedsempfindlichkeit für Weiß und Farben ließ sich nicht feststellen. Sehr genaue photometrische Messungen der Unterschiedsempfindlichkeit für Helligkeiten ergaben die völlige Wirkungslosigkeit des Strychnins. Mit dem Pupilloskop von Hess vorgenommene messende Untersuchungen des Verhaltens der Pupille an gesunden und kranken Augen zeigten, daß ein Einfluß des Strychnins mit Sicherheit auszuschließen ist. Pigmentwanderung und Myoidbewegung in der Froschnetzhaut

werden durch Strychnin nicht beeinflusst. Auf Geruch, Geschmack, Tastsinn und Gehör erwies sich Strychnin ebenso wirkungslos wie auf das Auge. *Kurt Steindorff*

Thibaudet, Emile: Notes complémentaires sur l'examen de l'acuité auditive et de l'acuité visuelle dans les expertises médico-légales. (Ergänzende Bemerkungen zur Prüfung des Hörvermögens und der Sehschärfe bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen.) Arch. de méd. et pharm. nav. Bd. 111, Nr. 5, S. 353—366. 1921.

Thibaudet nimmt Bezug auf seine im Dezember 1920 in der gleichen Zeitschrift veröffentlichten beiden neuen Verfahren zur Prüfung des Hör- und Sehvermögens, insbesondere behaupteter teilweiser Taubheit (Schwerhörigkeit) oder Erblindung, bestimmt, bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen Simulation, bzw. bei tatsächlich bestehendem Leiden eine Überlagerung durch Simulation zu erkennen, im letzteren Falle auch beides genau zu bemessen. Er gibt an, wie er und ebenso eine große Anzahl anderer Ärzte in den 2 Jahren seit der Veröffentlichung mit den neuen Methoden die besten Erfahrungen gemacht hat, sucht wieder anderer Ärzte gegen dieselben zu widerlegen und betont, im Hinblick auf französischen Verhältnisse, wie gerade die jetzige Nachkriegszeit zur Bekämpfung der Rauschsucht vieler, die teils nur Wochen oder Tage zum Garnisondienst eingezogen waren, vorläufig Untersuchungsverfahren zur Überführung von Simulanten bedarf. *Herwart Fischer.*

Kawano, R.: Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Säugerlabyrinths. (Physiol. Inst., Univ. Wien.) Arch. f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopfheilk. Bd. H. 2/3, S. 89—134. 1922.

Es wurde bei Mensch, Kaninchen, Ratte und Maus die Entwicklung der sog. Netznervenzellapparatur in den Zellen der Labyrinthanlage bei Differenzierung dieser Zellen in indifferenten, sekretorisch tätigen Sinneszellen und Stützelementen genau verfolgt. Es wurde dabei festgestellt, daß die Netzapparate in ungewöhnlicher Form, atypisch in den indifferenten, flachen Auskleidungsstellen gefunden werden, in typischer Form und am längsten in den Sinneszellen, nahe deren freiem Pol, weniger typisch und mehr in der Zellbasis genähert, in den Stützzellen sich ausbilden, während in den sekretorisch tätigen Zellen des Epithels der Stria vascularis sie relativ früh verschwinden. In den Ganglienzellen werden sie zuerst polarwärts gegen den proximalen Zellfortsatz, der bipolaren Zelle gefunden, wobei eine komplizierte Ausbildung im Ganglion vestibulare als im Ganglion cochleare beobachtet wurde. Die Mitochondrien betrifft, so wurden mit Hilfe von Silberimprägnationen diese Bestandteile in allen Elementen des Labyrinths, wenn auch in verschiedenem Ausmaß, nachgewiesen. Es fand sich nichts, was als deren Umwandlung in Neurofibrillen oder Stützfibrillen hätte deuten lassen. In Elementen, wo der Netzapparat wenig hervortritt, wie in den Epithelien der Stria sind sie besonders stark entwickelt. Wichtig erscheint die mit Hilfe der Netzapparatdarstellung gefundene Tatsache, daß auch in den Zellen des Bindegewebes eine polare Orientierung in der Gegend des Limbus und des Ligamentum spirale durch Kräfte, welche vom Epithel ausgehen, gegen das Ende der Entwicklungsvorgänge erzielt wird, wobei sich die Achsen der Bindegewebszellen senkrecht auf die Fläche der epithelialen Kanäle einstellen. Für die cuticularen Hilfsapparate, die Cupulae, Otolithenmembran und die Tectoria wurde eine Abscheidung zuerst von allen noch nicht differenzierten Epithelien der Endstelle, dann eine schichtweise Absonderung nur von den Elementen in Übereinstimmung mit Helds Angaben gefunden und die Auffassung derselben als Exoplasmen im Sinne der Autoren abgelehnt. Die Entwicklung der Nerven wurde in Übereinstimmung mit den Darstellungen von Held und Kolmer gefunden und das Vorhandensein von Neurofibrillen in den oberflächlichen Lagen der Sinneszellen festgestellt. *W. Kolmer* (Wien).

Kragh, Jens: La réaction vestibulaire de la tête. (Die vestibuläre Reaktion des Kopfes.) (Serv. d'oto-rhino-laryngol., Rigshosp., Copenhague.) Acta oto-laryng. Bd. 4, H. 2, S. 209—218. 1922.

Verf. fand bei 37 von 40 Patienten nicht nur eine Augen-, sondern auch eine Kopfreaktion nach kalorischer Reizung. Während Drehung fand sich bei 5 von 60 Fällen eine Drehung des Kopfes entgegengesetzt der Drehrichtung, entsprechend der langsamen Nystagmusphase, nach der Drehung trat eine umgekehrte Kopfdrehung (entsprechend der Drehrichtung) auf. Diese Kopfdrehung hält Verf. für eine vestibuläre ausgelöst. Durch Änderung der Kopfhaltung während der Drehung so, daß die verschiedenen Bogengänge in die Optimumstellung gebracht werden, lassen sich typische Veränderungen der Kopfreaktion erzielen, deren Einzelheiten Verf. beschreibt.

K. Loewenstein (Berlin).

Plum, Aage: Methode zur quantitativen Messung der kalorischen Irritabilität des Vestibularapparates. (Vorl. Mitt.) (*Univ.-Ohrenklin., Kopenhagen.*) Beitr. z. Anat., Physiol., Pathol. u. Therap. d. Ohr., d. Nase u. d. Hals. Bd. 18, H. 5/6, S. 342—350. 1922.

Angabe einer komplizierteren Vorrichtung zur Messung des genauen Grades der zur kalorischen Reizung erforderlichen Temperatur. Gleichzeitig wird bis Rectaltemperatur bestimmt. (Die Latenzzeit, die zur Auslösung nötige Zeit, wie die erforderliche Wassermenge wird dabei nicht gemessen. Die Wassertemperatur wird bei Erzielung der erforderlichen Temperatur dauernd geändert. Dadurch dürfte die Methode auch nicht eine wirklich exakte sein. Ref.)

K. Löwenstein (Berlin).

Bárány, R.: Zur Zerlegung der Fallreaktion in zwei Komponenten. a) Reaktion des Körpers, b) Reaktion der Beine. (*Otol. Ges., Stockholm. 30. IX. 1921.*) Acta oto-laryngol. Bd. 4, H. 1, S. 73—75. 1922.

Schon 1913 gab Bárány eine Methode an, um die Reaktionsbewegungen des Kopfes und Körpers während eines vestibulären Reizes zu prüfen. Er befestigte an der Stirn einen Zeigestab und fand, daß der Körper in einer ganz charakteristischen Weise vorbeigeht, z. B. nach links bei Erzeugung eines rotatorischen Nystagmus nach rechts. — Wenn man die Fallreaktion bei einem Nystagmus rotatorius nach rechts prüft, so beobachtet man eine Neigung des Körpers nach links, dann oft Umfallen nach links. Dieses wird nur durch eine Beckenverschiebung nach rechts verhindert, wobei die Beine eine Innervation in der Frontalebene nach links erfahren. Um dies zu prüfen, stellte B. folgenden Versuch an. Er legte den Patienten auf das Nasiehbrett und dieses auf den Drehstuhl. Bei der Drehung in Rückenlage entsteht ein kräftiger rotatorischer Nystagmus nach rechts. Nun ließ er das Bein erheben und mit der Ferse auf den in der Horizontalebene des Körpers gehaltenen Finger zeigen. Es wurde mit beiden Beinen sehr kräftig nach rechts vorbeigezeigt. Bei dieser Patientin bestand auch ein sehr kräftiges Vorbeizeigen des Körpers und eine sehr kräftige Fallreaktion. Bei einer anderen Patientin, wo diese fehlte, war auch die Reaktion der Beine nicht vorhanden. Aufgabe ist es, die beiden Komponenten der Fallreaktion, die Bewegung des Körpers und die Bewegung der beiden Beine gesondert zu prüfen. Vielleicht werden sich dadurch Aufklärungen bezüglich mancher ungeklärter Befunde in der Literatur bei Tumoren des Kleinhirns ergeben (Löwenstein, Borchardt). Die Sonderung der Fallreaktion in ihre beiden Komponenten ermöglicht auch die Untersuchung der Fallreaktion bei Patienten, die nicht mehr stehen, sondern nur mehr sitzen können.

Cords (Köln).

Lewin, Kurt: Über den Einfluß von Interferenzröhren auf die Intensität obertonfreier Töne. (*Psychol. Inst., Univ. Berlin.*) Psychol. Forsch. Bd. 2, H. 3/4, S. 327 bis 335. 1922.

Mit Hilfe seines Intensitätsmessers untersucht Lewin den Einfluß an ein Hauptrohr seitlich angesetzter (Sauberschwarzscher) Interferenzröhren auf — ebenfalls durch Interferenz gereinigte — einfache Töne. Die Intensität fällt beim Ausziehen der Seitenröhren bis $\frac{1}{4} \lambda$ ziemlich gleichmäßig ab, bei weiterem Ausziehen bis $\frac{1}{2} \lambda$ steigt sie wieder bis zur vollen Höhe an. Die Interferenzbreite erstreckt sich also über die ganze Wellenlänge. Der Einfluß eines Interferenzrohres auf die Stärke des auszulöschenden Tones ist abhängig von seiner Lage zu Bäuchen und Knoten im Hauptrohr; aber auch diese selbst scheinen sich beim Ausziehen eines Seitenrohres etwas zu verschieben. Bei Einstellung eines Interferenzrohres auf einen Oberton wird der Grundton je nach der Lage des Seitenrohres geschwächt oder auch verstärkt. Einstellung mehrerer Interferenzrohre auf den gleichen Oberton bewirkt je nach Umständen bald Schwächung, bald Verstärkung des Grundtons: so wurde ein reines e^2 zunächst schwächer beim Ausziehen der ersten 6 Interferenzrohre (auf den 1. Oberton), dann aber wieder stärker und hatte bei 13 Interferenzröhren fast wieder die ursprüngliche Stärke; Interferenzstellungen auf den 4. Oberton verstärkten von Anbeginn zunehmend. Die

Erscheinungen erklären sich daraus, daß Haupt- und Nebenröhren ein enggekoppeltes System bilden. Die Wirkung eines einzelnen Interferenzrohres läßt sich ohne Berücksichtigung der Gesamtkonstellation nicht voraussagen. v. Hornbostel (Steglitz)

Dean, L. W. and C. C. Bunch: The study of the tonal ranges in lesions of the middle ear. (Untersuchung des Hörvermögens für Töne bei Mittelohrerkrankungen.) Ann. of otol., rhinol. & laryngol. Bd. 31, Nr. 3, S. 617—659. 1922.

Sorgfältige Untersuchung eines großen klinischen Materials zeigt, daß mit Mittelohrerkrankungen fast ausnahmslos Schädigungen des Nerven und Endorgans verbunden sind. Für diese sind symptomatisch: Herabsetzung des Hörvermögens für hohe Töne (geprüft mit Gabeln und dem Audiometer — vgl. diese Berichte 14, 269 — zwischen 30 und 7070 v.); Herabsetzung der oberen Hörgrenze, besonders bei Knochenleitung, die hier diagnostisch viel bezeichnender ist als Luftleitung; Rinne positiv; herabgesetztes Hörvermögen für niedrige Tonregionen (partielle Tonlücken); verkürzte Hördauer bei Knochenleitung. Bei akuten Mittelohrerkrankungen sind die Affektionen des Nerven und Endorgans fast immer auch schon im Anfangsstadium, nachweisbar; sie brauchen bei Behandlung und Heilung des Mittelohrs nicht zurückzugehen; sie sind unabhängig vom Grad der Mittelohrerkrankung, oft ist auch das „gesunde“ Ohr von ihnen mitbetroffen. Dagegen sind die Schädigungen des Nerven und Endorgans bei chronischen Mittelohrleiden, die auch hier mit einer einzigen Ausnahme nie fehlten, schwerer und von der Ausdehnung der Mittellohraffektion abhängig; das „gesunde“ Ohr ist weniger häufig mitbetroffen. v. Hornbostel (Steglitz)

Skelett. Bewegung. Sprache.

Weinnoldt, Hedda: Untersuchungen über das Wachstum des Schädels unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Tl. 2. (Städt. Krankenanst., Münchenheim.) Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 70, H. 3, S. 345—391. 1922.

Der 2. Teil bringt eine Diskussion der Thomaschen Lehre von den Ursachen der pathologischen Nahtsynostosen. Intrauterine Druckwirkungen können durch Immobilisation, Verhinderung der Nahtlinienbewegung eine Rolle spielen. Erhöhte Spannungen können im Bereich der synostosierter Nähte nicht zu Flächenwachstum anregen, sondern nur zu Dickenwachstum. Es ist zuzugeben, daß Gehirnanomalien zu Schädeldeformitäten führen, doch kann in vielen Fällen nicht ergründet werden, wie die zeitliche Aufeinanderfolge sich abgespielt. Nahtsynostosen können Ursache sein. Bei Unterbrechungen der Biegungsspannungen (anatomische Defekte im Wachstumsalter) flachen sich die begrenzenden Knochenteile ab. Bei Nahtverknöcherungen wachsen die Biegungsspannungen an und setzen der Ausdehnung des Schädels größeren Widerstand entgegen, das Gehirn paßt sich mit seiner Form in solchen Fällen an, ist nicht das primär geschädigte Organ. Dolichocephalie durch intrauterine Schädelkompression ohne Nahtsynostose hat andere Merkmale als frühzeitige Nahtsynostose bei Dolichocephalie, weil hier senkrecht zur verknöcherten Naht die Ausdehnung behindert ist und parallel zu ihr ein kompensatorisches Wachstum einsetzt. Für die Entstehung der Synostosen wird gegen Thoma die Bedeutung von Traumen hervorgehoben und aus Krankengeschichten und morphologischem Verhalten gestützt. Die von Thoma berügte Lücke, daß bisher keine Nahttraumen beobachtet seien, wird durch Mitteilung von drei frischen Fällen ausgefüllt. Die Überschiebung der Parietalia mit der Möglichkeit der Fixation als chronisches Trauma für die Entstehung von Deformitäten gewürdigt. Trauma ist neben Störungen der Keimanlage nur eine ausschließliche Ursache vorzeitiger Synostosen. (Vgl. dies. Ber. 13, 349.) Busch (Erlangen)

Bolk, L.: Das Problem der Orthognathie. Verslagen der Afdeling Natuurkunde, Koninkl. Akad. d. Wiss., Amsterdam, Tl. 31, Nr. 7/8, S. 415—425. 1922. (Hollandisch.)

Die Verfolgung der Frage, ob die Orthognathie des Menschen, im Gegensatz zur gewöhnlichen Annahme über die Entstehung derselben aus der tierischen Prognathie, eine fiktive fötale Eigenschaft sei, führte zum Schluß, daß der gesamte Komplex menschlicher Eigenschaften im Schädel ein zusammenhängendes Ganzes bildet. Die typischen Differenzen zwischen Ortho- und prognathem Schädel gipfeln in dem auseinandergehenden Verhalten der gegenseitigen Stellung der Nasen- und Schädelhöhle einerseits, in der verschiedenartigen Abknickung der Schädelbasis andererseits; beim Menschen findet man einen nach unten-vorn offenen Sphenoidalwinkel, beim Tier eine nach hinten-oben offene, als Ethmoidalwinkel bezeichnete Abknickung zwischen Präsphenoide und Ethmoid. Nach diesen Kennzeichen sollen die Schädel sämtlicher Primaten bei den Orthognathen eingeteilt werden; der Entwicklungsgrad der Kiefer ist nach Verf. ein unrichtiger Maßstab bei der Einteilung der Schädel. Indem die Affen einen deutlichen Sphenoidalwinkel besitzen, führt die Schnauzbildung bei manchen Affenspezies eine derartige Ähnlichkeit mit prognathen Schädeln herbei, daß diese Formen vom Verf. als pseudopognath differenziert werden. Die Fötera sämtlicher Säugetiere sind anfänglich orthognath, haben einen Sphenoidalwinkel, die Nasenhöhle liegt unterhalb der Schädelhöhle. Zunächst schwindet dieser Sphenoidalwinkel; die Nasenhöhle dreht sich allmählich

daß, im Gegensatz zu diesen Veränderungen, das menschliche Gesicht sich als eine fixierte fötale Eigenschaft kennzeichnet. Diese Umwandlung der Orthognathie in Prognathie erfolgt schon bei den Reptilien, wie an einem Embryo von *Lacerta* dargetan wird; der zu Anfang unterhalb der Hirnschädelbasis befindliche Teil des Gesichts erlangt sekundär eine Stellung vor dem Hirnschädel; daß im Anschluß an diese Rotation die Plagiostomie in eine Teleostomie übergeht, wird nebenbei erwähnt. In zweiter Instanz wird der Nachweis geführt, daß der Entwicklungs-vorgang bei Säugetieren manche Übereinstimmung mit demjenigen der Reptilien darbietet. Von den Säugetieren wird die Sachlage bei *Mus decumanus* beschrieben: Der Sphenoidalwinkel findet sich an der Durchtrittsstelle der Hypophyse durch die Schädelhöhle. Während die Schädelbasis im ganzen einen horizontalen Verlauf hat, ist die Achse des Nasenseptums vertikal, steht also senkrecht zur Schädelbasis; die Nasenhöhle des Mus liegt also in diesem Entwicklungsstadium unterhalb der Schädelhöhle. Diese orthognathischen Eigenschaften sind nicht die Folge der kräftigen Entwicklung der Hirnhemisphäre, indem sie auch bei Reptilien vorhanden sind; die bei *Mus* vorliegenden Verhältnisse sind also von der reptilienartigen Urform der Säugetiere ererbt; die Reptilien verdanken dieselben ihrerseits wieder einfacheren Vertebraten. In der Umbildung der Orthognathie zur Prognathie ist ein gewisses Regelmäß un-verkennbar; zunächst tritt die Streckung der Schädelbasis ein, also der Ausgleich des Sphenoidalwinkels. Dieser Schwund geht mit einer Richtungsveränderung des Nasenseptums einher, indem letzteres etwas schief der Schädelbasis gegenübergestellt wird. Dann erfolgt die zweite grundsätzliche Umwandlung der Schädelbasis, namentlich die Bildung des Ethmoidalwinkels, unter obenwärts gerichteter Drehung des vorderen ethmoidalen Anteils der Schädelbasis mit dem an demselben fixierten Nasenseptum. In Wirklichkeit wird also jetzt ein Teil der Schädelbasis zur vorderen Abgrenzungswand der Schädelhöhle. Schluß: Der für den menschlichen Schädel so charakteristische Sphenoidalwinkel wird nicht durch die energische Entwicklung des menschlichen Gehirns gebildet; derselbe ist im Gegenteil das wesentliche Kennzeichen des Primordialskeletts der Wirbeltiere im allgemeinen. Andererseits kann ein Gehirnwachstumseinfluß nicht von der Hand gewiesen werden, wie im Schluß der Arbeit durch Vergleich des Schädels des Hundefoetus und des menschlichen Foetus ausgeführt wird. Beim Hund fixiert die Schädelkapsel sich am vorderen Rande der Schädelbasis, beim Menschen hingegen, infolge der kräftigen Hemisphärenentwicklung, an der häutigen Schädelkapsel, so daß bei letzterem ein relativ großer Teil des Nasenseptums in die Schädelhöhle aufgenommen wird. Mit Hilfe dieser Verschiebung der Schädelkapsel auf die vordere Fläche der Nasenkapsel können drei anscheinend heterologe Erscheinungen: *Crista galli*, *Ponticulus metopieus* und intraorbitale Lage des Tränenkanals, in einfacher Weise gedeutet werden. Sämtliche Primaten besitzen eine *Crista galli*, bei denselben ist die Insertion der Schädelkapsel auf der Nasenkapsel verschoben, wie durch die intraorbitale Lage des Foramen lacrymale erwiesen wird.

Zeehuizen (Utrecht).

Winkler, Rudolf: Der funktionelle Bau des menschlichen Kieferapparates. **TL. I.** Die Gesetze der Statik und ihre Anwendung auf den Kieferapparat. (*Zahnärztl. Univ.-Inst., Univ., Frankfurt a. M.*) Dtsch. Zahnheilk. Jg. 1922, H. 55, S. 84 bis 155. 1922.

Nach einer längeren Schilderung der Elemente der Statik versucht Verf. auf der Grundlage ihrer Gesetze die Kraftwirkungen beim Bewegen des Unterkiefers und beim Kauen unter Berücksichtigung verschiedener Belastung festzustellen. Es wird der Einfluß der Neigung der Zahnreihen in der Gegend der großen Backenzähne des Unterkiefers nach innen sowie der der Krümmung der Okklusionsebene und der Zahnhöcker nebst der aktiven Wirkung des Oberkiefers hierbei erörtert. Schließlich wird noch die Wirkung auf die Speisen, auf die einzelnen Zähne und die Kieferknochen besprochen. Im übrigen muß auf das Original verwiesen werden. *Julius Misch* (Berlin).

Kenyon, Elmer L.: Significance of the extrinsic musculature of the larynx. Its relationship to certain disorders of the voice. (Die Bedeutung der äußeren Muskulatur für den Larynx. Ihre Beziehungen zu gewissen Erkrankungen der Stimme.) *Journ. of the Americ. med. assoc.* Bd. 79, Nr. 6, S. 428—431. 1922.

Aus den Darlegungen dieser Abhandlung ist folgendes herauszuheben: Der Kehlkopf, das Zungenbein und der Zungenrund müssen als eine physiologische Einheit betrachtet werden, von deren Zusammenwirken die Stimmbildung abhängt. Der Kehlkopf bildet mit seiner gesamten äußeren und inneren Muskulatur ein System, durch dessen Bewegungen die Tätigkeit der Stimmbänder bedingt ist. Die Gegend des Zungengrundes schafft vor allem die Größe des Resonanzraumes. Die Tätigkeit der

äußeren Muskulatur kann in einem hohen Maße durch Betasten der Regio thyreohyoid beurteilt werden. Durch eine solche Palpation ist die Diagnose auf Aphonie aus cerebraler Ursache mit Leichtigkeit zu stellen. *Emil v. Skramlik* (Freiburg i. Br.).

Fermente. Gärungschemie. Mikroorganismen.

Händel, M. und E. Segall: Zur Frage der sog. oligodynamischen Wirkung. Versuche über Einfluß metallischen Kupfers auf Blutkatalase. (*II. med. Un. Klin., Wien.*) Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 97, H. 1/2, S. 1—11. 19

Die Blutkatalase wird durch metallisches Kupfer geschädigt, während die Spontanzersetzung von Wasserstoffsuperoxyd nicht beeinflußt wird. Die Schädigung äußert sich stärker im Licht als im Dunkeln, bei Anwendung physiologischer Kochsalzlösung stärker als von Wasser. Gekupfertes Wasser und Glasgefäße wirken wie blankes Kupfer. Die gefundene Wirkung des blanken Kupfers auf Katalase zeigt die charakteristischen Merkmale der oligodynamischen Wirkungen. Der zeitliche Reaktionsablauf der Wasserstoffsuperoxyd-Zersetzung durch Katalase erfolgt auch bei Anwesenheit von blankem Kupfer oder Kupfersulfat annähernd nach dem Gesetze der monomolekularen Reaktion. Die Versuche können durch Lösungsvorgänge erklärt werden. Für die Annahme einer besonderen Energie besteht kein Bedürfnis.

Martin Jacoby (Berlin)

Marinesco, G.: Du rôle des ferments oxydants dans la production de la fièvre et des inflammations. (Über die Bedeutung der Oxydationsfermente bei der Entstehung des Fiebers und der Entzündungen.) Cpt. rend. hebdom. des séances l'acad. des sciences Bd. 175, Nr. 22, S. 1114—1116. 1922.

Die Leukocyten, die während des Fiebers im Blut vermehrt sind, enthalten Oxydationsfermente. Die Temperatursteigerung wird auf die Funktion der Fermente zurückgeführt. Auch beim experimentellen Fieber, das durch Läsionen des Zentralnervensystems hervorgerufen wird, kommt die Temperatursteigerung nach Annahme des Verf. auf diesem Wege zustande. Ähnlich ist die Temperatursteigerung bei Entzündungen aufzufassen.

Martin Jacoby (Berlin)

Schlossmann, Erna: Zur Kenntnis des lipolytischen Milchfermentes. (*Sch. Krankenanst. u. Säuglingsheim, Dortmund*) Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 33, bis 4, S. 218—222. 1922.

Die für Frauenmilchlipase kritische Temperatur liegt zwischen 64 und 65°. Mischt man Frauenmagermilch mit Kuhmilch, so bleibt die lipolytische Wirksamkeit bestehen, wenn die Frauenmagermilchmenge unter $\frac{1}{3}$ der Kuhmilchmenge sinkt. Das lipolytische Ferment der Frauenmagermilch kann durch längeres Schütteln nicht inaktiviert werden.

Heinrich Davidsohn (Berlin).

Lüers, Heinrich und Paul Lorinser: Über die Hitzeinaktivierung der Amylase in Abhängigkeit von der Wasserstoffionenkonzentration. (*Laborat. f. angew. Chem. Techn. Hochsch., München.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4/6, S. 487—492. 1922

Bei einem nach Sherman aus Grünmalz dargestellten Amylasepräparat bestimmt man bei der Hitzeinaktivierung die Konstante, in Acetatpuffergemischen, bei der Reaktion der optimalen Wirkung ($p_H = \text{ca. } 5$) am kleinsten, nimmt jedoch zu beiden Seiten des Wirkungsoptimums rasch zu. Die Amylase ist also beim p_H -Optimum am stabilsten gegen Einwirkung höherer Temperaturen. *Martin Jacoby* (Berlin).

Da Fonseca, H.: Influence de quelques sels minéraux sur l'action amylolytique de la pancréatine. (Einfluß einiger Mineralsalze auf die amyolytische Wirkung der Pankreatins.) (*Inst. de physiol., fac. de méd., Lisbonne.*) Cpt. rend. des séances Acad. soc. de biol. Bd. 87, Nr. 33, S. 1033—1035. 1922.

Natriumchlorid und Calciumchlorid fördern, Zinkchlorid und Zinksulfat hemmen die Einwirkung des Pankreatins auf Kartoffelstärke, Natriumsulfat ist ohne Einwirkung.

Martin Jacoby (Berlin)

Berczeller, L. und J. Freud: Die Wirkung des Jods auf die Diastase. (*Physiol. Inst., Univ., Wien.*) Biochem. Zeitschr. Bd. 133, H. 4/6, S. 493—501. 1922.

Jod schwächt die Speicheldiastase. Mit Zunahme der Jodkonzentration nimmt die Hemmungswirkung zu. Aber auch bei großem Jodüberschuß wird bei Zimmer-temperatur keine vollkommene Inaktivierung der Diastase erreicht. KMnO_4 verhält sich gegenüber der Diastase wie Jod. Bei Gegenwart von Stärke verbraucht Speichel ebensoviel Jod als ohne Stärke, die Jodinaktivierung schreitet langsam mit der Zeit vorwärts. Die Gegenwart von Jod hemmt auch den diastatischen Prozeß, abgesehen von der direkten Einwirkung auf das Ferment. In Gegenwart von Jod scheint Diastase und Stärke schon zu reagieren, nach Entfernung des Jods tritt dann sofort die Spaltung ein. Stärkezusatz mildert den Einfluß des Jods auf die Diastase. In Betracht kommen an Reaktionen die Inaktivierung der Diastase durch Jod, die Schutzwirkung der Stärke gegen die Jodinaktivierung und die Hemmung der Stärkehydrolyse durch Jod. Jodzusatz wirkt auch auf die Säurehydrolyse hemmend. *Martin Jacoby* (Berlin).

Kai, Sotaro: Is phospholipin constituent of hydrolytic enzymes? (Ist Phospholipin ein Bestandteil der hydrolytischen Enzyme?) (*Dep. of biochem., univ. Cincinnati.*) Japan med. world Bd. 2, Nr. 10, S. 291—296. 1922.

Kleine Mengen von Kephalin sind ohne Einfluß auf die Pepsinwirkung, größere hemmen. Auch Pepsinogen wird nicht durch Zusatz von Kephalin verstärkt. Auch nach Extraktion mit Benzol ist Kephalin ohne Einfluß. Dasselbe gilt für Lab und Trypsin. *Martin Jacoby* (Berlin).

Gross, Oscar: Über quantitative Pepsinbestimmung für die Praxis. (*Med. Klin., Univ. Greifswald.*) Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 30, H. 3/4, S. 227—228. 1922.

Jarnos Modifikation der Grossschen Methode ist zu verwerfen. *Martin Jacoby*.

Jarno, Leo: Erwiderung auf obige Bemerkungen: Über quantitative Pepsinbestimmung für die Praxis. Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 30, H. 3/4, S. 229. 1922. Jarno hält daran fest, daß seine Modifikation der Grossschen Methode ein Fortschritt ist. *Martin Jacoby* (Berlin).

Effront, Jean: Sur l'absorption de la pepsine par les papiers à filtrer. (Über die Adsorption des Pepsins durch Filtrierpapier.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 33, S. 1058—1059. 1922.

Filtrierpapiere adsorbieren Pepsin ganz verschieden. Marke Laurent gar nicht, Berzelius 10%, Schleicher und Schüll 589 33%, H. J. M 100 39%, Dreyerhoff 147 50%, 402 90%, 311 100%. Die Adsorptionskraft hängt nicht von der Reinheit der Cellulose, sondern von der physikalischen Struktur ab. Die Adsorption nimmt mit der Konzentration der Pepsinlösung zu. Je höher die Temperatur, desto schneller erfolgt die Adsorption. Jedoch nimmt bei höherer Temperatur die Wirksamkeit des Pepsins zu schnell ab. Die Reaktion ist ohne Bedeutung. Kochsalz hat einen gewissen Einfluß. *Martin Jacoby* (Berlin).

Castellani, Aldo and Frank E. Taylor: Identification of inulin by a mycological method. (Nachweis von Inulin durch eine mykologische Methode.) (*London school of trop. med. a. King's coll., univ., London.*) Biochem. journ. Bd. 16, Nr. 5, S. 655—658. 1922.

Wie Castellani früher beschrieben hat, vergärt *Monilia macedoniensis* Castellani Inulin unter Gasentwicklung. Auf Grund dieser Eigenschaft haben die Verf. folgende Methode zum Inulinnachweis ausgearbeitet: Von der zu prüfenden Substanz wird eine 1proz. Lösung in zuckerfreiem Peptonwasser hergestellt und auf zwei Probierröhrchen (Nr. 1 und 2) verteilt. Beide Röhren werden mit je einem Gär-röhrchen verbunden. In einem ersten Versuch wird dann Röhre 1 mit *Monilia macedoniensis*, Röhre 2 mit *Monilia tropicalis* Cast. geimpft, beide Röhren werden während 72 Stunden im Brutschrank bei 35—37° gehalten. Hat sich hiernach in Röhre 1 Gas gebildet, in Röhre 2 aber nicht, so ist der Schluß auf Inulin gegeben, da *M. macedoniensis* Glucose, Lävulose, Galaktose, Saccharose und Inulin unter Gasbildung

vergärt, *M. tropicalis* aber nur Glucose, Lävulose, Maltose, Galaktose und Saccharose. In einem zweiten Versuch wird mit den gleichen Schlußfolgerungen *M. maced.* und *M. rhei* Cast. verwendet. Für den dritten Versuch wird geimpft mit *M. maced.* und *Bacillus pseudocoli* oder *B. neapolitanus* oder mit einem anderen zur Communiorgruppe gehörigen *Bacillus*. In diesem Falle bleiben die Röhren 4 Tage lang bei 37° im Brutschrank; Schlußfolgerung wie oben. Zum vierten Versuch wird geimpft mit *M. maced.* und *Bacillus asiaticus* Cast., 4 Tage lang im Brutschrank bei 37°, Schlußfolgerung wie oben. Ist anzunehmen, daß neben Inulin andere vergärbare Substanzen im Versuchsmaterial zugegen sind, so impft man zunächst nur mit *M. tropicalis*. Wenn nach Erschöpfung durch diesen Pilz dann noch Gärung unter Gärungsbildung durch *M. macedoniensis* möglich ist, war Inulin im Versuchsmaterial vorhanden. Es ist hierzu nötig, solche Stämme beider Pilze auszuwählen, die auf Glucose, Lävulose, Galaktose und Saccharose die gleiche Gärkraft besitzen. Dörrie

Müller, Fritz: Über die Bedeutung von Zucker und Eiweiß für die bakterielle Gärung. (*Univ.-Kinderklin., Frankfurt a. M.*) Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 34, H. 4, S. 158—164. 1922.

Die fördernde Wirkung von Eiweiß auf die Zuckervergärung durch *Bact. coli* (an verschiedenen Gruppen untersucht) beruht zum großen Teil auf seinem Pufferungsvermögen. In einem puffernden Medium wird im gleichen Zeitraum einerseits mehr Zucker vergoren, und anderseits die Acidität niedriger gehalten als in einem pufferärmeren; besonders deutlich zeigt sich dies Verhalten bei kurzem Verlauf des Gärungsprozesses. Der Einfluß der Zuckerkonzentration auf die Gärung hängt daher auch vom Puffergehalt des Mediums ab. Solange Zucker vorhanden ist, steigt die Acidität des Nährbodens, um nach Vergärung des Zuckers durch Spaltung des Eiweißes wiederum zu sinken. Je nach der Größe des Quotienten $\frac{\text{Zucker}}{\text{Pufferung}}$ tritt dieser schlag früher oder später ein. Diese experimentellen Ergebnisse tragen zur Erklärung der Wirkung von Eiweiß und Kalkgaben in der Säuglingsernährung bei. Die stärkere Pufferbedingung 1. raschen Zuckerverbrauch bei der bakteriellen Gärung im Darm und damit rasches Einsetzen von Fäulniserscheinungen, die durch Zucker gehemmt werden; 2. Niedrighaltung der Acidität im Darm, dadurch Verminderung der Menge indissoziierten Säuren, deren reizende Wirkung vielfach angenommen wird. Fritz Müller (Frankfurt a. M.)

Seales, F. M.: A new method for differential staining of bacteria. (Eine neue Methode zur Differentialfärbung von Bakterien.) (*Off. of soil bacteriol. invest., Bureau of plant industry, U. S. dep. of agricult., Washington.*) Journ. of infect. dis. Bd. 11, Nr. 5, S. 494—498. 1922.

Der lufttrockene Objektträger (Fixieren nicht nötig) wird für 20—30 Sekunden mit phenolhaltigen Farblösung (Baumwollblau C₄B) übergossen, dann gespült. Entfärbung durch Gegenfärbung mit acetone-alkoholischer Safraninlösung 3—4 Minuten. Waschen, Trocknen. Grampositive Bakterien sind tiefblau, gramnegative rot. Trocknen, Erhitzen, Altern. sonstige die Permeabilität der Zellmembran beeinflussende Faktoren beeinflussen auch die Färbereffekte. Seligmann (Berlin)

Kopeloff, Nicholas and Philip Beerman: Modified gram stains. (Modifizierte Gramfärbungen.) (*Dep. of bacteriol., New York state psychiatr. inst., Ward's island, New York City.*) Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. 5, S. 480—482. 1922.

Das lufttrockene Präparat wird in schwacher Hitze fixiert. Aufgießen von Farblösung (Gemisch von 30 Tropfen 1proz. wässriger Methylviolett-6-B-Lösung mit 8 Tropfen 1proz. Natriumcarbonatlösung). 5 Minuten Färben; Jodlösung zum Abspülen und Beizen 2 Minuten (2 g Jod in 10 ccm Normalnatronlauge + 90 ccm Wasser). Abgießen. Abspülen mit 10% Aceton, bis keine Farbwolken mehr abgehen (10 Sekunden und weniger). Lufttrocknen. Gegenfärben mit 0,1proz. wässriger Lösung von basischem Fuchsin 10—30 Sekunden. Seligmann (Berlin)

Henriques, O.-M.: Sur la détermination de la concentration en ions hydroniques dans les milieux de culture gélosés. (Die Bestimmung der Wasserstoffzahl in agar-nährböden.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 37, S. 1220—1222. 1922.

Zur Ausführung der Indicatormethode empfiehlt Verf., das erstarrte Agar gegen kohlensäurefreies destilliertes Wasser zu dialysieren und darin die Bestimmung auszuführen. Kontrollproben ergaben richtige Resultate. Die Methode eignet sich auch zur Bestimmung der sauren oder alkalischen Reaktion von bakteriell-haltigen Bouillon-nährböden, die man zuerst mit ganz reinem Agar in Gleichgewicht setzt, worauf letzteres gegen destilliertes Wasser dialysiert wird. Die Messung erfolgt dann im Dialysat. — Wird Agar mit verschiedenen wohldefinierten Puffern in Gleichgewicht

gesetzt, so bleibt im allgemeinen p_H im Puffer ungeändert, nur in saureren Gebieten wird er etwas vergrößert. Der Ursprung der Säurebindung ist ungeklärt. (Gyemant (Berlin).)

Skar, Olav: Mikroskopische Zählung und Bestimmung des Gesamtkubikinhaltés der Mikroorganismen in festen und flüssigen Substanzen. (*Laborat. f. Nahrungs-mittelkontr. des Gesundheitsamtes, Kristiania.*) Zentralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. II, Bd. 57, Nr. 14/17, S. 327—344. 1922.

Es wird ein Präparat von bestimmter Dicke hergestellt oder eine bestimmte Substanzmenge wird über eine Fläche von bestimmter Größe auf dem Objektträger verteilt. Die Zählung der Mikroorganismen in dem gefärbten Präparat geschieht unter Verwendung eines besonderen Zählkulars mit begrenzten Flächen von solcher Größe, daß mit dekadischen Einheiten zu multiplizieren ist. Die Bakterien werden in einer Anzahl von Gesichtsfeldern gezählt und multipliziert mit der Zahl für die Durchschnittsgröße, durch Hilfe der Skala des Zählkulars und einer Tabelle bestimmt, sowie mit der Flächenzahl, die ebenfalls einer Tabelle zu entnehmen ist. (Seligmann (Berlin).)

Goy, P.: Action de filtrat de Mucor sur le développement des cultures microbiennes. (Einfluß von Mucor-Filtrat auf die Entwicklung von Bakterienkulturen.) Apt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 32, S. 1007—1008. 1922.

In früheren Arbeiten hatte Verf. nachgewiesen, daß sterile Filtrate älterer Kulturen von verschiedenen Mucorarten (Filtration von 12—15 Tage alten Kulturen in Fleischbrühe mit 1% Glucosezusatz durch Papierfilter und Sterilisation 15 Minuten bei 120°) das Wachstum vieler Organismen, besonders von Hefen begünstigen. Die Beobachtung, daß der aktive Stoff eine 1½-stündige Erhitzung auf 130° vertrug, sprach gegen seine Identität mit dem Vitamin B. Die vorliegende Mitteilung dehnt die Untersuchung auf den Einfluß des Filtrates auf pathogene Bakterien aus (*Bac. histolyticus*, *B. perfringens*, *B. sporogenes*, *Diphtheriobacillen*, *Kochscher Bacillus*, *Streptokokken*). Für alle diese Bakterienarten läßt sich eine Wachstumsbeschleunigung durch das Filtrat feststellen. Das endgültige Erntegewicht der Kulturen dagegen wird durch Filtratzusatz nicht merkbar verändert. Auf die Toxinbildung und die Virulenz des *Bac. histolyticus* hat das Filtrat keinen Einfluß. Ebenso wie durch starke Erhitzung kann der aktive Stoff auch durch Radiumbestrahlung zerstört werden. (R. Bauch.)

Seitz, Arthur: Die Methämoglobinplatte. Nebst Untersuchungen über die Veränderung der Blutplatten durch Streptokokken. (*Hyg. Inst., Leipzig.*) Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 96, H. 2, S. 216—224. 1922.

Verf. studierte das Verhalten von Streptokokken und Pneumokokken Methämoglobinhaltigen Nährböden gegenüber. Es wurde z. B. 42° warmer 1proz. Traubenzuckeragar mit einer 1proz. Lösung von Methämoglobin bis zur deutlichen Braunfärbung versetzt und damit Platten gegossen. Oder dem auf 72—74° abgekühlten Agar wurden etwa 5% Kaninchen- oder Hammelblut oder auch 3% von jeder Blutart zugesetzt. Verf. findet, daß der Methämoglobinnährboden bedeutend empfindlicher als Reagens auf hämolytische, sowie Viridansstreptokokken und Pneumokokken ist als die rote Hämoglobinplatte. Bereits nach 10 Stunden zeigt Viridans starke Aufhellung mit grünlicher Verfärbung der Ränder, Haemolyticus starke Aufhellung. Gegenüber Pneumokokken war der grünlich schillernde Rand für die Viridansstämmen charakteristisch. (Carl Günther (Berlin).)

Manteufel, P.: Über Anaerobenzüchtung. (9. Tag. d. Dtsch. Vereinig. f. Mikrobiol., Würzburg, Sitzg. v. 8.—10. VI. 1922.) Zentralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I: Orig., Bd. 89, H. 1/3, S. 248—251. 1922.

1. Verfahren zur anaeroben Kultur in Flüssigkeiten: Der Nährflüssigkeit wird auf 10 cm 0,5 cm einer 1/2proz. Natriumsulfidlösung (als Reduktionsmittel) zugesetzt; dann wird durch leichtes Erwärmen verflüssigte weiße, petroleumfreie Vaseline 0,5 cm hoch geschichtet. Als Kontrolle des anaerobischen Effekts geht ein Kontrollröhrchen mit, dem 10 Tropfen einer 1proz. sterilen wässrigen Methylenblaulösung zugegeben ist. In wenigen Minuten muß der Farbstoff entfärbt sein und so dauernd bleiben. — 2. Verfahren zur gleichzeitigen Züchtung unteraeroben und anaeroben Bedingungen: In eine mit Natriumsulfidlösung (5,0) versetzte und beimpfte Nährlösung wird ein langes, enges Glasröhrchen, das oben geschlossen ist, so eingesetzt, daß es mit Flüssigkeit gefüllt und oben geschlossen dem äußeren Reagensgläschen steht. Im äußeren Röhrchen herrschen dann aerobe, in dem inneren, inneren anaerobe Bedingungen. War mit einem Gemisch von Aerobiern und Anaerobiern geimpft, so wachsen diese nur im inneren, jene nur im äußeren Röhrchen. Das innere Röhrchen kann herausgenommen werden, ohne daß die Flüssigkeit ausläuft (Capillarität!), und so weiter weiterarbeitet werden. (Seligmann (Berlin).)

Richardson, A. C. and C. C. Dozler: A safe method for securing anaerobiosis with hydrogen. (Eine sichere Methode zur Herstellung der Anaerobiose mit Wasserstoff.) (*George Williams Hooper found. j. med. research, univ. of California med. school, Francisco.*) Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. 6, S. 617—621. 1922.

Beschreibung und Abbildung der Apparatur, die es ermöglicht, ohne nennenswerten Feuers- oder Explosionsgefahr in partiellem Vakuum eine Wasserstoffatmosphäre herzustellen, in der zuverlässige anaerobiontische Verhältnisse herrschen. *Seligmann* (Berlin).

Larson, L. W. and W. P. Larson: Factors governing the fat content of bacteria and the influence of fat on pellicle formation. (Faktoren, die den Fettgehalt Bakterien beherrschen, und der Einfluß des Fettes auf die Hautbildung.) (*Dep. of bacteriol. a. immunol. univ. of Minnesota, Minneapolis.*) Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. 5, S. 407—415. 1922.

Reinkulturen in Bouillon, Dextrosebouillon und Glycerinbouillon wurden 4 bis 37° gehalten, dann in einer Sharpless-Zentrifuge ausgeschleudert (40 000 Umdrehungen in der Minute). Das Sediment wurde mehrmals gewaschen, dann in Becherglas übertragen, mit wasserfreiem Aceton tüchtig durchgerührt und 3—5 Tage stehen gelassen. Danach scharfes Zentrifugieren, Abdekantieren und frischer Acetonzusatz bis zu einer Behandlungsdauer von 10—14 Tagen. Hierauf Extraktion mit redestilliertem Äther. Dann Abdunsten und Trocknen im Vakuum über P_2O_5 . Untersucht wurden so Colibacillen, Staphylokokken, *Bacillus mucosus* und *Bac. megatherium*. Der Prozentsatz der Extraktivstoffe, die im wesentlichen fetthaltiger Natur sind, schwankt je nach dem angewandten Nährboden, jedoch in verschiedener Weise bei den verschiedenen Mikroorganismen. Die Erklärung liegt darin, daß Kohlehydrate und Glycerin in fettartige Substanzen nur dann umgewandelt werden, wenn sie von den betreffenden Bakterien nicht zersetzt werden. Durch Extraktion mit Petroläther, der nicht wie Aceton auch andere, nicht fettartige Substanzen löst, wurden die Verhältnisse kontrolliert und im grundsätzlichen bestätigt. Hautbildung der Bakterien hängt sowohl von der Oberflächenspannung des Mediums wie von dem Fettgehalt der Mikroorganismen ab. Der Fettgehalt des Tuberkelbacillus hat mit seiner Virulenz nichts zu tun, sondern wird von seiner biologischen Wirkung auf das Glycerin des Nährmediums bestimmt. Die Säurefestigkeit hängt nicht von der Menge des Fettes, sondern von seiner Art oder von der Gegenwart anderer Substanzen ab. *Seligmann* (Berlin).

Pozerski, E. et Max M. Lévy: Sur l'excrétion de composés phosphorés par les microbes. (Über die Exkretion phosphorhaltiger Produkte durch Bakterien.) (*La borat. de physiol., Inst. Pasteur, Paris.*) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. B. 37, Nr. 26, S. 1157—1159. 1922.

Durch Waschen mit destilliertem Wasser und Zentrifugieren erhält man Phosphat in Lösung, bis der Rückstand nichts mehr abgibt. Bebrütet man den Bakterienrückstand, so gibt er wieder neue Phosphatmengen ab. Das läßt sich wiederholen, solange noch lebende Bakterien vorhanden sind. Aus den toten Zellen kann man durch Erhitzen noch Phosphor gewinnen. Die Versuche wurden mit subtiler Methodik an Shiga- und Proteusbacillen ausgeführt. *Seligmann* (Berlin).

Megrill, Emerson: Factors influencing development of metachromatic granules in the diphtheria bacillus. (Faktoren, die die Entwicklung metachromatischer Körnchen im Diphtheriebacillus beeinflussen.) (*Dep. of hyg. a. bacteriol., sch. of med., Western res. univ., Cleveland, Ohio.*) Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. 5, S. 393 bis 401. 1922.

Auf Blutserumnährböden bilden sich die metachromatischen Granula des Diphtheriebacillus reichlicher, spärlicher auf Glycerinagar. Der Fleischextrakt ist für die Körnchenbildung günstiger als das Pepton. Beide zusammen sind noch günstiger. Ein halbflüssiger Agar-Nährboden ist ungünstig. Die beste Körnchenbildung geschieht in Blutserummedien mit 2% Wasser; sinkt der Wassergehalt darunter, so sinkt auch die Körnchenzahl. Wachstumsprodukte diffundieren durch dünne Agarschichten und beschleunigen die Körnchenbildung in neuen Kulturen. Bouillonfiltrate, Diphtherietoxin, erhitztes Filtrat oder Toxin-Antitoxinge mische sind ohne Einfluß. Am besten geht die Körnchenbildung bei 37° vor sich. Mäßige Reduktion

der Sauerstoffspannung ist ohne Einfluß, stärkere behindert die Körnchenbildung. In Schmierabstrichen finden sich mehr Körnchen als in Einzelkolonien. *Seligmann* (Berlin).

Almquist, Ernst: Variation and life cycles of pathogenic bacteria. (Variation und Lebenszyklus pathogener Bakterien.) *Journ. of infect. dis.* Bd. 31, Nr. 5, S. 483 bis 493. 1922.

Bei niederen Temperaturen und bestimmten Substraten lassen sich eigentümliche pilzähnliche Formen des Typhus- und Ruhrbacillus darstellen, die bei höheren Temperaturen und normalen Nährmedien in die gewöhnlichen Formen übergehen. Verf. sieht in ihnen Glieder eines gesetzmäßigen Lebenszyklus; er glaubt Mycel, Conidien und Sporangien zu erkennen, auch bei Choleravibrionen und Spirillen. Auch bei Diphtheriebacillen hat er ähnliche Beobachtungen gemacht. Auch echte, erbliche Mutationen treten auf (Typhus, Cholera u. a.). Auch in reiner Granulatform sind diese Mutanten vermehrungsfähig; sie lassen sich durch Filtration oft rein gewinnen. Im allgemeinen ist die Variationsfähigkeit der Bakterien noch größer, als die der Pilze; sie hat Bedeutung für Vitalität und Virulenz der einzelnen Stämme, ja auch für das Verständnis des epidemiologischen Geschehens. *Seligmann* (Berlin).

Hall, Ivan C. and Samuel B. Randall: The acid production of bacillus Welchii. (Die Säurebildung des Bac. Welchii.) (*Dep. of bacteriol. a. exp. pathol., univ. of California, Berkeley.*) *Journ. of infect. dis.* Bd. 31, Nr. 4, S. 326—333. 1922.

Der Prozeß der Säurebildung durch Bac. Welchii in einem Pepton-Fleisch-Nährmedium mit Überschuß verschiedener Zuckerarter verläuft in einer nicht recht durchsichtigen Kurve, die vermuten läßt, daß ursprünglich gebildete Säuren später wieder zerstört werden. Gerade bei Zuckerüberschuß kommt es zu einem Rückgang der H-Ionenkonzentration und der titrierbaren Acidität. Aus Milchezucker bildet der Bacillus besonders wenig Säure; für die anderen Zucker sind die Endwerte des p_H -Gehalts und der Acidität annähernd gleich. *Seligmann*.

Kimmelstiel, P.: Über eine biologische Eigenschaft eines Wurzelbacillus. (*Inst. f. exp. Therapie, Allg. Krankenh., Hamburg-Eppendorf.*) *Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig.*, Bd. 89, H. 6, S. 113—115. 1922.

Bringt man einen dem Mycoides nahestehenden Wurzelbacillus zum Oberflächenwachstum in mit verschiedenen Bakterienarten bewachsenen Bouillonröhrchen, so tritt nach wenigen Tagen eine Auflösung der Bakterien und eine Aufhellung der Bouillon ein. Auch das Filtrat einer solchen Bouillon hat gewisse wachstumshemmende Eigenschaften, die jedoch nicht vermehrungsfähig sind (im Gegensatz zum d'Hérélleschen Phänomen). *Seligmann* (Berlin).

Gózon, Ludwig und Eugen Kramár: Reduktionsversuche mit Bakterien. (*Bakteriologie, Inst., Univ. Budapest.*) *Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig.*, Bd. 89, H. 6, S. 193—209. 1922.

Quantitative Versuche der Methylenlaureduktion durch Bakterien unter Berücksichtigung von Zeit, Dichte der Bakteriensuspension und Intensität der Entfärbung. Der Einfluß des Alters der Kultur auf die Reduktion beruht darin, daß in älteren Kulturen weniger lebende Keime sind als in jungen. Der Grad der Reduktion steht unter sonst gleichen Bedingungen in direkter Proportion zur Keimzahl. In Bouillonkulturen ist die Zahl der zu voller Reduktion erforderlichen Keime wesentlich kleiner als in Agarkulturen. Diese sind in 24 Stunden alten Kulturen am wirksamsten, jene in 5 Tage alten. Die Reaktion des Nährbodens ist von bestimmtem Einfluß; in alkalischer Umgebung reduzieren die Bakterien allgemein besser, in saurer schlechter als bei neutraler Reaktion. Verschiedene Salze wirken verschieden; Zusatz von Spuren $CaCl_2$ zur physiologischen Kochsalzlösung erhöht die Reduktionsfähigkeit stark; Na-Ionen hemmen. Die Temperaturgrenze für die Reduktion entspricht den Vermehrungstemperaturen der Bakterien. Eiweiße oder Eiweißabkömmlinge, die die Reduktion fördern, sind, in reiner Lösung angewandt, gute Nährböden für die betreffenden Bakterien. Kohlehydrate sind im allgemeinen günstig, wenn auch weniger als Eiweiß; die einzelnen Zuckerarten wirken nicht gleichförmig. Reduktionsfördernde Zucker sind auch vermehrungsbefördernd. Virulenz und Reduktionskraft gehen deutlich parallel (Milzbrand und B. bipolaris septicus). Wenn es auch Reduktionen durch leblose Bakterienmassen gibt, so ist doch diese durch lebende Bakterien verursachte Reduktion des Methylenblaus als eine Lebenserscheinung der Bakterienzellen aufzufassen. *Seligmann*.

Kodama, H. und H. Takeda: Eine neue biologische Reaktion der Choleravibrionen. (*Inst. f. Hyg. u. Bakteriologie, med. Hochschule, Kanazawa, Japan.*) *Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig.*, Bd. 88, H. 7/8, S. 513 bis 518. 1922.

Verf. haben systematische Versuche über Bildung von diastatischen Fermenten durch Bakterien angestellt.

Sie benutzen ein Stärke-Peptonwasser als Nährboden (Wittepepton 1 g, Kartostärke 0,5 g, 10proz. Sodalösung 2 ccm, Wasser 100 ccm; Abfüllen in Röhren zu je 5 cm; diskontinuierliche Dampfsterilisierung). Nach bestimmter Kulturzeit wird die Verminderung der auf dem Boden des Röhrens liegenden Stärke abgeschätzt und nach Zusatz von Jodkaliumlösung die Veränderung der Farbe beobachtet. Cholera vibrios wandern die Stärke am schnellsten und stärksten um, choleraähnliche Vibrios etwas schwächer. Milzbrand-, Coli- und Heubacillen sehr wenig, andere Bacillen überhaupt nicht.

Wenn man deshalb choleraverdächtigen Kot in Stärke-Peptonwasser 7—24 Stunden bei 37°C kultiviert und dann bei Zusatz von Lugolscher Lösung eine Gelbfärbung der Flüssigkeit feststellt, so kann man das Vorhandensein von Cholera vibrios vermuten.

Carl Günther (Berlin)

Schiemann, O. und W. Baumgarten: Reagensglasversuche über die Wirkung von Aeridin- und anderen Farbstoffen auf Bakterien. (*Inst. „Robert Koch“, Berlin*). Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 97, H. 1/2, S. 247—279. 1922.

Schwankungen in der Zusammensetzung von Nährböden beeinflussen bei Infektions- und Entwicklungshemmungsversuchen stark die Ergebnisse, besonders bei Versuchen mit Farbstoffen. Die Verf. empfehlen für jede Bakterienart den Nährboden von optimaler Reaktion zu verwenden. Die Feststellung sollte allgemein nach Sönnenssen und Michaelis erfolgen. Serum wird für viele Bakterienarten als ungeeigneter Nährboden verworfen, zumal die bactericide Kraft des Serums großen Schwankungen unterworfen ist.

W. Weisbach (Halle)

Jungeblut, Claus W.: Über die bactericide und entwicklungshemmende Kraft des Äthers. Ein Beitrag zur Frage der Ätherbehandlung der Peritonitis. (*Chirurg. Univ.-Klin., Basel*). Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. u. Infektionskrankh., A. 1. Orig., Bd. 88, H. 7/8, S. 562—582. 1922.

Verf. unternimmt die Aufgabe, die Ätherbehandlung der Peritonitis einer bakteriologischen Prüfung, allerdings nur in vitro zu unterziehen. Im flüssigen Medium (Bouillonkultur) wurde bei einer Konzentration von 1:10 selbst bei stundelanger Einwirkung keine Abtötung der untersuchten Bakterien (Pneumokokken, B. ph. Streptokokken, Staphyl. aureus und albus) erreicht. Die bactericide Kraft steigt mit der Höhe der Temperatur. Ätherdämpfe wirkten schneller tödend als Ätherbouillongemisch. Verf. konnte bei Nachprüfung der Sigwartschen Versuche seine Resultate nicht bestätigen. Auf festen Nährböden wurde durch Zusatz von 1 ccm Äther eine Abtötung der Pneumokokken und B. coli erzielt, Streptokokken waren geschwächt, während Staphylokokken unbeeinflusst blieben. Hat der Äther also nur eine geringe bactericide Kraft, so ist sein entwicklungshemmender Einfluß ganz bedeutend wie Verf. an Versuchen mit flüssigen und festen Nährböden nachweisen konnte. Er hält daher die Äthereingießung in das Abdomen bei drohender und beginnender Peritonitis für ein wirksames Mittel zur Aufhaltung der bakteriellen Infektion. Theodor

Reichenbach: Die theoretischen Grundlagen der Desinfektion. (9. Tag. d. Chem. Vereinig. f. Mikrobiol., Würzburg, Sitzg. v. 8.—10. VI. 1922.) Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I: Orig., Bd. 89, H. 1/3, S. 15—28 u. 65—87. 1922.

Die Absterbeordnung einer Bakterienpopulation verläuft scheinbar ebenso wie der Ablauf monomolekularer Reaktionen. In Wirklichkeit ist diese Übereinstimmung aber nur eine formale, der logarithmische Verlauf; die Ursache des verschiedenartigen Absterbens der Bakterienzellen ist nicht im Wesen des Desinfektionsvorgangs begründet, sondern in der zufälligen Abgestuftheit der Resistenz der einzelnen Bakterienzellen. Da diese Abgestuftheit immer vorhanden ist, kommt es zur Gesetzmäßigkeit der Absterbeordnung. Die niedrigste Resistenzstufe ist am zahlreichsten in der Population vertreten, die Keime der höchsten Widerstandsfähigkeit am geringsten. Aus der logarithmischen Absterbeordnung ergibt sich die Abhängigkeit der Desinfektionszeit von der Anfangsmenge der Bakterien. Je größer diese ist, um so größer die Anzahl der Keime von höchster Resistenz, um so verlängerter daher die Desinfektionszeit (bis zu einer gewissen Grenze). Aber auch die Dichte der Bakterienaufschwemmung

elbst bedingt einen erheblichen Schutz gegenüber der Desinfektionswirkung (fällt bei der Keimträgermethode fort). Der Resistenzaufbau der Laboratoriumskultur darf nicht auf die in der Natur frei lebenden Keime ohne weiteres übertragen werden; die Resistenzunterschiede in der Kultur selbst sind auch keine erblichen Eigenschaften, vielmehr einfache, durch die Kultur bedingte Modifikationserscheinungen. Aus allen diesen Gründen kann die Desinfektionsgeschwindigkeitskonstante als absoluter Maßstab für den Desinfektionsvorgang nicht anerkannt werden. Der im Auslande gebräuchliche relative Maßstab (Carbolsäurekoeffizient) ist gleichfalls unzuverlässig; hier spielen Keimart, Wachstumshemmung, Milieu, Konzentration, Temperatur modifizierende Rollen. Die weiteren Ausführungen gipfeln in einer Kritik der üblichen Prüfungsmethoden für Desinfektionsmittel. In der Diskussion betont Reichel (Wien) die Bedeutung der Wirkungskurven (Beziehungen zwischen Konzentration und Zeitdauer) für die Bewertung von Desinfizientien. Die Absterbeordnung kommt im Endziel auf dasselbe hinaus. Eine einfache Normungsmethode für die Prüfung liegt noch weit im Felde.

Seligmann (Berlin).

Butkewitsch, Wl. und Fr. W. G. Orlow: Zur Frage nach den „ökonomischen Koeffizienten“ bei *Aspergillus niger*. Biochem. Zeitschr. Bd. 132, H. 4/6, S. 556 bis 565. 1922.

Das Maximalgewicht der Pilzdecke auf einer als Nährsubstrat verwendeten Zuckermenge ist dann erreicht, wenn der Zucker ganz oder nahezu erschöpft ist. Das Verhältnis des dann geernteten Pilzgewichtes zu der ursprünglich vorhandenen Zuckermenge stellt den ökonomischen Koeffizienten im Sinne Pfeffers dar. Ein Zusatz von Zinksulfat beschleunigt das Wachstum des Pilzes und steigert den ökonomischen Koeffizienten. Oxalsäure als Stoffwechselprodukt ist nur in ZnSO_4 -freien Kontrollen nachweisbar; auch sonst ist die Acidität ohne ZnSO_4 -Zusatz größer als mit solchem. In einem Kulturversuche auf 3 proz. Glucoselösung, zum Teil mit Zusatz von 0,0025 proz. ZnSO_4 , verhielten sich nach Erreichung des Maximalgewichtes bei der zinkfreien Kultur nach 7, bei der zinkhaltigen nach 4 Tagen, die Pilzernten wie 0,380 zu 0,553, die Aciditäten wie 21,5 zu 8,6, die ökonomischen Koeffizienten wie 25,3 zu 36,9. Die Höhe des ZnSO_4 -Zusatzes war innerhalb der Grenzen von 0,0025% bis 0,1% nicht von merklichem Einfluß auf die Entwicklungsgeschwindigkeit und den ökonomischen Koeffizienten; nur die Conidienbildung war bei höheren Zusätzen gehemmt. Das Temperaturoptimum für den ökonomischen Koeffizienten liegt niedriger als für das Wachstum. Ein Zusatz von Kobaltsulfat (0,01%) hemmt anfangs die Entwicklung, steigert sie dann aber ebenso wie den ökonomischen Koeffizienten, wenn auch nicht so stark wie ZnSO_4 . HgCl_2 (0,001%) bewirkt ebenfalls eine im Vergleich zu ZnSO_4 geringere Steigerung von Pilzernte und ökonomischen Koeffizienten, hemmt jedoch im Unterschied zu diesem nicht die Oxalsäurebildung. Hieraus geht hervor, daß deren Ausbleiben nicht ohne weiteres einer energischeren Oxydation unter der Einwirkung des Zinksulfats zugeschrieben werden darf.

O. Arnbeck (Berlin).

Meek, Carolyn S. and Charles B. Lipman: The relation of the reaction and of salt content of the medium on nitrifying bacteria. (Der Einfluß der Reaktion und des Salzgehalts des Mediums auf nitrifizierende Bakterien.) (*Plant nutrition laborat., univ. of California, Berkeley.*) Journ. of gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 195 bis 204. 1922.

Der Nitritbildner sowie der Nitratbildner zeigen in mineralischer Nährlösung Nitrifikation zwischen p_H 4 einerseits und p_H 13 andererseits, wobei indessen die Stämme von verschiedenem Boden deutlich variieren. NaCl und Na_2CO_3 hemmen in 0,28 n-Lösung, Na_2SO_4 in n-Lösung.

Meyerhof (Kiel).

Waksman, Selman A.: Microorganisms concerned in the oxidation of sulfur in the soil: III. Media used for the isolation of sulfur bacteria from the soil. (Bei der Oxydation von Schwefel im Boden beteiligte Mikroorganismen. III. Die zur

Isolierung von Schwefelbakterien aus dem Boden benutzten Nährböden.) (*Agricult. exp. stat., New Jersey.*) Soil science Bd. 13, Nr. 5, S. 329—336. 1922.

I. und II. vgl. diese Berichte 13, 516. — Die l. c. angeführten Klassen sind nach ihren physiologischen Eigenschaften in drei Gruppen einzuordnen: I. Sulfidbakterien = Schwefelbakterien von Omelianski, hierher die Klassen 1—3, die hauptsächlich H_2S und Sulfide oxydieren mit Anhäufung des S innerhalb des Zelleibes. — II. Thiosulfatbakterien, oxydieren hauptsächlich Thiosulfat, in gewissem Ausmaß auch Sulfide und elementarem S mit Anhäufung von S außerhalb ihrer Zellen; auch Umwandlung von S-Verbindungen in Sulfate und Persulfate. Hierher Klasse 4. — III. Eigentliche „Schwefel“-bakterien, oxydieren besonders elementaren S, Anhäufung weder innerhalb noch außerhalb, mit reichlicher Säureproduktion. Oxydieren aber auch, in geringen Mengen, Sulfide und Thiosulfate. Hierher Klasse 5. Im Boden mit Sicherheit nur die beiden letzten Gruppen; als hierzu gehörend sind beschrieben *Thiobacillus thiooxidans* Beijerinck, *denitrificans* Beijerinck, *thiooxydans* Waksman und Joffe (vgl. auch die Berichte 12, 473). Alle drei sind autotroph, ihren C aus CO_2 beziehend, die Trautweinische Form des *Denitrificans* kann auch auf organischen C-Verbindungen wachsen. Die beiden ersten gehören zu Klasse 4, der dritte zu 5. Hauptunterschiede dieser beiden Gruppen: Klasse 4 isoliert durch Thiosulfat als S-Quelle. Klasse 5 isoliert durch elementaren gepulverten S. Klasse 4 produziert freien S außerhalb der Zellen als Häutchen. Die Trautweinische Abart, aerob, häuft keinen S an. Thiooxydans produziert keinen S aus Thiosulfat, (wird rasch zu H_2SO_3 oxydiert). Die beiden aus Klasse 4 sind $3 \cdot 0,5 - 10 \mu$ groß, beweglich, in Agar züchtbar. Der Trautweinische Bacillus ist $1 - 2 \cdot 0 \mu$, unbeweglich, reduziert anaerob Nitrate. Thiooxydans ist $0,75 - 1 \cdot 0,5 \mu$, unbeweglich, auf festem Nährboden nicht entfernt so zu kultivieren. Die beiden ersten oxydieren Thiosulfat zu Sulfat und Persulfat, der dritte nur zu Sulfat. Bester p_H für die ersten beiden etwa 8,0, also alkalisch, für den dritten 3,0, also ausgesprochen sauer. Die Vitalität des Thiooxydans ist bedeutend größer; sie ist nach über 1 Jahr in Reinkultur in flüssigem Medium ebenso unverändert wie die physiologischen Eigenschaften; die beiden anderen dagegen verlieren in Reinkultur schnell an Lebensfähigkeit.

Nährboden für Thiooxydans: $(NH_4)_2SO_4$ 2 g; K_2HPO_4 1 g; KCl 0,5 g; $MgSO_4 \cdot 7 H_2O$ 0,5 g; $FeSO_4$ 0,01 g; S 10 g; $Ca_3(PO_4)_2$ 10 g; aq. dest. 1000 cem. Oder mit p_H etwa 3,0: $(NH_4)_2SO_4$ 0,2 g; $MgSO_4 \cdot 7 H_2O$ 0,5 g; $CaCl_2$ 0,25 g; $FeSO_4$ Spur; K_2HPO_4 3 g; S 10 g; aq. dest. 11. Oder mit p_H etwa 3,0: $(NH_4)_2SO_4$ 0,2 g; $MgSO_4 \cdot 7 H_2O$ 0,5 g; $FeSO_4$ 0,01 g; $Ca_3(PO_4)_2$ 2,5 g; S 10 g; n- KH_2PO_4 80 cem; n- H_3PO_4 20 cem; aq. dest. ad 1000 cem. Diese drei Nährböden an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 30 Minuten in strömendem Dampf sterilisiert. Oder: $Na_2S_2O_3$ 5 g; NH_4Cl 0,1 g; $CaCl_2$ 0,25 g; KH_2PO_4 3 g; Agar 20 g; aq. dest. 11. Der erstgenannte Nährboden, aus dem Thiooxydans zuerst isoliert wurde, ist wegen seiner Reaktion (zu stark mit KH_2PO_4 gepuffert) der schlechteste. Im Zusammenhang damit werden auch die Nährböden für die übrigen S-Bakterien nach der Literatur angegeben.

P. Wolff (Berlin)

Infektion. Antigene. Antikörper.

Kumagai, K.: Über den Resorptionsvorgang der corpusculären Bestandteile im Darm. *Kekkaku-Zasshi* Bd. 4, Nr. 12, S. 429—431. 1922. (Japanisch.)

Um die einigermaßen schon bekannten Tatsachen, daß verschiedene corpusculäre Substanzen vom Darmkanal vielfach resorbiert werden, weiter zu verarbeiten, hat der Verf. mit Tusche-, Carmin- und Blutkörperchenpulver sowie mit lebenden und abgetöteten Tuberkelbacillen eine Reihe Versuche an Kaninchen angestellt. 1. An der Resorption der Tuschepartikel beteiligen sich ausschließlich die in der Darmschleimhaut enthaltenen Lymphknötchen. Der größte Teil der Partikel wird vom Protoplasma der die Knötchen überziehenden Zylinderepithels, ein weit geringerer Teil von den Zwischenräumen des Epithels aufgenommen; von dort gelangen die Teilchen durch die Lymphspalten und Reticularzellen der Submucosa tief in die Knötchen hinein. 2. Calciumpartikel werden vor allem von Lymphknötchen in der Gegend des Blinddarms und Wurmfortsatzes, außerdem von den Peyerschen Haufen im Dünndarm in derselben

Weise wie Tuschepartikel resorbiert. 3. Das Eisen der getrockneten roten Blutkörperchen wird teils von der Zottenschleimhaut im oberen Teil des Dünndarms, teils von den Follikeln und der Schleimhaut des Blinddarmes und Wurmfortsatzes aufgenommen; 4. Lebende ebenso wie auch abgetötete Tuberkelbacillen treten in den meisten Fällen in die Follikel des Blinddarms und Wurmfortsatzes hinein, nachdem sie erst vom Protoplasma der Epithelzellen aufgenommen wurden. Bei diesen Versuchen ist besonders zu erwähnen: 1. daß sowohl lebende als auch abgetötete Bacillen, ohne irgendeine lokale Veränderung hervorzurufen, in die Gewebe hineintreten, und 2. daß die Resorption der festen Substanzen im Darm viel leichter bei alten als bei jungen Tieren stattfindet.

Ischimori (Nagoya).

Sata, A.: Über den Durchgangsprozeß der Tuberkelbacillen in den Darmkanal. *Kekkaku-Zassi* Bd. 4, Nr. 12, S. 432—433. 1922. (Japanisch.)

Der Verf. hat die Mitteilung von Kumagai bestätigt und dazu folgendes beigetragen: Bei Kaninchen findet in den ersten 6 Lebensmonaten die Resorption von Tuberkelbacillen nur in geringem Maße, dagegen bei ca. 1 Jahr alten Tieren in stark erhöhtem Grade statt; der Resorptionsvorgang setzt sich aus einem intra- und auch einem extracellulären Prozeß zusammen, wobei jedoch der erstere immer die Hauptrolle spielt; die Aufnahme der Bacillen geht ziemlich schnell und reichlich vonstatten. *Ischimori.*

Hahn, Martin und Emil v. Skramlik: Serologische Versuche mit Antigenen und Antikörpern an der überlebenden, künstlich durchströmten Milz. (*Hyg. Inst., Univ. Freiburg i. Br.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 131, H. 3/4, S. 315—319. 1922.

Als Hauptergebnis der Tätigkeitsweise der überlebenden künstlich durchströmten Meerschweinchenleber konnte in zahlreichen serologischen Versuchen eine Verankerung von Antikörpern wie Antigenen an die Gewebszellen festgestellt werden. Durch diesen Vorgang werden die gebundenen Körper selbst nur wenig beeinflusst: In einer Leber, in der Bakterienagglutinine festgehalten werden, findet eine Agglutination der passenden Bakterien statt, hämolytische Amboceptoren vermögen trotz ihrer Verankerung an die Leberzellen die zugehörigen Blutkörperchen zu beeinflussen, und zwar im Sinne einer stärkeren Verklebbarkeit, die zur Agglutination im Organ führt, worauf nach Ablauf einer längeren Zeit die Lyse folgt. Tetanolyisin schädigt auch im Lebergewebe später durchgeleitete Blutkörperchen schwer. Alle diese Erfahrungen hatten die Frage nahegelegt, ob es sich dabei um Wirkungen handelt, die nur von einem Organ, der Leber, ausgelöst werden, oder ob etwa die Milz in gleicher Weise tätig sein kann. Leitet man durch eine Hammelmilz in künstlichen Durchströmungsversuche artfremde Blutkörperchen, so werden sie in 5 Min. agglutiniert und nach Ablauf einer weiteren Stunde auch schwach gelöst. Diese Wirkung ist wohl auf die Gegenwart eines Normalamboceptors im Milzgewebe zurückzuführen, der sich auch in der kreisenden Flüssigkeit nachweisen läßt, freilich erst nach 5stündigem Durchgang durch das Organ. Ebenso wie Blutkörperchen werden auch Bakterien durch Agglutination im Gewebe zurückgehalten, was durch ein Normalagglutinin bedingt ist. Die Milz enthält also normalerweise Blutkörperchenamboceptoren sowie Agglutinine, die sich in der Leber niemals haben feststellen lassen. Sonst verhält sich dies Organ in serologischen Versuchen vielfach gleichartig wie die Meerschweinchenleber. Tetanustgift wird gebunden, aber nur dessen lytische Komponente wie in der Leber, die spastische erfährt kaum eine Verminderung im Gegensatz zur Leber, wo sich im Tierversuch eine deutliche Abnahme hat feststellen lassen. Alles in allem herrscht aber eine gewisse Übereinstimmung zwischen Leber- und Milzfunktion in serologischer Beziehung. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Milz im menschlichen wie im tierischen Körper leicht entbehrt werden kann.

Emil v. Skramlik (Freiburg i. Br.).

Ruppel, W. G., O. Ornstein, J. Carl und G. Lasch: Lyophile und lyophobe Eiweißkörper als Antigen und Antikörper. (*Elektroosmose-Ges., Berlin, Lindenstr. 35.*) *Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.* Bd. 97, H. 1/2, S. 188—208. 1922.

Die äußerst inhaltreiche und bedeutsame Arbeit gibt eine knappe, zusammen-

fassende Darstellung zahlreicherer größerer Versuchsreihen, deren Protokolle für spätere Veröffentlichungen angekündigt werden. Die gewonnenen Ergebnisse sind der systematischen Anwendung des Verfahrens der Elektroosmose zu danken, das von den Autoren noch wesentlich verbessert wurde, vor allem durch Verwendung bestimmter Dialysiermembranen, über deren Zubereitung allerdings nur recht allgemeine Angaben gemacht werden.

Die Apparatur besteht aus einem dreikammerigen Trog, dessen äußere Kammern von Wasser durchflossen werden, in das Platinelektroden tauchen, während die mittlere Kammer einer eiweißhaltigen Lösung beschickt wird; die trennende Wand wird zwischen Anoden- und Mittelkammer aus einer tierischen, zwischen Kathoden- und Mittelkammer aus einer pflanzlichen Membran gebildet. Diese Anordnung ist wichtig, weil die Membranen in Berührung mit der Lösung selbst bestimmte elektrische Potentiale besitzen, die auf die Durchwanderungsgeschwindigkeit der Ionen je nach dem Ladungssinn fördernd oder hemmend wirken. Pflanzliche Membranen lassen ausschließlich (?) Kationen, tierische Anionen durch und man erhält deshalb unter dem Einfluß des elektrischen Stroms bei Verwendung von pflanzlichen Membranen rasch saure, bei Verwendung von zwei tierischen alkalische Reaktionen in der mittleren Kammer; durch geeignete Wahl von „aufeinander abgestimmten Diaphragmasystemen“ kann man jedoch bei mehrstündiger Elektroosmose die Wasserstoffzahl in Grenzen $pH = 8,4$ bis $6,4$ halten. Die Spannung wird bei der Elektroosmose von Blutes entsprechend der Abnahme an Elektrolyten allmählich gesteigert von $30-220$ Volt, während die Stromdichte je Quadratzentimeter von $15-18$ auf $0,55$ M.-A. sinkt. Durch dieses Verfahren läßt sich auf sehr schonende Weise ein Serum bereiten, das von allen diffusiblen Substanzen und von Euglobulin befreit ist. Zur weiteren Aufteilung, nämlich zur Trennung des Albumins und Pseudoglobulins eignet sich eine Anordnung mit 4 Kammern, indem die mittlere Kammer des Elektroosmoseapparates durch eine dritte Membran von weit größerer Durchlässigkeit als die Seitenmembranen geteilt ist. Die Eiweißlösung kommt unter Zusatz geringer Mengen von Säure in die anodische oder von Lauge in die kathodische Hälfte der Mittelkammer, während die andere Hälfte ebenso wie die Elektrodenkammern mit Wasser gefüllt sind. Das leicht diffusive Eiweiß, nämlich das Albumin, wandert vor dem schwerer diffusiblen Pseudoglobulin als Ionen in die leere Kammer über, während Wasser entgegengesetzt wandert, und so gelingt die Trennung. (In ganz analoger Weise kann man die leichter diffusible Gelatine von dem verunreinigenden Eiweiß abtrennen, was technisch wertvoll ist.)

An den reinlich voneinander getrennten Fraktionen der Serum-eiweißkörper wurden nun zahlreiche Beobachtungen gemacht, die zum Teil Bekanntes bestätigten und ergänzten, zum Teil aber völlig neue Aufklärung brachten. Dahin gehört vor allem die Feststellung, daß reines Pseudoglobulin in salzhaltiger, schwach alkalischer Lösung mehrere Jahre haltbar ist, ohne in Euglobulin überzugehen. Bei Gegenwart von Albumin wandelt sich jedoch ebenso wie dieses selbst auch ein Teil des Pseudoglobulins in Euglobulin um, d. h. es geht aus einer hydrophilen in eine hydrophobe Modifikation über. Die Reaktion dabei ist folgende: Aus dem labilen Albumin spalten sich hydrolytisch Aminosäuren ab, der Rest besitzt die Eigenschaften des Pseudoglobulins; die freien Aminosäuren führen das Pseudoglobulin in das lyophile Euglobulin über. Der wandelt sich auch reines Albumin mit der Zeit in ein Gemisch von Pseudo- und Euglobulin um. Versuche an Meerschweinchen über die antigene Kraft der 3 Eiweißfraktionen ergaben übereinstimmend bei der Prüfung am anaphylaktischen Schock, wie an der Präzipitinreaktion, daß sie beim Euglobulin am stärksten, beim Albumin am wenigsten ausgeprägt ist, während Pseudoglobulin in der Mitte, jedoch dem Euglobulin näher steht. Bei Vorbehandlung mit Albumin lösten die Globuline Schock aus, das Umgekehrte erfolgte nicht. An Immunsereen wurde die sehr wichtige Tatsache ermittelt, daß die verschiedenen Immunkörper an verschiedenen Eiweißfraktionen haften; die Komplementbindung ist ausschließlich an das Euglobulin gebunden, hämolytische und bakteriolytische Amboceptoren aber an das Pseudoglobulin (ebenso die geschilderte Schutzwirkung, z. B. bei Schweinerotlaufserum); Agglutinine und Präcipitine haften vornehmlich am Euglobulin, wenig an Pseudoglobulin, Bakteriotropine hauptsächlich am Pseudoglobulin. Die Antitoxine des Diphtherie-, Tetanus- und Choleraeserums sind weitaus in der größten Menge in der Pseudoglobulinfraktion vorhanden. Aus alledem ergibt sich, daß man wesentliche therapeutische Fortschritte erzielt, wenn man zu Heilzwecken nicht das Vollserum, sondern das gereinigte Pseudoglobulin der Im-

sera verwendet: es enthält auf gleiche Menge Schutz- oder Heilstoff weniger Eiweiß, bietet weniger Gefahr von Serumkrankheit sowie unspezifischen Eiweißwirkungen und ist dauernd unverändert haltbar. An Toxinlösungen von Diphtherie, Tetanus, Dysenterie und Cholera wurde festgestellt, daß sie im isoelektrischen Punkt unter partieller Zerstörung ausfallen. Endlich wurde an Bakterienkulturen ermittelt, daß sie durch Elektrosmose (Entsalzung) sicher abzutöten und die Zellen ohne eingreifende Maßnahmen zu zertrümmern sind, was für die Bereitung von Antigen technisch bedeutsam sein kann.

W. Heubner (Göttingen).

Skramlik, Emil v. und Otto Olsen: Über die komplettierende Wirkung serumfreier Organe. Nach Versuchen an der überlebenden, künstlich durchströmten Hammelmilz und Hammelleber. (*Hyg. Inst., Univ. Freiburg i. Br.*) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 131, H. 3/4, S. 320—326. 1922.

Wässrige Extrakte aus serumfreier Hammelmilz enthalten Mittelstück. Im Durchströmungsversuch erfolgt zwar eine Bindung der im künstlichen Kreislauf strömenden sensibilisierten Blutkörperchen an das serumfreie Organ, eine Auflösung der so gebundenen Blutkörperchen tritt aber nicht in Erscheinung. Es wird an die Blutkörperchen Mittelstück vom Organ abgegeben, auf dessen Einwirkung vermutlich das von M. Hahn und Emil v. Skramlik beschriebene Organbindungsphänomen beruht. Es wird aber kein Endstück in einer für die Hämolysen hinreichenden Menge von der Milz geliefert, und nur bei künstlicher Zufuhr von Endstück durch den Kreislauf an die gebundenen Blutkörperchen werden diese gelöst. Ein analoges Verhalten zeigt die Hammelleber. Beide Organe weisen in ihrem Gehalt an Mittelstück und ihrem Mangel an Endstück Übereinstimmung mit den Eigenschaften des Hammelserums auf, das reichliche Mengen Mittelstück, aber nur spärlich Endstück enthält. *Skramlik*.

Dresel, E. G. und W. Keller: Bakterientötende Kräfte im Serum von Gesunden und Kranken. (9. Tag. d. Dtsch. Vereinig. f. Mikrobiol., Würzburg, Sitzg. v. 8.—10. VI. 1922.) *Zentralbl. f. Bakteriolog., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I: Orig.*, Bd. 89, H. 1/3, S. 240—243. 1922.

Im Serum klinisch gesunder Männer und bei klinisch gesunden Frauen im Menstruationsintervall finden sich keine Anthracoccidine. Das Serum klinisch gesunder Frauen erlangt während der Menstruation bactericide Kraft gegen Milzbrandbacillen, die schnell wieder abklingt. Im Nabelvenenblut gesunder Neugeborener finden sich bactericide Kräfte gegen Milzbrand und Typhusbacillen. Sera von klinisch kranken Menschen enthalten sehr reichliche Anthracoccidine, und zwar bei fieberhaften akuten und chronischen Infektionskrankheiten, bei Infektionskrankheiten ohne Fieber, bei chronischen Krankheiten mit Organveränderungen, bei schweren Verletzungen und Operationen mit schweren Vernarbungsprozessen. Therapeutische Eingriffe können die Bildung von Anthracoccidinen steigern, können sie jedoch bei zu großen Dosen zum Verschwinden bringen. Ebenso scheint das Zusammentreffen von verschiedenen schweren Organerkrankungen zu wirken. Die durch irgendwelche Reize im Körper ausgelösten bakterientötenden Kräfte gegen Milzbrand und Typhus scheinen gleichsinnig wirksam zu werden.

Dresel (Berlin).

Seiffert, Walter: Der Löhnersche Randwulst am keimfreien Hof als Stütze des Arndtschen Grundgesetzes. II. (*Inst. f. exp. Therap., Emil v. Behring*, Marburg, *Lahn*.) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 133, H. 1/3, S. 46—48. 1922.

Verf. hält gegenüber Cobet-Reiss daran fest, daß kleinste Mengen oligodynamischer Substanz das Wachstum anregen und diese Anregung sich nicht durch Nährstoffbegünstigung erklären läßt. Dem widerspricht ersten in einem Falle die unregelmäßige Form des Randwulstes; denn die Nährstoffdiffusion müßte nach allen Seiten gleichmäßig erfolgen; 2. der auf mit Colibacillen bespalteter Endoagar mit gewissen Silbermünzen erzeugte Randwulst. Zur Neutralisation des Natriumsulfits reichen die Mengen nicht aus. (Vgl. diese Berichte 14, 127.)

Renner (Altona).

Cobet, R. und V. van der Reis: Zur Frage der Entstehung der Löhnerschen Randwülste. (Bemerkungen zur Arbeit Seiffert.) (*Med. Klin., Jena u. Greifswald*.) *Biochem. Zeitschr.* Bd. 133, H. 1/3, S. 49—51. 1922.

Verf. halten an der Entgiftungsmöglichkeit fest, betonen, daß an Endoagar die Nährstoffbegünstigung weniger deutlich ist als am gewöhnlichen Agar. Ihre Anschauung stützen sie darauf, daß in ursprünglich keimfreien Zonen späterhin Bakterien wachsen nicht nur bei Agarplatten, sondern auch bei Silbermünzenversuchen.

Renner (Altona).

Ecker, E. E., B. S. Kline and A. DeCaluwe: The relation of reduction of leucocytes and platelets to complementing power of serum. (Die Beziehung der Abnahme der Leukocyten und Blutplättchen zum Komplementgehalt des Serums.) (*De of pathol., Western res. univ., Cleveland, Ohio.*) Journ. of infect. dis. Bd. 31, Nr. S. 368—372. 1922.

Die subcutane Einspritzung von Benzol (in Olivenöl) bewirkt bei Kaninchen regelmäßig eine Abnahme der Leukocyten auf unter 1000 im Kubikmillimeter, während die Blutplättchen keine Abnahme zeigen. Trotzdem bleibt der Komplementtitel aller Tiere innerhalb der normalen Grenzen. Die Verminderung der Leukocyten beruht nicht auf einer Anhäufung in den Lebercapillaren, wie Pappenheim annimmt. In der Knochenmark und die Milz im Verlauf der Benzolbehandlung schwere Schädigung aufweisen und trotzdem der Komplementgehalt des Blutes nicht herabgesetzt. Es muß man annehmen, daß diese Gewebe keine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Komplementtiters spielen. Dold (Marburg).

Perlzweig, William A.: Preliminary report on the nature of the immunizing antigen of pneumococcus. Type I. (Vorläufige Mitteilung über die Natur des immunisierenden Antigens des Pneumokokkus, Type I.) Proc. of the New York pathological soc. Bd. 21, Nr. 6/8, S. 133—135. 1921.

Immunisierung weißer Mäuse durch abgetötete Pneumokokken in subcutaner Einleitung, am besten mit ansteigenden Dosen. Das auf Pneumokokken nach Rowlands Methode hergestellte oder durch Alkoholpräzipitation aus Pneumokokken-Gallensalzlösungen gewonnene Nucleoprotein enthält die immunisierenden Substanzen. Bei Verdauung oder Autolyse der Pneumokokken oder Proteinfraction bleibt das Antigen unverändert und widersteht der Verdauung. Von hier aus in Alkohol übertragen, der dadurch 70—83 Proz. wird, findet sich das Antigen im Filtrat; es ist in neutralen, sauren und alkoholischen Wasserlösungen löslich, nicht aber in 95—99 Proz. Alkohol. In alkalischer Lösung wird es durch Kochsalz zerstört, nicht dagegen in neutraler oder schwach saurer Lösung. Nach alledem scheint das Antigen dem antineuritischen, wasserlöslichen Vitamin B nahezu stehen. Seligmann (Berlin).

Cecil, Russell L. and Gustav I. Steffen: Active immunity against experimental pneumococcus type I: pneumonia in monkeys following intratracheal injection of vaccine. (Aktive Immunität gegen Pneumokokkus, Type I: Pneumonie beim Affen nach intratrachealer Vaccineinjektion.) Proc. of the New York pathological soc. Bd. 21, Nr. 6/8, S. 132—133. 1921.

Je 1 ccm Pneumokokkenvaccine wurde einem Affen 3 mal in Abständen von 1 Woche in die Trachea eingespritzt. Prüfung nach 3 Wochen mit Pneumokokkeninfektion der Lunge. Die 3 Versuchstiere blieben gesund, die Kontrolle erkrankte an Pneumonie. Im Blut der immunen Tiere fanden sich keine Schutzkörper. Seligmann (Berlin).

Levaditi, C. et S. Nicolau: Vaccine et néoplasmes. (Vaccine und Neoplasmen.) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 174, Nr. 15, S. 1649—1652. 1922.

Das Vaccinevirus (Neurovaccine) wurde auf epithelialen Neubildungen von Ratte und Maus gezüchtet. In ein Epitheliom injiziert und mit dem Tumor, der an Volumen zunimmt, am 6.—10. Tage excidiert und unter die Haut eines Kaninchens gebracht, führt es zu intensiver Vaccineruption. In sarkomatösem Gewebe dagegen geht das Vaccinevirus schnell zugrunde. Entsprechend verhält sich das Virus, wenn es Tumorträgern in die Blutbahn injiziert wird: der epitheliale Krebs speichert das Virus, das Sarkom bleibt frei. Das Epitheliom verliert in der Mehrzahl der Versuche, trotz Anwesenheit lebender Zellen, seine Vermehrungsfähigkeit, nicht selten kommt es zu völliger Heilung; manchmal erst nach Wiederholung der Vaccineinjektion in der zweiten oder dritten Tumorgeneration. Epitheliome, die auf gegen Vaccine immunisierte Ratten übertragen werden, sind auf dem Wirtstier immun gegen Vaccine. Tumoren auf anderen Tieren sind wieder normal empfänglich. Der Tumor selbst wird aber durch mehrfache Vaccineinjektion nicht immun, er unterscheidet sich hierin von normalen Epithelzellen. Seligmann (Berlin).

Kruijff, Paul H. de and John H. Northrop: The stability of bacterial suspensions. IV. The combination of antigen and antibody at different hydrogen ion concentrations. (Die Stabilität von Bakteriensuspensionen. IV. Kombination von Antigen und Antikörper bei verschiedenen Wasserstoffionenkonzentrationen.) (*Laborat., Bacteriol.*)

feller inst. f. med. research, New York.) Journ. of gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 127 bis 138. 1922.

Die zur Agglutination einer Typhusbacillenemulsion erforderliche Antikörpermenge steigt direkt proportional der Konzentration der Aufschwemmung. Die Absorption von Agglutinin durch die Bacillenemulsion ist bei p_H -Werten zwischen 3,7 und 9 gleich. Unterhalb dieser Grenze ist sie vermindert. Zugabe von Immunsrum zu Bacillen bei p_H 2,5 erhöht die positive Ladung der Bakterien. Das spricht gegen die Annahme, daß die Bindung von Antigen und Antikörper auf der Differenz der elektrischen Ladungen beruht. Wahrscheinlicher ist die Annahme, daß der Immunkörper auf der Oberfläche der Mikroorganismen ein Häutchen bildet, und daß das Häutchen die Wirkung auf die Ladung bedingt. (Vgl. diese Berichte 17, 92.)

Seligmann (Berlin).

Kruif, Paul H. de and John H. Northrop: The stability of bacterial suspensions. V. The removal of antibody from sensitized organisms. (Die Stabilität von Bakteriensuspensionen. V. Die Entfernung des Antikörpers von sensibilisierten Bakterien.) (Laborat., Rockefeller inst. f. med. research, New York.) Journ. of gen. physiol. Bd. 5, Nr. 2, S. 139—142. 1922.

Von mit Agglutinin beladenen Typhusbacillen lassen sich die Antikörper bei p_H 3 nicht vollständig entfernen als bei p_H 7. Etwa 12 agglutinierende Dosen werden fest verankert. Überschießende Antikörpermengen lassen sich durch destilliertes Wasser leicht entfernen. Da mit Agglutinin beladene Bakterien bei der Säureagglutination ein anderes Flockungsoptimum haben als unbeladene, kann diese Methode zum Nachweis sensibilisierter Bakterien benutzt werden. Häufig wiederholte Waschungen mit destilliertem Wasser entfernen alle Immunkörper von den sensibilisierten Bacillen. Nach der 8. Waschung verhalten sie sich bei der Säureagglutination fast ebenso wie unbeladene Bakterien.

Seligmann (Berlin).

Gildemeister, E.: Weitere Untersuchungen über das d'Herellesche Phänomen. (9. Tag. d. Dtsch. Vereinig. f. Mikrobiol., Würzburg, Sitzg. v. 8.—10. VI. 1922.) Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I: Orig., Bd. 89, H. 1/3, S. 181 bis 186 u. 202—206. 1922.

Flatterformen, die als Träger des bakteriophagen Agens anzusehen sind, hatte Gildemeister bisher nur bei Vertretern der Typhus-Ruhr-Coligruppe angetroffen; neuerdings auch bei Staphylokokken. — Die Entwicklung der Flatterform ist gegenüber der Normalform verzögert (Agarplatte). — Vaginalsekret enthält lytisches Agens für Coli und Shiga, nicht gegen Staphylo- und Streptokokken (11 Versuche). — Es gibt keine Vermehrung des bakteriophagen Prinzips ohne Vermehrung der zugesetzten Bacillen. — Das bakteriophage Agens besitzt eine sehr erhebliche Resistenz gegen wiederholte tägliche Erhitzung auf 60°; seine Wirksamkeit läßt sich durch stets neuen Zusatz von frischen Bakterien nicht erschöpfen. — Ein Resistenzunterschied zwischen Bakterien und bakteriophagem Agens gegenüber ultravioletten Strahlen war nicht nachweisbar.

von Gutfeld (Berlin).

Wolff, L.-K. et J.-W. Janzen: Action de divers antiseptiques sur le bactériophage de d'Herelle. (Wirkung verschiedener Antiseptica auf den d'Herelleschen Bakteriophagen.) (Laborat. d'hyg., univ., Amsterdam.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 34, S. 1087—1088. 1922.

Es sollte ein Antisepticum gefunden werden, welches den Bakteriophagen zerstört, ohne die Bakterien zu töten. Mit einem solchen Mittel könnte man Bakterien von ihrer hypothetischen, latenten „Bakteriophageninfektion“ befreien und dann feststellen, ob diese Keime entstanden sind, ein lytisches Agens zu produzieren. Das Antisepticum wurde bisher nicht entdeckt, wohl aber wurden einige mitteilenswerte Beobachtungen im Lauf der Versuche gemacht. Zur Anwendung gelangten folgende Antiseptica: Optochin, Eucupin, Vucin, Chinosol, Yatren, Trypaflavin, Rivanol, Malachitgrün. Von Bakteriophagen kamen zum Versuch: Anti-Typhus-, Coli-, -Ruhr- und -Staphylokokkenbakteriophagen. Gibt man zu einem Bakterien-Bakteriophagenmisch eine gewisse Menge der genannten Antiseptica und streicht nach 24stündigem Kontakt auf Agar aus, so entstehen keine sterilen Flecke wie in den Kontrollen. Der Bakteriophage ist aber nicht tot, sondern nur in einem latenten Zustand. Andererseits vermögen schwache Konzentrationen (z. B. Chinosol 1:4000) die Bakteriophagenwirkung zu verstärken. Auch Gewöhnung der Bakteriophagen an Antiseptica wurde beobachtet. von Gutfeld (Berlin).

Seiffert, W.: Ein Beitrag zur Variation der Bakterien und zum d'Herellesche-Phänomen. (9. Tag. d. Dtsch. Vereinig. f. Mikrobiol., Würzburg, Sitzg. v. 8.—10. VI. 1922.) Zentralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I: Orig., Bd. 89, H. 1, S. 195—199 u. 202—206. 1922.

Die in der Arbeit enthaltenen Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden. von Gutfeld (Berlin).

Carreras, Giulio: Le difese naturali contro l'anafilassi alimentare. (Die natürlichen Verteidigungskräfte gegen die alimentäre Anaphylaxie.) (Istit. di clin. med. gen., univ., Pisa.) Fol. med. Jg. 8, Nr. 5, S. 129—139. 1922.

Die Ursache, daß es nach wiederholter alimentärer Proteinzufuhr nur in Ausnahmefällen zu anaphylaktischen Erscheinungen kommt, liegt in komplizierten biologischen Funktionen des Organismus. Hauptfaktoren der Abwehr sind die Verdauungssäfte, die das Proteinmolekül aufspalten, und die Schleimhautepithelien, die den Durchtritt unabgebauten Eiweißes verhindern. Aber auch die Leber ist an der Abwehr beteiligt, die etwa doch durchgedungene Proteinkörper unschädlich macht, bevor noch Immunkräfte des Körpers in die Erscheinung treten können. Seligmann (Berlin).

Bass, C. C.: Studies on inoculation of experimental animals with malaria. (Injektion von Versuchstieren mit Malaria.) (School of med., Tulane univ., New Orleans.) Americ. journ. of trop. med. Bd. 2, Nr. 2, S. 107—114. 1922.

Injektion lebender Malariaparasiten (kulturell als lebensfähig erwiesen) in den Blutstrom von Meerschweinchen, Kaninchen und Affen führte zum Absterben der Parasiten, ohne daß die Tiere krank wurden. Seligmann (Berlin).

Zehetmayr, Hans: Über die Wirksamkeit des normalen Rinderserums bei der Milzbrandinfektion. (Staatl. Tierimpfstoffgewinnungsanst., Mödling bei Wien.) Zentralbl. f. Bakteriöl., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig., Bd. 89, H. 6, S. 53 bis 161. 1922.

Normales Rinder Serum wirkt antiinfektiös gegen eine nachträgliche Milzbrandinfektion. Die Ursache liegt nach den Versuchen des Verf. in der lokalen, durch das Serum erzeugten Ödembildung. Auch colibacilläre Mikroorganismen, die lokales Ödem erzeugen, wirken gegenüber einer an der gleichen Körperstelle erfolgenden nachträglichen Milzbrandinfektion nicht infektiös. Therapeutisch verspricht Rinder Serum daher nur bei lokaler Milzbrandinfektion (Karbunkel) Erfolg, nicht aber bei ausgedehnten Infektionen oder bei Septicämie. Seligmann (Berlin).

Nègre, L. et A. Boquet: Effets des injections de l'extrait méthylique de bacilles de Koch sur l'évolution de la tuberculose expérimentale du cobaye et du lapin. (Einfluß von Injektionen methylalkoholischer Tuberkelbacillenextrakte auf die Entwicklung der Impftuberkulose von Meerschweinchen und Kaninchen.) (Laborat. tuberculeuse, Inst. Pasteur, Paris.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, N. 86, S. 1162—1163. 1922.

Der methylalkoholische Extrakt wurde vom Alkohol durch Verdampfen befreit und in destilliertem Wasser aufgenommen. Meerschweinchen, die mit Tuberkelbacillen infiziert waren, wurden mit diesem Extrakt 4 mal behandelt, teils subcutan, teils intraperitoneal. Kaninchen wurden mit 21 Dosen des gleichen Extrakts subcutan behandelt. Erfolg: Neigung zu lokaler Abgrenzung der Tuberkulose und erhebliche Lebensverlängerung. Der Extrakt hat keinerlei lokale Reizwirkung. Seligmann (Berlin).

Wernicke, R.: Electro dialyse du sérum antidiphthérique de cheval. (Elektrodialyse von Diphtherieantitoxin-Pferdeserum.) (Inst. bactériol., dép. nat. arg., Buenos-Aires.) Cpt. rend. des séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 33, S. 1041 bis 1043. 1922.

Mittels Elektrodialyse kann man Salze schneller und vollkommener entfernen als mit der einfachen Dialyse. Das Dialysat ist lackmussauer. Das dialysierte Serum enthält bei gleichem Gesamtproteingehalt mehr Globulin und weniger Albumin als das ursprüngliche Serum. Die antitoxische Kraft des Serums wird durch die Elektrodialyse nicht merklich geändert; die aktiven Bestandteile werden von den inaktiven nicht genügend getrennt. Je größer der Gehalt an Pseudoglobulinen, desto größer der Antitoxingehalt. von Gutfeld (Berlin).

Nathan, E.: Über die Aufhebung der Funktion alkoholischer Rinderherzextrakte durch Cobragift und ihre Bedeutung für die Theorie der Wassermannsche und Sachs-Georgischen Ausflockungsreaktion. (Dermatol. Univ.-Klin., Frankfurt (M.) Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therap., Orig., Bd. 35, H. 4, S. 392—406. 1922.

Alkoholischer Rinderherzextrakt verliert durch Digestion mit Cobragift seine Fälschung.

mit syphilitischem Serum unter Komplementbindung zu reagieren. Auch die Ausflockungsfähigkeit geht verloren. Das spricht für die Gleichartigkeit der reagierenden Extraktbestandteile und ihre lipide Natur (Zerstörung durch die Lecithinase). Maßgebend für den Eintritt der Reaktionszerstörung sind die biochemische Eigenart des Extraktes (verschieden starke Zerstörbarkeit) und die Eigenart der syphilitischen Sera, die sich dem gleichen Extrakt gegenüber verschieden verhalten können (Aviditätsdifferenzen?). Behandelt man ausgeflockte Extraktserumgemische mit Cobragift, so tritt oft noch nachträgliche Zerstörung und Aufhebung der Ausflockung ein. Das spricht für den reversiblen Charakter der Extrakt-Serum-Verbindung.
Seligmann (Berlin).

Kondo, Seigo: Über den Einfluß des Salzgehaltes auf die Wassermannsche Reaktion mit aktivem Serum. (*Inst. f. exp. Krebsforsch., Heidelberg.*) Zeitschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therap., Orig., Bd. 35, H. 4, S. 366—391. 1922.

Flockungsreaktionen und Wassermannsche Reaktion werden durch den Salzgehalt des Mediums in ihrer ersten Phase entscheidend beeinflusst. Durch Herabsetzung des Salzgehaltes kann man alle aktiven Sera so wandeln, daß sie mehr oder weniger positive WaR. geben. Auch die antikomplementäre Kraft von Extrakt und Serum kann auf diese Weise gesteigert werden. Ja selbst Alkohol an Stelle von Extrakt gibt unter diesen Bedingungen Reaktionen, wenn auch in quantitativ veränderter Form. Der Alkohol wirkt als schwaches Globulinfällungsmittel, reagiert daher vor allem mit den labileren, aktiven Seren. Ähnliche Nebenwirkung weisen auch die Extraktlipide auf. Grundsätzliche Unterschiede im Verhalten aktiver Sera bei WaR. und Ausflockungsreaktionen bestehen nicht. Der Salzgehalt des Milieus, bei der WaR. schon der 0,85 proz. Kochsalzgehalt, verhindert die normale Flockung (durch Umhüllung von Extraktbestandteilen mit labilen Eiweißkomponenten) und macht den Weg für spezifische Reaktionen frei.
Seligmann (Berlin).

Buschke, A. und H. Kroß: Histologischer Nachweis von Spirochäten im Gehirnparenchym bei experimenteller Recurrens. (*Inst. f. Infektionskrankh., Robert Koch u. Rudolf Virchow-Krankenb., Berlin.*) Klin. Wochenschr. Jg. 1, Nr. 50, S. 2470—2471. 1922.

In einer vorhergehenden Untersuchung war bereits festgestellt worden, daß bei Mäusen mit experimenteller Recurrensinfektion die Keime im Gehirn nachweisbar sind. Zur histologischen Darstellung der Spirochäten wurde die Jahnelsche Pyridin-Waschmethode benutzt. Im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Beobachter fanden sich die Recurrensspirochäten nicht nur innerhalb der Blutgefäße, sondern sie wandern durch die Wandungen der Blutcapillaren hindurch, zeigten sich in großen Mengen im Parenchym des Gehirns, vor allem in der grauen Substanz des Kleinhirns, ferner in der Medulla oblongata. Man sieht sie auch in der glösen Grundsubstanz der Rinde, in Gliazellen und Glianmonsterzellen, nicht in Ganglienzellen und nicht in der weißen Substanz. Sie verhalten sich also analog den Syphilisspirochäten, von der Lagerung im Kleinhirn abgesehen. Schon 20 Stunden nach der Infektion sind die Spirochäten im Gehirnparenchym nachweisbar, auch im Rezidivstadium. Während der Immunitätsperiode ließen sich im Gehirn keine Spirochäten auffinden.
Schübel.

Pharmakologie. Toxikologie.

Schoeller, W.: Die biochemische Bedeutung der organischen Quecksilberverbindungen. Naturwissenschaften Jg. 10, H. 50, S. 1071—1079. 1922.

Bericht besonders über die vom Verf. in Gemeinschaft mit W. Schrauth u. a. angestellten, zum Thema gehörigen Untersuchungen unter Herausstellung der großen Gesichtspunkte. Im Anschluß an das Paul- und Krönigsche Gesetz der Herabsetzung der Desinfektionswirkungen der Hg-Ionen als Träger derselben durch Zusatz von Elektrolyten zeigt sich bei den organischen Hg-Verbindungen ebenfalls die Notwendigkeit der Bildung eines komplexen Zwitterions mit einer freien Hg-Valenz; wird z. B. im Hg benzoic. die OH-Gruppe durch andere einwertige Radikale ersetzt, so sinkt mit zunehmender Dissoziation dieser Reste vom Hg auch die Desinfektionskraft. Nebengruppierungen durch weitere in den Benzolkern eintretende Reste können steigend oder hemmend auf die Desinfektionskraft wirken, oft im Gegensatz zu ihrer sonstigen Aktivität oder Passivität; diese auffallende Beobachtung ist durch Verschiebung der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Zwitterions zu begründen. — Für die Giftwirkung im Warmblüter ergeben sich zwei Beziehungen einfachster Art über den Zusammenhang Konstitution — Wirkung, die in der Interferenz ^{Zersetzlichkeit} ^{Ausscheidungsgeschwindigkeit} ihren Ausdruck finden. Die Zersetzlichkeit im Organismus hängt ab von der Stabilität der Komplexbindung, die wiederum von der Beanspruchung der zweiten Valenz sowie der Nebengruppierung abhängig ist; als Maßmethode erwies sich der Vergleich der Zersetzung durch Ammoniumsulfid als geeignet. Die Ausscheidungsverhältnisse hängen ab von der Verschiebung des Teilungskoeffizienten in die wässrige Phase sowie der Adsorptionskonstante. — Chemotherapeutisch ist offenbar der „abgespaltene Anteil“ der integrierende Faktor für die Heilwirkung, außerdem wird wahrscheinlich die spezifische Antikörperbildung gefördert. — Erörterungen über die Novasurol-

wirkungen nach der Literatur. — Die hohe Desinfektionskraft der organischen Hg-Verbindungen sind in der Afridolseife und der Saatgutbeize Uspulun nutzbar gemacht worden. Letztere macht die Sämereien nicht nur pilzfrei, sondern wirkt sogar ertragsteigernd, „eubiotisch“. — In der Erörterung über den Mechanismus der Hg-Wirkung bei Syphilis schließt sich Verf. den Autoren an, die in der Hg-Wirkung keine desinfektorische sehen; es wiederum der eubiotische Effekt katalytischen Charakters, der hier der pathologisch funktionierenden Zelle die Fähigkeit verleiht, zur Norm zurückzukehren. P. Wolff (Berlin).

Leuze, E.: Zur Theorie der Narkose: Die Verteilung der Inhalationsnarkotika im Tierkörper. (Pharmakol. Inst., Zürich.) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 1, H. 3/4, S. 145—165. 1922.

Zur Ermittlung der Verteilung flüchtiger Narkotica im Warmblüterorganismus wurden nur bromhaltige, flüchtige Substanzen benutzt.

Bei ausschließlich verwendeten Kaninchen wurde eine doppelläufige Meltzer-Kanüle in die Trachea eingebunden, der zur Atmung nötige Sauerstoff unter mäßigem Überdruck durch die betreffende Narkoseflüssigkeit von stets gleicher Flüssigkeitssäule geleitet. Die Narkosetiefe wurde durch den Cornealreflex geprüft. Nach Beendigung der Narkose wurde in die Carotis und V. jugularis je eine Kanüle eingebunden, das Tier nach Abnahme von 30 bis 40 ccm Blut, unter geringem Oxalatzusatz, ausgeblutet, indem 150 ccm isoviscose Flüssigkeit (5% Traubenzucker + 1% Gelatine) intravenös gegeben wurden. Die von den ausgebluteten Kaninchen entnommenen Organe wurden sofort in Druckfläschchen gebracht, je mit 10—20 ccm alkoholischer Kalilauge beschickt waren, dann unter häufigem Umschütteln 3—4 Tage auf 40° erwärmt. Das Gehirn wurde immer ganz, die Leber zu einem aliquoten Teil verwendet. Durch $\frac{3}{4}$ stündiges Zentrifugieren (mit 3000 Touren) wurde das Verhältnis im Blutkörperchen zum Plasma ermittelt. Es fanden sich für Kaninchenblut 34% Blutkörperchen. Zur Analyse wurden 10 ccm Gesamtblut und 20 ccm Plasma genommen, der Gehalt des Narkoticums in den Blutkörperchen durch Differenz bestimmt. Durch Behandlung mit alkoholischer Kalilauge wird das organisch gebundene Brom in anorganische Form übergeführt. Nach Eindampfen der erhaltenen Flüssigkeit wird vorsichtig verascht, die Asche ausgelugt und das enthaltene Brom bestimmt. Es wurden Bromoform, Bromäthyl, Äthylbromid und Propylbromid verwendet.

Das Gehirn enthielt stets am meisten von dem Narkoticum, dann folgte das Leber, dann die Leber. Der Verteilungskoeffizient zwischen Gehirn und Blut sowie zwischen Leber und Blut erwies sich als recht konstant. Die Verteilung der Narkotica in den einzelnen Organen ist vom Gehalte des Blutes unabhängig. Dieselben Resultate wurden in vitro erzielt. Die Narkotica verteilen sich in Gehirn und Blut, Blutkörperchen und Plasma, Leber und Blut nach einem konstanten Verhältnis. Daraus kann auf die Gültigkeit des Henrichsen'schen Verteilungssatzes geschlossen werden. Aus dem Verteilungsverhältnis zwischen Blutkörperchen und Plasma kann kein Schluß auf leichtes oder schweres Eindringen in Gewebszellen gezogen werden. Schübel (Würzburg).

Pohl, Julius: Physiologische Wirkungen neuer Gallensäuren. (Pharmakol. Inst., Breslau.) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 30, H. 1/6, S. 423—431. 1922.

Kaninchen werden 0,15—0,5 g cholsaures bzw. desoxycholsaures Na intravenös injiziert und die aus einer in die Gallenblase eingebundenen Kanüle ausfließende Galle wird in halbstündigen Portionen gemessen. Beide Gallensäuren haben eine beträchtliche cholagoge Wirkung, und zwar nehmen die Volumina der sezernierten Galle nach 0,5 g Cholsäure bzw. Desoxycholsäure um etwa 46% bzw. 110% zu. Da das spezifische Gewicht gleich bleibt, sind die Versuchsgallen in ihren wesentlichen Bestandteilen als gleichmäßig vermehrt anzusehen. Energische Atropinisierung hat auf die Wirkung der Desoxycholsäure keinen Einfluß. Desoxycholsaures Natron in Konzentrationen von 1—2,5% zu Galle hinzugefügt, ruft keine Trübung oder Ausfällung hervor. Der Alkaligehalt der Galle bleibt nach der Zufuhr von desoxycholsaurem Natron normal. Ausgefällter desoxycholsaurer Kalk ist in physiologischer Kochsalzlösung und Galle vollständig löslich. Zwei jungen Hunden wurde innerhalb 16 Tagen je 4 g Cholsäure bzw. Desoxycholsäure in der Nahrung als Natronsalz gereicht. Bei der Sektion der Tiere erwiesen sich beide Gallen als absolut klar, die Gallenblasenwände samtartig glatt, glatt in der Oberfläche, nirgends eine Spur pathologischer Veränderung. Die Becken Salkowskis wegen leichterer Fällbarkeit des desoxycholsauren Kalks sind demnach

hinfällig. In weiteren Versuchen wurde die chologoge Wirkung der genannten Gallensäuren als Basis zur Prüfung der Beeinflussbarkeit der Leber durch eine Reihe von Substanzen gewählt. Gleichzeitig oder vorher gereichtes Jodnatrium vermindert oder hebt die Wirkung der Cholsäure auf. Wird die Lösung des Jodids in Kochsalzlösung und nicht in destilliertem Wasser injiziert, so tritt die Wirkung der Cholsäure unverändert ein. Die Wirkung der Desoxycholsäure und der Apocholsäure wird durch Jodide nicht gehemmt. Nach wiederholten Neosalvarsandarreichungen bleibt die Wirkung der Cholsäure unverändert bestehen. Die physiologischen Gallensäuren, wie die Cholsäure und die Desoxycholsäure haben deutlich das Vermögen, die Fettresorption zu steigern; diese Wirkung geht den künstlichen Derivaten ab. *Wachholder (Breslau).*

Gürber, A.: Über den Synergismus von Krampfgiften. (*Pharmakol. Inst., Marburg.*) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 95, H. 3/4, S. 192—199. 1922.

Für sich allein unwirksame Dosen von Pikrotoxin und Strychnin werden zusammen wirksam, schon wenn ein Drittel der Schwellendosis dieser Gifte erreicht wird. Dieselbe betrug bei Fröschen von 30—33 g Gewicht 0,028 mg (Strychnin) bzw. 0,014 mg (Pikrotoxin). Die Pikrotoxin- und Strychninkrämpfe behalten dabei ihr Gepräge. Bei Enthirnung der Frösche treten weder Pikrotoxin- noch Strychninkrämpfe auf. Eine unterschwellige Pikrotoxingabe konnte durch Strychnin überschwellig gemacht werden. Es traten so ausgesprochene Pikrotoxinkrämpfe auf. Verf. nimmt förderndes, sich gegenseitig unterstützendes Zusammenwirken von Erregungen im Zentralnervensystem an. Das Überwiegen einer gewissen Erregungstendenz ist maßgebend für die Art der entstehenden Krämpfe. Die Krämpfe treten abwechselnd und verstärkt auf. Es handelt sich um ein funktionelles Zusammenwirken von Erregungszuständen nach dem Prinzip einer Bahnung. Wir haben es hier mit einer besonderen Form von potenzierendem Synergismus zu tun. *Schübel (Würzburg).*

Busquet, H. et Ch. Vischniac: Présence d'un principe vasoconstricteur puissant dans le Genêt à balai. (Anwesenheit eines mächtigen vasoconstrictorischen Prinzips im Besenginster.) Cpt. rend. de séances de la soc. de biol. Bd. 87, Nr. 35, S. 1116 bis 1118. 1922.

Der von den Blüten befreite, zerstoßene Stiel der bei voller Blüte gesammelten und in einem warmen Luftstrom (nicht über 40°) getrockneten Pflanze wird mit CHCl_3 , dann mit Äther erschöpft und in einem Luftstrom getrocknet, dann als feinstes Pulver im Soxhlet mit Wasser erschöpft. Man verfolgt den Fortgang der Extraktion durch physiologische Kontrollen und hört auf, wenn der Wasserdampf keine aktive Substanz mehr fortreibt; dann unter 100—150 mm einengen. — Beim chloralotierten Hund erzeugt eine 0,01 g Pflanze entsprechende Menge der Lösung intravenös Blutdruckerhöhung mit gleichzeitiger Verkleinerung des Nierenvolumens. Subcutan ist die 15fache Dosis erforderlich. Kaninchen ist weniger empfindlich; auch bei großen Gaben nur sehr flüchtige Steigerungen. Hahn wie Hund. — Die Wirkung ist auch an überlebenden Organen deutlich. Hier zeigt das Kaninchenherz deutliche vasomotorische Beeinflussung: fügt man zur normalen Ringer-Lockelösung des Coronarkreislaufs eine 0,75 g Pflanze entsprechende Menge der Lösung, so verlangsamt sich die Tropfenzahl um 25%. — An Kaninchenohr, Hahnenkamm, Menschenhaut ist die vasoconstrictorische Wirkung nach Injektion einiger Tropfen obiger Lösung an der scharf abgegrenzten Bluteleere deutlich zu erkennen. Gewebsblutungen werden vermindert oder stehen. — Eine 0,01 g Ginsterengel entsprechende Lösung entspricht in der Wirkung (pro kg Tier) 0,01—0,015 g Nebennierengewebe oder 0,05 g Secale. Obige Beobachtungen und solche nach der Methode von Nolf (Bull. acad. roy. belg. 1902, S. 895) beweisen den peripheren Angriffspunkt. *P. Wolff (Berlin).*

Wieland, Heinrich und Richard Alles: Über den Giftstoff der Kröte. (*Chem. Laborat., Univ. Freiburg i. Br.*) Ber. d. dtsh. chem. Ges. Jg. 55, Nr. 6, S. 1789 bis 1798. 1922.

Aus dem alkoholischen Auszug der Häute unserer einheimischen Kröte hatte Wieland (Chem. Ber. 46, 3313; 1913 und Sitzgsber. Bayr. Akad. d. Wiss. 1920, 329) einen kristallisierten Giftstoff, das Bufotalin, herausgeholt und Beziehungen zu Gallensäuren herzustellen versucht. Diese Bemühungen wurden fortgesetzt, sie haben noch nicht zum vollen Erfolg geführt, da die Beschaffung des Ausgangsmaterials auf unerwartete

Schwierigkeiten stieß. Es zeigte sich nämlich, daß das Bufotalin bereits ein Abbauprodukt des wahren Giftstoffes ist. Dieser, Bufotoxin genannt, steckt in dem in Chloroform unlöslichen Anteil des Alkoholauszugs. Ihm kommt die Zusammensetzung $C_{40}H_{62}O_{11}N_4$ zu. Schon beim Kochen mit ganz verdünnter Salzsäure wird aus ihm der Kern des Moleküls als Bufotalien $C_{24}H_{30}O_3$ herausgespalten. Dabei entsteht Wasser, Essigsäure und das mit Phosphorwolframsäure fällbare Suberyl-arginin $HO_2C \cdot (CH_2 \cdot CO \cdot NH \cdot C(NH) \cdot NHCH_2CH_2CH_2CH(NH_2) \cdot COOH$. Da Bufotoxin kaum mehr seine Eigenschaften besitzt, wird die Carboxylgruppe der Harnsäure esterartig mit dem Bufotalin verknüpft sein. Bei der Einwirkung von konz. Salzsäure auf das freie, schon in verdünnter Säure auf das im Bufotoxin gebundene Bufotalin wird aus letzterem Essigsäure abgespalten und gleichzeitig Wasser unter Bildung einer neuen Doppelbindung. Dieses Bufotalien $C_{24}H_{30}O_3$ liefert durch Hydrierung Bufotalan $C_{24}H_{38}O_3$, ein Lacton, dessen Oxysäure mit der Desoxycholsäure $C_{24}H_{40}O_4$ isomer ist. Die Oxysäure in der Grundkörper, die Cholansäure $C_{24}H_{40}O_2$, abzubauen, ist aus Materialmangel noch nicht gelungen. Aber der erste Teil des Weges ist klargestellt worden. Das am tertiären Hydroxyl acetylierte Acetylbufotalin wurde mit konz. Salzsäure in Acetylbufotalin übergeführt, dessen Hydrierung Acetylbufotalan ergab. Vom Bufotoxin, dem ursprünglichen Giftstoff, ist also jetzt das eine Spaltstück, das Suberylarginin, in seinen beiden Bausteinen gefaßt, vom Kernstück sind sichergestellt eine Lactongruppe, ein Acetoxyl, ein sekundäres und ein tertiäres Hydroxyl. Das Bufotoxin wird gewonnen, indem der Rückstand der Alkoholauszüge der Krötenhäute mit Petroläther von Fett und Cholesterin, mit Chloroform vom Bufotalin befreit wird. Bei sorgfältigen Arbeiten fehlt dieses aber ganz! Dann wird der in Chloroform unlösliche Rest erst mit Alkohol bei 40–50° ausgezogen und durch fraktionierte Fällung mit Petroläther vom Schmierigen befreit. Der alkoholisch-petrolätherischen Lösung läßt sich das Toxin durch Wasser entziehen, aus dem es sich krystallinisch absetzt. Umkrystallisiert aus Alkohol. Auch aus dem frischen Hautdrüsensekret der Ohrdrüse wurde das Bufotoxin krystallisiert erhalten und eindeutig identifiziert.

Thomas (Leipzig)

Gueylard, Francee et Marcel Duval: Toxicité comparée de divers acides poisons poissons (épinosches). (Vergleich der Giftwirkung verschiedener Säuren auf Fische [Stichlinge].) Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences Bd. 251, Nr. 24, S. 1243–1245. 1922.

An Stichlingen wurde die Wirkung verschiedener Säuren bei colorimetrischer Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration geprüft. Hierbei wurde aus Gasapparaten destilliertes Wasser verwendet und als Puffer eine $\frac{1}{50}$ -Lösung des Natriumacetates der untersuchten Säure zugegeben. Diese Maßnahme war notwendig, weil leicht angesäuertes destilliertes Wasser durch den Aufenthalt der Fische in kurzer Zeit wieder fast neutrale Reaktion annimmt. Den Salzlösungen (jeweils 100 ccm) wurden ein Tropfen der verdünnten Säure zugefügt, bis der gewünschte Säuregrad erreicht war. Versuche mit Phosphorsäure, Milchsäure, Essigsäure und Propionsäure ergaben, daß die Lebensdauer für die gleiche Säure je nach p_H sehr verschieden ist. Sie steigt zwar langsam, dann sehr schnell an, wenn die Konzentration der H-Ionen abnimmt. Die einzelnen Säuren sind verschieden stark. Bei gleichen H-Ionenkonzentrationen leben die Fische in Phosphorsäure stundenlang, in Essigsäure nur wenige Minuten, sterben Stichlinge bei $p_H = 4$ in Phosphorsäure nach 8 Std., in Milchsäure nach $2\frac{1}{2}$ Std., in Essigsäure nach 11 Min., in Propionsäure nach noch kürzerer Zeit. Die Giftigkeit der Säuren hängt also weitgehend von der Natur der Säure und nicht allein von der Ionenkonzentration ab.

Flury (Würzburg)